

his
naloe
g^o poti
ciens. in
apud ho
sibile et
oia po

Pierre 87 - 45
~~Selenzet~~

hic libe attend
ad potum -
Lolurur

Hinc libe missi ddu
franses? Cailler
Criguig? a Gennanues
miles

J. G. in ddu

PEDACII
DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE
 MATERIA MEDICA
 LIBRI SEX,

Innumeris locis ab ANDREA
 MATTHIOLO emen-
 dati, ac restituti.

*Accesserunt tres Indices: vnus propriorum no-
 minum, alter nothorum, Tertius remedio-
 rum, Isq; maximi vsus.*



LVGDVNI,
 Apud Balthazarem Arnolletum.

M. D. LIIII.

DISCORDIA
P. D. C. H.

А И А З А Р Б Е И Д Е

221 12 12 12 12 12

SECRET

4711778 20/11/64

1891

Typographus lectori.



Ioscoridem è typographia nostra proficiscentem sine literis ad te venire nolumus: ne mutus uideretur esse nuntius:

Neque rursus eū literis onerauimus: ne illis legendis grauareris. Tantum sic habeto: Eum, quod sit materiae medicinalis auctor luculentiss. & cornucopiae locupletiss. tua de causa, à nobis in hoc paruum uolumen fuisse collatum, & contractum: Ut quocunque terrarū te conferes, tecū quasi exigidior circumferre, & aequē rusti cando peregrinandōque iucundo comite, ac domi, & in otio fido familiari uti, & libenter uelis, & comode queas. Adhuc: eū scalore, nauiis, atque maculis, quibus haetenus scatuuit innumeris, beneficio Andreae Matthioli, hominis in hoc genere uersatissimi, & doctorū approbatione, medicī doctissimi, elutis, atque expurgatis.

aa 2 proba

probe curatum, nitidū & tersum à nobis
emitti. Castigationes præterea quamplu-
rimorum locorum, eiusdem Matthioli so-
lertia, & ingenio elucubratas, & per nos
hac nota + signatas, ad calcem capitū fuis-
se cusas. Quòdque in magno, spero, habe-
bis beneficio: Indicem tertium, præter uul-
gatos priorum nominum, & eorū qua
ut habentur, ita dicuntur notha, fuisse ad-
iunctū: quo statim, nullòque labore, qua
medicamina, quibus morbis prosint, uel
potius, quibus medicaminibus quenque
morbum curare possis, inuenies omnino.
Quod nostrum, & illius commune officiū
tibi probari, & uniuersæ reip. usui esse ue-
hementer opto, & à Deo opt. max. toto
animo contendo. Vale Lugduni ad 7. ca-
lend. Aug. 1554.

INDEX OMNIUM

*quæ in Dioscoride
continentur.*

A

Acinos	253
Acetonũ 242	Acorum 8
Abſynthiũ 240	Aconitum 357
Abſynthiũ marinũ 242	Adarces 491
Abſynthium Santo	Adeps omnis 145
nicum ibi.	Adianton 380
Acacalis 81	Aegilops 381
Acacia 90	Aeris ſquãma 458
Acacia altera 91	Aeris flos 457
Acanthus 236	Aerugo rafa 459
Acanthium ibid.	Aerugoſcolecia 460
Acanthus ſylueſtris ibid.	Aes uſtum 456
Acetum 430	Aetiopis 370
Acetum è betonica 444	Aetites lapis 500
Acetũ muſſum 431	Agalochum 26
Acetũ ſcillinum 432	Agaricum 224
Acetum è ſtoechade 443	Ageraton 342
Achillea 333	Agnus 91
Achras 106	Aiuga 316
Acida muria 431	Alabaſtrites 498
	Alcea 312
	Alcibiadion 330
	Alcyonium 490
	Alifma 313

INDEX

Allium	198	Androsaces	304
Aloë	239	Androsemon	315
Alfina	362	Anemone	217
Altæa	311	Anethum	263
Alumen	481	Anguiū senectus	123
Alumen scissile	ibi.	Anisum	262
Alus	323	Anonis	237
Alysson	285	Anthemis	306
Alipon	409	Anthericum	211
Amaracum	252	Antyllis	305
Amaranton	341	Antipathes	491
Ambrosia	296	Antirrhinum	379
Amiantus lapis	498	Antispoda	455
Ammi	265	Aparine	284
Ammoniacon	282	Aphaca	195
Amomis	21	Apiastrum	290
Amomum	20	Apies	408
Ampelitis terra	505	Apium	266
Ampeloprason	197	Apocynon	359
Amphisbenæ ictus		Apollinaris	349
notæ 554. eius cu		Apri iecur	129
ratio	ibid.	Apū ict' curatio	554
Amurca	95	Aqua	428
Amygdalæ amaræ		Aqua frigida	552
108		Aqua marina	429
Amylum	168	Aqua mulsa	427
Anagallis	218	Arabicus lapis	497
Anagyris	313	Araneus	137
Anchusa	329	Arbutus	108
		Arci	

I N D E X

Arction	371	Asparagus	183
Arction	ibid.	Asplenon	305
Arcturon	ibid.	Aspidis ict ⁹ notē	550
Arena	501	eius curatio	563
Argemone	218	Aster Aticus	375
Argenti recremen-		Astragalus	344
tum	466	Athamanticum	8
Argenti scoria ibid.		Athera	166
Argenti spuma ibi.		Atractylis	285
& 529		Atramentum libra-	
Argētum viuū	473.	rium	506
& 529		Atramentum suto-	
Arisarum	210	rium	485
Aristolochia	228	Atriplex	180
Armeniacamala	106	Auellana nux	110
Armenius lapis	471	Auēna	166
Armoracia	177	Auricula muris	222
Aron	210	Auripigmentū, siue	
Arrhenogonō	300	arsenicon	480
Artemisia	295	B	
Arūdo: vide Harun		Bacca lauri	76
do	79	Baccharis	253
Asarum	14	Balaustium	102
Asclepias	285	Ballote	289
Aschyron	315	Balsamum	23
Asininum iecur	129	Barbula hirci	194
Asini vngula	130	Basilisci ict ⁹ notē	550
Asius lapis	493	eius curatio	563
Aspalathus	25	Bdellium	58

INDEX

Beta	182	viperæ morfus	554
Betonica	318	Calam ^o odorat ^o	22
Bitumen	71	Calamintha	249
Blata pistrinaria	128	Caltha	342
Bliton	179	Calx	530
Botrys	297	Calx viua	189
Brassica	180	Cancamum	26
Brassica marina	182	Cancri	121
Brassica sylvestris		Canis rubus	83
ibid.		Canis rabidi iecur	
Britanica	319	129	
Bromus	381	Canis radiosifigna,	
Brion	25	544. curatio mor	
Bryonia	25	fus eius, 545. ab eo	
Buccina	118	morforum victus	
Buglossum	377	ratio	548
Bulb ^o esculētus	212	Cannabis	312
Bulbus vomitorius		Cantharides	134
213		Capnos	372
Bunion	376	Capparis	214
Buprestis	135. & 519	Capræ vngula	130
Buphthalmos	307	Caprinū iecur	ibid.
Butyrum	140	Cardamomum	10
Butyri fuligo	ibid.	Cardamina	187
C acalia	376	Carduus	235
Canchrys	275	Carpasi succus	523
Cadmia	450	Cariotæ	99
Cæcilæ ictus notæ,		Carum	263
curatio eadē quæ		Caseus	140

Caia

INDEX

Casia	17	Chamæcissos	377
Castanea	97	Chamædaphne	385
Castorium	125	Chamædri	287
Catanance	379	Chamæleo	albus
Caucalis	192		232
Cedriā	75	Chamæleo	niger
Cedrites	76		233
Cedromela	106	Chamæleuce	377
Cedrus	75	Chamæpitys	316
Celticū nardum	12	Chamælyce	403
Cenci ictus notæ		Chamælea	405
554		Characias rithyma	
eius remedia ibi.		lus	397
Cētauriū magnum		Chælidonium	220
230		Chælidoniū minus	
Cētauriū minus ibi.			221
Cæpa	197	Chia terra	503
Cepæa	313	Chondrylla	189
Cera	160	Chrysanthemō	306
Cerasia	104	&	342
Ceraſtæ ict'no.	454	Chryfocolla	471
eius curatio	563	Chryfocome	341
Ceruigenitale	130	Chryfogonon	ibi.
Ceruinū cornu	134	Cicadæ	132
Ceruffa	469 & 527	Cicer fatium	170
Cestrum	318	Cicer arietinū	ibi.
Chalciris	476	Cicer sylueſtre	ibi.
Chamæ	119	Cichorion	189
Chameacte	406	Cici	397

I N D E X

Cicuta	358.& 522	rulentos	550
Cimices	128	Cònyza	298
Cimolia	504	Corallium	492
Cinisfermētiti ⁹	489	Coriandrum	269
Cinabaris	472	Coria veteramenta	
Cinnamomum	18	ria	110
Cionia	118	Coriarius frutex	98
Circaea	298	Coris	316
Circium	374	Coronopus	188
Cistus	84	Cornu cerui	134
Citria mala	106	Cornus	107
Clematis	321	Corruda	183
Clinopodion	286	Cos Naxia	501
Clymenon	325	Costus	21
Cnicus	414	Cotonea mala	104
Coagulum	144	Cotyledon	364
Coccū gnidion	406	Crataegonon	300
Coccū infectorium		Crimnon	165
338		Crithmum seu cri-	
Cochleæ	120	thamon	187
Cœreleus	472	Crocodilion	233
Colcicon	361	Crocomagma	29
Colligendorum ra-		Crocum	ibi.
tio	4	Croton	397
Colocasia	172	Cucurbita	190
Colocynthis	408	Cucumis sativus ib.	
Colymbades	94	Cucumis sylvestris	
Communis curatio	389		
in omnes ictus vi-		Cuminū sativū	263
		Cum	

INDEX

Oaminū syluestre	Dictanum	247
264	Dictanū Cretēse ibi.	
Cunila	244	Diphryges 479
Cupressus	73	Dipsacum 234
Curini 164. & 165	Dipsadis morsus no	
Cyclaminus	206	tē 550. ei⁹ curatio 559
Cyclaminus altera	Dorycniō 354. & 520	
207	Draba	202
Cydonomeli	435	Draco marinus 122
Cynia	415	Draconis marini i-
Cinocrambe ibid.	ctus remedia	559
Cinoglosson	378	Dracunculus 209
Cynosorchis	301	Dryini iēt⁹ notē 550
Cyparissias tithy-	eius curatio	554
malus	397	Dryopteris 413
Cyphi thimiama	27	Dulcis radix 229
Cyperus	9	E Benus 86
Cytinus	102	E Ebulum 406
Cytisus	372	Ebur 133
D	Echinus	117
D Amascena pru	Echion	330
na 118	Elaphoboscon	269
Damasonium	313	Elaterion 389
Daphnoides	384	Elatine 335
Daucus	270	Electrum 78
Delphinium	271	Elelisphacos 248
Dendroide 5 tithy-	Eleomeli	33
malus	400	Eleoselinum. 266
Deuteria	426	Elichryson 341
		Em

INDEX

Empetron	409	Fel	153
Ephemerō	361 & 519	Ferri rubigo	462
Epimedium	327	Ferula	274
Epimelis	107	Festuca	381
Epipactis	371	Fibrini testes	234
Epirotica mala	105	Ficus	113
Epithymum	409	Filicula	413
Equisetum	338	Filiy	412
Equorū lichenēs	130	Filix fœmina	ibid.
Eretria terra	502	Fimum	155
Erica	81	Flos æris	457
Erinei	114	Flos salis	486
Erinum	331	Flos pu. 101. & 102	
Eruca	193	Flos syluestris puni	
Erucae olerū	134	ci ibid.	
Erucae pignorum		Fœniculum	269
135. & 518		Fœniculum errati-	
Eruum	174	cum	270
Eryngium	238	Fœnum græcū	169
Erysimon	202	Fracinus	77
Erytrodanon	309	Fuligo è myrrha, re	
Eupatorium	335	fin. styrace	62
Euphorbium	280	Fuligo liqde pici	370
		Fuligo pictoria	505
		Fuligo thuris	62
F		Fumaria	372
Faba	170	Fungi	360. & 527
Faba Aegyptia	171		
Fæx	488		
Fagus	69	G	
Farina crasrior	165	Agatas lapis	496
		Gal	

INDEX

Galatiſtes lapis	497	Glycyſide	308
Galaxias	ibid.	Gnaphalium	297
Galbanum	281	Gnidiũ granũ	405
Galerita	133	Gobius	127
Galion	366	Gramen	332
Galiopſis	ibidem	Gramen arundina-	
Galla	97	ceum	ibidem
Gallina	130	Gramẽ Parnaſi	ibi.
Gallinæ cerebellũ		Groſſi	114
ibidem		Gũmiamygdalẽ	109
Garum	127	Gummiceraſi	104
Genitale cerui	130	Gypſum	489 & 528
Gentiana	227	H	
Geranion	297	H Aematites	495
Geodes lapis	502	H Hæmorrhoi i-	
Gingiberis	204	ctus notẽ 550. & 554	
Gingidion	192	Halica	166
Gith	276	Halicacabõ ſolanũ	
Gladiolus	328	353	
Glans	96	Halimus	82
Glans Iouis	97	Harundo	79
Glãs Sardiana	ibi.	Harũdo Cypria	ib.
Glãs vnguẽtaria	394	Harũdo valla	ibid.
Glaſtũ fatium	222	Hæſtula regia	211
Glaſtũ ſylueſtre	ibi.	Hedera	219
Glaucium	283	Hedýſaron	303
Glaux	382	Helcyſma	466
Gluten piſciũ	284	Helenium	29
Glutinum	283	Heleniũ alterum	30
		Helio	

INDEX

Heliotropium ma- gnum	415	Hyacinthus	344
Heliotropiū parū	416	Hydromeli	428
Helleborū albū	385	Hydromelon	435
Heleborū nigrū	386	Hydropiper	204
Helxine	335 & 362	Hyoscyamus	349 & 523
Hemerocallis	299	Hypecoon	349
Hemionitis	305	Hypericon	314
Herba Sabina	74	Hypocistis	84
Hieraciū magnū	266	Hyslopum	243
Hieraciū parū	ibi.	I Aspis.	491
Hippace	140	I Iberis	116
Hippocampus	118	Ibiscum	311
Hippoglosson	378	Idæa radix	337
Hippolapathon	179	Iecur apri	123
Hippomarathrō	270	Iecur asininum	ibi.
Hippophaës	396	Iecur canis rabidi	ibi.
Hippophæston	ibid.	Iecur caprinum	ibi.
Hippopotami testes	124	Iecur mergi	ibi.
Hippofelinon	267	Ilecebra	364
Hirci Barbula	194	Ilex	96
Hirculus	12	Indicum	471
Hirundines.	133	Inguinalis	371
Hirudo	531	Intybus	189
Holostium	324	Iouis glans	97
Hordeum	163	Irio	262
Horminum	302	Iris	1
		Isopiron.	371
		Iud.	

INDEX

Judaicus lapis	498	Lacerpitium	ibi.
Juglandes nuce	110	Lathyrus	401
Juncus	340	Lauer	186
Juncus odoratus	22	Laurus	76
Juniperus	74	Laurus Alexandri-	
las piscium	127	na	384
Ixia	232	Lauri baccae	77
		Lemnia terra	474
L		Lens	172
L Abram Vene-		Lens palustris	363
L ris	234	Lentiscus	65
Labrusca	418	Lentiscina	refina
Lae	137		69
Lac coagulatu	529	Leontopetalon	287
Lac humanum	139	Leontopodium	378
Lac sciston.	137	Lepidium	216
Lactis serum	138	Leptocarya	110
Lacerta	136	Lepus marinus	127
Lactuca sativa	191	&	530
Lactuca sylvestris		Lepus terrestris	123
ibidem		Leucacantha	237
Ladanum	85	Leucanthemon	306
Lagopus	327	Leucas	288
Lampfana	179	Leucoion	299
Lana	142	Lichenesequorum	30
Lana cremata	ibid.	Lichen	340
Lanaria herba	205	Lignorum marcor	
Lappa	381		79
Lapathum	178	Ligusticum	252
Lacer	277		Ligu

INDEX

Ligustrum	83	Magnes	497
Lilium	288	Malabathrum	16
Liliū sylvestre	299	Malicorium	102
Limonion	327	Malua	180
Lingua bubula	377	Malum	104
Linozostis	414	Malum Armeniacū	
Linum	169	106	
Lithocola	501	Malū cotoncū	104
Lithospermon	390	Malum dulce	105
Locustæ	132	& 106	
Lolium	167	Malū Epiroticū ibi.	
Lonchitis	310	Malum Medicū ibi.	
Lora	422	Malū orbiculatum	
Lotus arbor	107	ibid.	
Lotus ægyptia	373	Malum Persicū ibi.	
Lotus sylvestris	372	Malum præcox ibi.	
Lotus urbana	ibid.	Malum punicū	101
Lupinus	175	Malū sylvestre ibid.	
Lichnis coronaria		Mandragoras	355 &
	288	524	
Lychnis sylvestris		Manna thuris	62
ibid.		Marcor lignorū	79
Licium	88	Marū	253
Lycopſis	330	Marrubium	290
Lygos	92	Marrubiū nigrū	289
Lyſimachia	320	Mastiche	66
M		Meconium	524
Acēr	78	Medica	195
Mænæ	126	Medica ma' 1	106
		Me	

INDEX

Medion	327	Molybdæna	465
Medulla	152	Molybdoides lapis	
Mel	159	464	
Mel heraclion	521	Morochthus	497
Melampsythium		Morus	III
422		Mullus	124
Melanteria	477	Mulsum	427
Melanthium	276	Muralis herba	362
Melia terra	505	Muria	486
Melilotos	252	Mures	137
Melimela	105	Muris auricula	
Melissophyllō	290	222	
Melitites lapis	497	Mus araneus	137
Melomeli	435	Muris araneus iētus	
Memphites	499	notæ	554
Mentha	248	eius curatio	561
Menthastron	ibid.	Muscus	25
Meon	8	Muscus. marinus	
Mercurialis	414	367	
Mergi iecur	129	Mustela	125
Mespilus	106	Myagron	374
Metopiō vnguentū		Miosotis	222
51		Mirica	80
Milium	167	Myrrha. Bœothica	
Millefolium	373	56	
Millepedæ	128	Myrrhis	373
Misy	477	Myrtidanum	103
Mituli	119	Myrtus sativa	102
Moly	256	Myrt ⁹ sylvestris	383
		b b. Nap	

INDEX

N		Olea syluestris	93
Naphtha	72	Oleaster	ibid.
Napus	177	Oleę ethiopice lacry	
Narcaphthon	26	ma	95
Narcissus	395	Olei vires	30
Nardi genera	10	Oleū amygd.	34
Nardum celticū	12	Oleū balaniū	35
Nardum montanū		Oleum cicinū	33
13		Oleū cnicinū	35
Nardinum vnguen		Oleum egnidio gra	
tum	53	no ibidem	
Nasturtium	200	Oleum hyoschyami	
Natricis ictus notæ		num	ibidem
554 eius curatio ibi.		Oleū laurinum	36
Nepeta	249	Oleū lentiscinū	37
Nerion	350	Oleum mastichinū	
Nitrum	487	ibidem	
Nitropuma	ibid.	Oleum melanthinū	
Nux auellana	110	36	
Nux iuglans	ibid.	Oleū melinum	105
Nux pinca	64	Oleū myrteum	36
Nymphæa	303	Oleum oliuæ syluæ	
O		stris	31. & 95
O Chra	472	Oleū ophacinū	30
Ocymastrum		Oleum picinū	70
351		Oleum raphaniū	
Ocymum	193	35	
Oenāthe	298. & 419	Oleum Sicyoninū	
Ocypum	143	32	
		Oleu	

INDEX

Oleū sinapinum	35	Oryza	168
Oleū styracinū	57	Osisifragus	133
Oleū terebinthi.	37	Ostracites	501
Oliuæ colymbades		Osyris	382
94		Othonna	221
Oloschoenos	348	Ouorū natura	131
Olusatrum	267	Oui candidū ibidē	
Omphacium	420	Oxalme	432
Omphacomelites		Oxylapathum	178
435		Oxymyrline	383
Onagra	374	P	
Onitis	245	P Aederota	236
Onobrychis	314	P Pæonia	308
Ononis	237	Paliurus	82
Onosma	303	Palma	99
Onix 119. &	498	Palma elate	100
Ophioscorodō	198	Palme Thebaice	99
Ophites lapis	500	Panaces Asclepij	
Opium	346	259	
Opobalsamum	23	Panaces Chironiū	
Opopanax	257	ibidem	
Oribiculata mala		Panaces Heracleū	
105		257	
Oreoselinum	267	Panchracion	214
Origanum	244	Panicum	167
Origanū sylvestre		Papauer cornicula-	
ibidem		tum	348. & 525
Ornithogalum	194	Papauer erraticum	
Orobanchē ibidem		345	
		bb	2 Pa

INDEX

Papauer fatium i-	Peucedanum	275
bidem	Phalangium	292
Papauer spumeu 349	Phalangij morsus	
Pappi	532 notæ 554 eius cu	
Papyrus	80 ratio ibidem	
Paralios	399 Phalaris	309
Pardalianches	356 Pharicon	525
Patonychia	341 Phasiolus	174
Parthenium	307 Phænicobalanus	99
Passum	422 Phœnix	337
Pastinaca herba 260	Phrygius lapis	493
Pastinaca marina	Phu	15
123	Phycus marin ⁹	367
Pastinacæ marinæ	Phyllitis	291
ictus notæ 554	Phyllirea	84
eius curatio ibid.	Phyllon	300
Pedicularia herba	Phyteuma	378
391	Picea	64
Pelecinon	303 Picis liquidæ fuligo	
Peplis	412 70	
Peplos	ibi. Pineæ nuces	65
Pepo	190 Pinorum erucæ	134
Periclymenon	325 & 518	
Peristereon	343 Pinus	64
Persea	116 Piper	201
Persica mala	106 Piscium ius	127
Personata	371 Pissasphaltos.	71
Petasites	ibid. Pisselæon	70
Petroselinum	267 Pistacia	109
	Pi	

INDEX

Pityusa	401	Prunus, pruna	108
Pix liquida	69	Pseudobunion	376
Pix arida	71	Pseudocasia	17
Plantago	185	Pseudocinnamomū	
Platanus	77		20
Plumbago	465	Pseudodiſtamnū	
Plumbum elotum	247		
462		Pſoricon	476
Plumbum vſtum		Pſychotrophon	318
463		Pſyllion	351
Plumbi recremen-		Piarmica	205
tum	466	Pulegium	246
Pnigitis terra	504	Pulegium ſylueſtre	
Polemonia	322	ibidem	
Polion	293	Pulticula	166
Polycnemon	286	Pulmones anima-	
Polygala	382	lium	128
Polygonaton	321	Pumex	483
Polygonon	320	Purpura	118
Polypodion	413	Pygnochomon	407
Pompholyx	452	Pyraſter	106
Populus alba	78	Pyrethrum	270
Populus nigra	ibi.	Pyrites	494
Porrum capitatum		Pyrorū genera	106
196			

Portulaca	183
Potamogeton	368
Poterion	235
Propolis	162

Q	Vercus	96
Q	Quinquēfo-	
lium		336
bb	3	R

R		Rosci pastilli	88
R Adicula	205	Rosmarinus	272
Radix	177	Rosmarinum coro-	
Radix dulcis	229	narium	273
Radix sylvestris	178	Rubeta	331
Rana	126	Rubia	309
Rana palustris	131	Rubigo ferri	462
Ranunculum	216	Rubrica fabrilis	
Rapum	176		474
Recondendorum ra-		Rubrica Sinopica	
tio	5	ibidem	
Recrementum plu-		Rubus canis	83
bi	464	Rubus	334
Resinæ variæ	67	Rubus Idæus	335
Resina lentiscina	68	Rumex	178
Resina liquida e pi-		Ruscum	383
nu & picea	67	Ruta	254
Rha	226	Ruta sylvestris	256
Rhamnus	81	S	
Rhaphanus	177	S Abina herba	74
Rhaphanus sylue-		S Saccharum	160
stris	177	Sacra herba	343
Rhaponticum	226	Sagapenum	279
Rheon	ibidem	Sal	484
Rhodia Radix	338	Salis flos	486
Rhododendron	360	Salis spuma	ibide
Rhus	98	Salamâdra	135 et 519
Ricinus	397	Saliuaris	271
Rosa	87	Saliunca	12
		Salix	

INDEX

Salix	92	Scincus	135
Salvia	248	Scolopendra	122
Sambucus	406	Scolopendrar ictus	
Samia terra	503	notæ. 554. eius cu-	
Samius lapis	ibid.	ratio ibidem	
Sampfuchum	251	Scolymos	235
Sandaracha	480. &	Scordion	294
530		Scorodoprasum	
Sandix	470	199	
Sanguinaria	320.	Scoria plumbi	464
Sanguinaria foemi-		Scorpioides	416
na	321	Scorpius marinus	
Sanguis	254	121	
Sanguis tauri	528	Scorpius terrestris	
Sapa	422	ibidem	
Sapphirus	499	Scorpij ictus notæ	
Sarcocolla	283	554. eius curatio	
Sardianæ glâdes	97	ibidem	
Sardonias	523	Securidaca	303
Sarmētiti ⁹ cinis	489	Sedum magnum	
Satureia	250	363	
Satyrion	302	Selenites lapis	499
Satyrion erythro-		Selinusia terra	504
nion	ibid.	Semen	165
Scammonia	403	Semperuium	363
Scandix	192	Semperuium mi-	
Schisthum lac	138	nus	364
Schistos lapis	496	Senecio	366
Scilla	213	Sepia	124
		bb 4	Sep

INDEX

Seps	136	Sitania	163
Seris	189	Smarides pisces	126
Serpyllum	251	Smilax 195. 359. &	
Sertula campana	523		
252		Smilax aspera	382
Serum lactis	238	Smilax lævis	383
Sesama	167	Smyris lapis	501
Sesamoides	388	Smyrnion	268
Seseli	261	Solanum hortensio	
Seseli Aetiopicū ib.	352		
Seseli Creticū	262	Solanum manicum	
Seseli Peloponense	355		
ibidem		Solanum somnife-	
Setanium	107	rum ibidem	
Sicyonium oleum		Sonclus	188
32		Sorba	107
Sideritis	332	Sory	478
Sidion	101	Sparganion	328
Siligo	166	Spartion	394
Siliquæ	104	Spatha	100
Silphium	277	Spondilyon	274
Silurus	126	Sphragis ægos	475
Silybum	394	Spina acuta	83
Sinapi	199	Spina alba	234
Sion	186	Spina Arabica	235
Sifer	178	Spongiæ	491
Sifon	262	Spongiarum lapi-	
Sisymbrium vtrun-		des	500
que	186	Spuma nitri	487
		Spum	

INDEX

3	Spuma salis	485	Symphyton	325
6	Spuma argenti	466		
2	& 529			

T

2	Squama æris	458		
3	Squamma exacie de		T	Alus suis 133
1	cussa	459		Tamarix 80
	Stachys	291	Taxus	359 & 523
	Stacte	52	Tauri sanguis	520
	Staphis agria	391	Telephion	223
	Stercus ferri	462	Tellinæ	119
	Stibium	465	Terebinthus	67
	Stimmi	ibidem	Therebinthina	ibi.
	Stœbe	324	Terræ	502
	Stœchas	244	Terra fornacū	504
	Stomoma	459	Testæ	ibidem
	Stratiotes	368	Testiculus canis	301
	Stratiotes millefo-		Teucrion, Teucris	
	lium	ibidem		287
	Strigmenta balnea		Thalassomeli	429
	rum	32	Thaliætron	367
	Struthia cotonea		Thapsia	392
	105		Thelygonon	300
	Struthion	205	Thlaspi	201
	Stirax	57	Thracias lapis	496
	Succinum	78	Thunnus	127
	Suillus pulmo	128	Thus	59
	Suillus talus	133	Thuris	cortex
	Sulphur	482	61	
	Sycomorus	112	Thuris fuligo	62
			bb	5 Th

I N D E X

Thuris māna	ibid.	Veratrū nigrū	381
Thyites lapis	498	Verbascum	364
Thymelæa	405	Verbenaca	341
Thymoxaline	432	Vermes terreni	136
Thymus	250	Vesparum ictus cu-	
Tithymali	397	ratio	554
Tordylion	262	Vesicaria	351
Torpedo piscis	122	Vetonica	319
Toxicon	525	Victus ratio in mor-	
Tragacantha	237	fu rabiosi canis	
Tragium	339	548	
Tragoriganum	245	Vimen	91
Tragos	166. &	339	Vina marina 434
Tribulus	326	Vina picata	441
Trichomanes	380	Vina resinata	419
Trifolium	293	Vini natura	421
Trimestria	162	Vinum abiegnum	
Triphyllon	293	439	
Tripolion	379	Vinum abrotoni-	
Trillago	287	tes	445
Triticum	162	Vinum absynthites	
Tuber	195	242. & 441	
Tussilago	295	Vinū acorites	447
Typha	297	Vinum adynamō	

V

426

V	Enenata	553	Vinū anethinū	448
	Veneris vmbi		Vinū apijtes	436
	licus	364	Vinū aromatit.	441
	Veratrū albū	365	Vinū asarites	447

Vu

INDEX

Vinū bunites	444	448	
Vinum calaminthi-tes	445	444	Vinum è marrubio
Vinum catorchites	438		Vinū melites 435
			Vinū melitites 427
Vinū cedrinū	440		Vinū melomeli 446
Vinū cedrites	441		Vinū è myrrha ibi.
Vinum cestrites	443		Vin. myrsinites 437
Vinum chamædry-tes	ibidem		Vinū myrtites ibi.
Vinū è carnelea	448	stri	Vinū à nardo sylue 447
Vinū chamæpity-num	ibidem		Vinū nectarites 446
			Vinū cenāthinū 436
Vinū è coniza	445		Vinū ōphacites 425
Vinū cupſinū	440		Vinū palmeum 438
Vinū cydonites	435		Vin. origanites 445
Vinū daucites	447		Vinū panacites 447
Vinū dictānites	444		Vinū phthoriō 448
Vinū è dore ſalis	447		Vinum è petroseli-
Vinū helleborites		no	ibidem
	449		Vinū picatum 441
Vin. hyſſopites	443		Vinum pineū 440
Vinū ex iride	446		Vinū è pipere 446
Vin. iuniperinū	440		Vinū è pulegio 445
Vinū laurinū	ibidē		Vinū reſinatū 439
Vinū lentifcinū	438		Vinum rhodites
Vinum mandrago-rites	449	436	
Vinum marathrites			Vinum rhoetes ibi-
			dem.

Via.


INDEX


Vinū saluiatū	447	Vitis nigra	410
Vinū è satureia	444	Vitis syluestris	410
Vinum scammoni-		Vitis vinifera	417
tes	450	Vitex	91
Vinū scillinum	432	Vlmus	79
Vinū felinites	447	Vmbilicus ven.	364
Vinum stœchadites		Vnedo	108
	443	Vnguētor. ratio	38
Vinum strobilites		Vng.abrotoninū	43
	440	Vng.amaracinū	50
Vinum è sycomoris		Vng.anethinū	44
	439	Vng.butyrinū	47
Vinū è Syriaca nar-		Vng.cīnamomi	51
do, celtica, mala-		Vng.crocinum	46
bathro	446	Vng.cyprinum	47
Vinum terebinthi-		Vng.elatinum	40
num	457 & 438	Vng.gleucinum	50
Vinū thymites	444	Vng.hedycroon	51
Vinnū è thymelæa		Vng.iasminum	54
	448	Vnguentum irinū	
Vinum tragorigani			48
tes	444	Vnguē. lilinum	44
Viola alba	299	Vnguentum mala-	
Viola purpurea	375	bathrinum	54
Viperę ict⁹ notę	554	Vng.megalinū	51
eius curatio ibid.		Vng.melinum	40
Viperinę carnes	122	Vng.mendesium	52
Viscum	284	Vng.metopion	51
Vitis alba	410	Vng.narcissinū	46
		Vng	


INDEX

Vnguentum nar-	Vrtica	365
dinum	55 Vftio contra vene-	
Vnguentum ocimi-	natos ictus	546
num	43 Vua	418
Vnguentum cenan-	Vua paffa	419
thinum	41 Vulpin ⁹ pulmo	128
Vng. onychinū	47 X	
Vng. rofaceum	39 X Anthion	381
Vnguentū fampf-	X Xyphion	328
chinum	42 Xylobalfamon	23
Vng. ftyracinū	47 Xylocinnamomon	
Vng. fufinum	44 18	
Vng. telinum	41 Xyris	328
Vngula afini	103 Z	
Vngula capræ ibid.		
Vnguis odoratus	Z Ea, feufemē	165
119	Z Zopiffa	71
Vrina	158 Zythum	164

FINIS.









P E D A C I I

DIOSCORIDIS

A N A Z A R B E I, D E

Medica materia, libri
primi Præfatio.



Vanquam, (amicissime
Aree), complures nō ve-
terum modò, sed recentio-
rum quoque, de medica-
mētōrum compositione,
viribus, atque probatio-
ne scripserunt: nobis ta-

men nec vanum, nec à ratione abhorrentem im-
petum animi ad hoc opus incessisse, tibi ostende-
re tentabimus. propterea quòd eorum nonnulli
absolutū nihil ediderūt, alij plurima, vt ex nar-
ratione acceperant, scriptis tradiderūt. Siquidē
Bithynus Iolas, & Heraclides Tarētinus, omif-
sa prorsus herbarū tractatione, rem ipsam pau-
cis perstrinxerunt. neque uerò omnes illi de me-
tallicis quicquam rebus, aut odoramētis memo-
ria prodiderunt. Crateuas autem herbarius, &
Andreas medicus, qui ceteris diligentius hac in
parte uersati uidentur, radices multas apprimē
vtilēs, herbasq; aliquas haud quaquā adnota-

tas reliquerunt. Veruntamen priscorum sub-
scribere oportet sententijs: quos, et si pauca ipsi
referantur accepta, magnam tamen impedisse
diligentiam constat. Iunioribus minus assenti-
dum: è quibus est Iulius Bassus, & Niceratus,
& Petronius Niger, & Diodotus, Asclepiada
omnes, qui medicinalem materiã vernaculam
cognitamq; vulgò, dignam censuerunt, qua ab
ipsis literis exactè mandaretur: & vt medica-
mentorũ, probationesq; cursim cõplexi, sic nullo
experimento eorum effectus colligentes, inani
verò reddendarum causarum studio verba sun-
dentes, alia interdum pro alijs scriptando, rem
in acervum congeriemq; controuersiarum extu-
lerunt. Siquidem qui inter eos egregius habetur
Niger, euphorbium nascẽtu in Italia chamelaa
succum esse contendit: androsamonq; eadẽ her-
bam cum hyperico esse: quinetiã aloẽ in Iudaa
fossibile nasci, & pleraque his similia falso ex-
ponit, quæ prorsus veritati refragantur. Qui-
bus coniectura colligi potest, ea non oculata fide,
sed narratione potius ab alijs accepisse. In ordi-
ne praterea ydem ipsi aberrarunt, partim eorũ
discrepantes, nullaq; cognatione coniunctas vi-

Dioscori- res collidentes: partim per elementa literarum
du cogno- scripta in ordinem digerentes, quo facilius me-
scendorum moria mandarentur, genera & eorum effectus
simpliciũ à sua cognatione disiungentes. Nos verò ab in-
studium. eunte, vt ita dica, inuenta, iungi desiderio cogno-
scendo

scanda materia allecti, multis regionibus peragratis (nec enim nescis nos militarem vitam exegisse) tuo hortatu commentationem in sex libros cōtulimus. Quod opus tibi dicamus, Aree, animi gratitudine obsecuentes, ob eum quo nos prosequeris affectum. Etenim natura cū in omnes eruditione excultos, tum verò in eos, quibus cum tibi eiusdē artis necessitudo intercedit, pronus ad amicitiam esse soles, in nos etiam aliquantò peculiaris. Enimvero non parum præbet tux probitatis argumentum, optimi viri Licinij Bassi singularis erga te amicitia: quā vnā nobiscum degetes nouimus, cū mutua inter vos beneuolentiam amulatione dignam intue-remur. Admonitum autē te velim, eosq; qui in hosce commentarios incident, ne in verbis facultatem nostram aestimetis, sed potius adhibitā rebus cum peritia curā. Etenim plurima visu ipsi exactissimè cognouimus, quādam etiam ex ea, de qua inter omnes conuenit, hystoria, percunctationeq; rerum apud singulos vernacularum, diligenter accepimus. Dabimus igitur operam, vt differenti ab alijs ordine tradito, genera singularum medicinarum: viresq; describatur. Quod autem necessaria sit medicamentorum doctrina, nemo est ferme qui ignoret: quod ea & toti arti conuēta sit, vniuersisq; eius partibus efficax administret auxilium. Quare per medicamentorum compositiones, atque misturas, & facta

in morbis pericula extendi, & incrementū capere potest, plurimum conferente singulorum medicaminum cognitione. Quinetiam vernatulam, familiaremq; materiam cōplectemur, ut perfecta sit, quæ à nobis relinquetur, doctrina. Verū in primis curam impendere oportet, ut suis temporibus singula & demetantur, & recordantur. Certè pro horū ratione medicamēta aut valent viribus, aut euanido nulloq; munere funguntur. Serena igitur calī constitutione demetenda sunt, magni siquidē refert inter colligendum, si vel squalores, vel imbres infesti sint: quē admodum si loca, in quibus prodeunt, clivosa, & ventis exposita sint, & perflata, frigidaq; & aquis carentia, in his enim locis vires eorum longē validiores intelliguntur. Contrā, quæ in campestribus, riguis, & opacis, caterisq; locis vento silentibus enascuntur, plerunque degenerant, & minus viribus valent: multoq; magis, si non suo tēpore, nec opportunē colligantur, aut si per imbecillitatem intabuerint. Neque ignorandum, ea sepe pro peculiari loci natura, aut anniclementia, maturius, aut serius adolefcere. non-

* *Planta*, nulla propria vi hyeme florent, & folia pariunt: ut exactē quadā bis anno florifera. Quare cui in animo cognoscian est horum peritiā assequi, necesse est eum primatur omni germinatione solo emergentibus, adultis, & senescentibus adesse. Nā qui pullulanti herba dispiciendæ, taxat adstiterit, adultam cognoscere nō potest: neque

neque qui adultā tantū inspexerit, nuper erumpentē noscet. Quo fit, vt propter mutatā foliorum faciē, caulium proceritates, florū seminisq; magnitudinem, & id genus alias peculiare notat, nonnulli, qui olim has rerū varietates non perspexerunt, magno in errore versentur. Quæ causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, verbi gratia, gramē, quinque folium, & iussilaginē emittere florem, fructū, & caulem negant. Ergo qui sapius ad visendas herbas, & earum natales se contulerit, earū cognitionem maximè consequetur. Scire etiānum conuenit, sola ex herbaceis medicaminibus veratri genera, nigrū inquā, & candidū, multis edurare annis: reliqua à trimatu inutilia. Quæ verò fruticosa sunt, sicut stæchas, trissago, polium, abrotanū, seriphum, absinthium, hyssopum, & alia id genus semine prægnantia demetantur. Flores quoque antea, quā sponte sua decidāt. Fructus autem, vt maturi decerpantur, necesse est: & semina, vbi siccari cœperint, priusquā defluāt. Herbarum succus, & foliorum elici debet, germinatibus tum primum cauliculis. Lac, & lacryma excipiantur, inciso per summū adolescentiæ vigorem caule. Radices, & liquamenta, corticē sue vt recondantur, eximere conuenit, cum herbe suis folijs exuuntur. siccantur etiam expurgatæ inibi, locus asperginem non redolentibus: sed quæ luto, aut puluere sunt obsitæ, aqua

elui debet. Flores, & omnia, quæ iucundū odore efflāt, arculis tiliaceis, nullo situ obductis, reponantur. Nonnunquā charta, aut folijs semina, vt perennent, aptè inuoluuntur. Liquidis medicaminibus densior materia, argētea, vitrea, aut cornea cōuenit. Fililis etiam, si modò rara non sit, accommodatur: & lignea, præsertim ē buxo: sed anea vasa ocularijs medicamentis, liquidisq; & omnibus ijs, quæ aceto, pice liquida, aut cedria componūtur. Adipem autem, & medullas stagnis vasis recondi conuenit.

Iris.

CAP. I



Ris à cœlestis arcus similitudine nomē accepit. Folia fert gladioli, sed maiora, latiora, & pinguiora. Flores † in summitate cuiusque caulis, aequalibus inter se

spatijs distant, incurui, varij: siquidem candidi,

• *μήλινα*, pallentes, & lutei, purpurei, aut carulei cōspiciuntur: quæ diuersi coloris specie, quædā cœlestis arcus imago representari videtur. Radices subia-

• *τερεαὶ* id cent gemiculatæ, & solidæ, odoratæ: quæ si iustatim est, solida. dissectæ, in vmbra succātur, & traiectæ lino re-

• *τὴν γέν-* conduntur. Melior est Illyrica, & Macedonica:

• *σεῖ πύργω* & inter has laudatissima, quæ mutila seret, &

• *πίσσα*, id est densa cōstat radice, frangētī contumax, subrufo

gustu fer- colore, gustu amaro, odore perquā grato, & syn-

uentiore. cero, ita vt nullum prorsus sitū redoleat: quæ dū

tunditur, sternutamenta mouet. Secundū locum

habet

habet Africana. candicans, gustuq; amara. Tere-
dines in vetustate sentiunt: tunc tamen odora-
tiores reddi solent. Vis omnibus, exalfactoria,
extenuās, contra tuſſim efficax, humorum, qui
agere reſciuntur, craſſitiem digerunt: bilem, craſ-
ſamq; pituitam ex hydromelite drachmis ſeptē
epotæ purgant: ſomnū conciliant, lacrymas ciūt,
torminibus medētur. Eadē potæ ex aceto auxi-
liantur ſerpētū ſcibibus, lienosis, cōuulſis, pſictio-
nib. horroribus, & quibus genitura eſſluit, mē-
ſes ex vino potæ pellunt. Dococolum earum, fæ-
minarum fotibus vtiliter imponitur, ad emol-
liendos locos, laxandaq; in eis venarum ſpiracū-
la: iſchiadicis infunditur: fiſtulas, ac ſinus carne
explet. Radices ex melle glandis modo ſubditæ,
partus extrahunt: quinetiam coctæ & illitæ,
ſtrumas, veteresq; duritias emolliūt. Sicca quo-
que vlcera replent, & cū melle purgāt: nudatæ
oſſa corpore operiunt: doloribus capitis cum ace-
to, & roſaceo magna vtilitate illuminantur. Ad-
mota cum albo veratro, & duabus mellis par-
tibus, lentigines & vitia cutis in facie à ſole cō-
tracta emaculat. Peſſis, malagmatis, & acopis
inſerūtur. In vnuerſum magni ad omnia vſus.

ANNO TATIO.

† Malui hoc in loco Marcelli interpreta-
tionē ſequi, quēadmodū alibi quādoque
facturus ſum, quā Runellij, cui nō ſem-
per addictus ero: quod in aliquot Græcis

legatur ἐπίκρυα, quæ vox in summitate cuiusque caulis significare videtur, quodque natura in planta ipsa illud manifestè demonstret.

M A T.

* Censetur Galāga officinarū. Nec enim Acori genuinam aut faciem aut naturam obtinet, quam vulgus herbariorum hoc nomine solet indicare.

Acorum.

C A P.

I I.

A Corū folia iridis habet, angustiora tamen radices non dissimiles, complicatas, non rectū, sed obliquum actas, & summo cespite sparsas, geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratas. Optimum est densum, candidum, plenum, carie nō exesum, odoratum: cuiusmodi Colchidicū, & Galaticum, quod aspletior dicit. Radici vis calfactoria. Decoctū potu urinam cit: prodest lateris doloribus, & iocineris atque thoracis: itē torminibus, vulsis, ruptis. lienem absumit: urine stillicidio, & serpentū ictibus auxiliatur: insidentibus ad muliebres affectus, iridis modo, vtiliter imponitur. oculorum caligines succo discutit. Antidotis radix magnū suū commiscetur.

Meon.

C A P.

I I I.

M Eon, quod Athamanticū vocant, in Macedonia, & Hispania plurimum gignitur. Plinius a tur, anetho folijs et caule simile, sed eo crassius.

bin

binum ferme cubitorum altitudine attollitur: niso habet
 sparsis in obliquum, rectumq; radicibus, longis, ac si etiam
 tenuibus, odoratis, linguam excalfacientibus. Marcello
 Quæ feruefactæ ex aqua, vel trita citra coctio- in commẽ
 nem, præcluserum renum, vesicæq; fæctæ vitia ta. teste,
 potu leniunt: vrina difficultati medentur: sto- Græci qui
 machi inflationes discutiunt. Torminibus, affectæ dam vetu
 vuluæ, articulorũ doloribus, atque fluxionibus stissimi co
 pectoris, trita cum melle in eclegmate auxilian- dices. quæ
 tur. Sanguinem per menstrua pellunt, defectio- diuersitas
 nibus feruefactæ: infantibus autem illitæ imo facit vt
 ventri, vrinas mouent. Quod si plus quàm de- qualis her
 ceat, ex his bibatur, caput dolore afficiunt. ba sit Meo

Cyperus.

CAP. IIII.

non facitẽ

Cyperus, quẽ aliqui erysi)cepstrũ. Et aspa- quis tonie
 lathum appellat, folia fert porraceis pro- cerit.
 xima, sed longiora, & exiliora, caulem odorati
 iunci, cubitalẽ, aut maiorẽ, angulosum: in cuius
 cacumine minuta folia cũ semine exoriuntur: ra-
 dices, quarũ in medicina est vsus, coherentes in-
 ter se, oleis oblongis similes, aut rotunda, nigro
 colore, suauĩ odore, amaro gustu. In lacunosis, pa-
 lustribus, & cultis enascitur. Optima est grauis-
 sima, densa, fractu contumax, plena, & aspera,
 odoris cum quadã acrimonia incundi: qualis est
 Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladibus insulis pe-
 titur. Huic calida vis inest. Venarum spiracula
 laxat: vrinam ciet: ad calculos, aquamq; subter
 utem vtilissimẽ bibitur: aduersus scorpionum

ictus remedio est: perfrictionibus vuluæ, & pra-
 clusionibus fotu prodest: pellit menses. Contra
 vlcera oris, etiam si depascant, vorentq; farina
 eius efficax est. Malagmatus calfacientibus, &
 vnguentorū spissamētis benè adijci solet. Aliud
 Cyperi genus tradunt in India nasci, gingibe-
 ris effigie: quod manducatum, croci vim reddit,
 gustu amaro sentitur, & illitum præsentē psilo-
 thri vim exhibet.

Cardamomum.

CAP. V.

Cardamomum optimum est, quod ex Co-
 magene, Armenia, Bosphoroq; deuehi-
 tur. in India quoque, & Arabia prouenit. Eli-
 gi debet plenum, frangenti cōtumax, occlusum
 farctumq; (quod enim eiusmodi non est, ex ole-
 tum iudicatur) & gustu acre, subamarum, &
 odore caput tentans. Excalfactoriā vim ha-
 bet: potumq; ex aqua facit ad comitiales, ischia-
 duos, tusses, neruorū resolutionem: item ad ru-
 pta, vulsa, torminia: latas vētrus tineas excutit.
 Ex vino autē potū, renibus, difficultati vrina,
 à scorpione ictus, neque non omnibus venenum
 vibrantibus, auxilio est. Cū cortice radicis lauri
 epota drachma, calculos comminuit: partus sus-
 fitu enecat: scabiem ex aceto illitum adimit. Et
 ad vnguentorum spissamenta additur.

Nardum.

CAP. VI.

Dvo Nardi genera: vnum Indicum, alte-
 rum Syriacum appellatur, non quod in
 Syria

Syriā. proueniat, sed quòd montis, in quo ori-
tur, pars vna ad Syrios, pars altera ad Indos
flectitur. Ex hoc Syriaci genere, prapuum est
recens, & leue, largam gerens comam, flauum
colore, perquam odoratum, ac cyperum redolēs.
breuissica, amaro sapore, linguam siccate, quod
diu in sua odorū gratia permaneat. Ex Indico
autem Nardo quoddā Gangitis vocatur, à flu-
uio Gange, apud quem enasitur, montem præ-
terfluente: quod genus ob multam loci, in quo
prodit, viginem, viribus infirmius est, atque
procerius adolescit, plures ferens spicas, ab vnica
radice comosas, vnaq; conuolutas, ac grauitèr
olètes. Montanum autem odoratiū, spica breui
ac mutila, odore cypero vicino, ceteras habens
Syriaci dotes. Est & genus quoddam, cui Sam-
pharitico nomen locus indult, frutice breui, in
magnas se spargens spicas, candidiore interim
medio caule, hircorum virus supra modum redo-
lente: quod improbatur. Madefactum vendi so-
let, quod vitium ex eo deprehenditur, quod can-
dida sit spica, & squalida, suaq; careat lanugi-
ne. Adulteratur stibio cum aqua, aut palmeo
vino, inspissationis ponderisq; causa inspirato.
Intueri autem oportet, si lutum radicibus insti-
deat, & incerniculo puluerem excutere, eluendis
manibus vtilem. Vm habent excalfactoriam,
& exiccantem. Vrinam mouent: aluum potius
sistunt: vulua profluvia, sanienq; apposita sup-
primunt.

primūt. Nausea ex aqua frigida auxiliatur, & stomachi rossonibus, inflationi, iocinori, regio morbo, renum vitijs. Aquæ autem incocta fotu ad infaessum, vulua inflammationibus medentur, ad glabras oculorum genas valet: siquidem eas ad densiorem pilum reducant, persusis humore corporibus insparguntur. Miscentur antidotis & in fictili nouo non picato ad ocularia medicamenta reconduntur, trita in farinam, & cum vino in pastillos coacta.

Nardum Celticum. CAP. VII.

Celticum Nardum nascitur in Liguria alpibus, aliungia patrio nomine appellatum: prouenitq; in Istria. Exiguè fruticat, & cum radicibus in manualcs fasciculos componitur. Folia habet oblonga, colore in flauum languido, florem luteum. Cauliū, & radicū duntaxat vsus est, & odoris suauitas. vnde pridie fasciculos aqua abluere expedit, & exempta terra, pauito solo atque humenti, subiecta charta reponere: postridie repurgare. siquidem vtile, cum aceroso alienoq; propter humoris vim, non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus vocatur. ab odoris grauitate. Sed facilis cognitio: nanque herba candidior est, sine caule, minus oblongis folijs, radice neque amara, neque odorata: vt verum Nardum est. Itaque radices. atque cauliculi, abiectis folijs, triti secernuntur, vino excipiuntur, digerunturq; in pastil

pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, asseruari debent. Laudatur maximè, recens, iucundi odoris, radice numerosa coharēs, plenum, nec fragile. Ad eadem, qua Syriacum, pollet: sed vehementius vrinam cit, & stomacho utilius est. Inflammationibus iocinoris, & felle suffusis auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum absinthij decocto bibitur: item aduersus lienem, renum & vesicæ vitia, & venenatos ictus, ex vino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia vnguenta.

Nardum montanum. CAP. VIII.

Montanum Nardum, quod ab aliquibus thylacitis, & uiris appellatur, in Cicilia, & Syria nascitur: caule & folijs eryngio similibus, minoribus, minimè tamē spinosis, asperisq̃. Radicibus binis nititur, aut pluribus, nigris, odoratis, ceu hastula regia, sed longè gracilioribus, † & longè minoribus, neque caulem, neque fructum, neque florē profert. Ad eadem, ad quæ Celticum efficax.

ANNOTATIO.

† In Oribasio, (qui simplicium descriptiones Dioscoridi acceptas refert), legitur λευκότεραι, hoc est, candidiores. quod Nardus montana constet radicibus asphodelo non solū minoribus, & gracilioribus, sed etiam candidioribus. MAT.

*minori

* Minoribus.] Fuchſius in opere de Stip. maioribus legendum ſuſpicatur. Plinius, qui hinc omnia mutuatus eſt, mollioribus habet. quod ſane vtrunque herba, quàm aptiſſimè quadrat.

† Cytino hyoſcyami.] id eſt, flori hyoſcyami. qui veri cytini, quem domeſtica puniceæ florem eſſe nouimus, aliquam exprimit effigiem, vt in eius deſcriptione authoreſt Dioſcorides.

Aſarum.

C A P. I X.

Aſarum, quod & ipſum aliqui ſylueſtri nardum appellant, hedera ſolijs, minoribus multò, rotundioribusq; floribus cytino hyoſcyami ſimilibus, purpureis, inter ſolia proximè radicem emicantibus, odoratis: in quibus ſemen acinoſum. † Cauliculos habet anguloſos, aſperos, & molles: radices numerosas, geniculatas, tenues, obliquas, gramini non diſſimiles, longè tamen graciliores, odoratas, excaſcientes, & quæ linguam vehementer mordent. Excaſſetoriam vim habet: vrinam cit: hydropicis, & vetuſto coxendium dolori prodeſt. Radices ſemis drachmæ ex aqua mulſa potæ, menſes trahunt: & veratræ albi modo purgant. In ruguenta additur. Vmbroſis montibus prouenit: ſed plurimum in Ponte, Phrygiæ, Illyrico, & Italia Iuſtinienſi agro.

† Hæc verba vt in Ruellio inuenimus, ita reliqui

reliquimus. Sed admonendum esse lectorem duximus, ea non legi in Græcis nostris codicibus, neque à Serapione referri. quod argumēto est illa Dioscoridi accreuisse. Sunt tamen græcè sic scripta: ἔχον καυλὸς γωνιοειδῆ, ὑποτράχεια, ἀραιά. Id est: Habēs cauliculos angulosos, subasperos, raros.

ANNO TATIO.

* Maioribus] Rectius fortè minoribus legas, vt Ruellius quoque monuit. Flores siquidem Valerianæ nunc dictæ, quæ Phu esse omnes ferè suspicantur, Narcissum effigie expressissime quidem referunt: eo tamen longè sunt minores: ni fortè soli diuersitati id imputandum censeas.

Phu.

CAP. X.

PHU: (quod & aliqui syluestrum nardum appellāt), nascitur in Pōto: folio = olusatris, aut elaphobosci: caule cubitali, aut altiore, leui, * Hippe- cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis in- selms. tercepto, floribus narcisso proximis, maioribus, tenerioribus, & ex albicante purpureis, radice superius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo villosa in nigri veratri, aut iunci odorati modum: capillamentis inuicem contextis, flavescentibus, odoratis, cum quadam odoris gravitate nardum amulantibus. Excalfacit: vrinam mouet, si sicca potus detur. Decoctū eadem præstare

stare potest: ad lateris etiam dolorē efficax: menses cit, antidotis inseritur. Adulteratur radice rusci admista. Sed maleficiū deprehenditur: quoniam hæc dura est, & frangenti contumax, sine vlla odoris gratia.

Malabathrum.

C A P. X I.

Malabathrum arbitratur aliqui esse Indici nardi folium, falsi quadam odoris cognatione: permulta enim nardum olent, quemadmodum pbu, asarum, niris. Secus autem res se habet: nanque Malabathrum folium sui generis est, quod Indica gignunt paludes, lentis palustris modo innatās aquis, sine radice. Id collectū statim lino transsistitur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis aestivo feruore aquis, humū aridis fruticibus vri: quod vbi nō euenerit, ne amplius quidem renasci. Laudatur recens, ex candido nigricans, integrū, nec fragile, odore caput feriēs, quod diu in sua vi odore pmaneat, & nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmū verò, & minutim cōtūsum, psertim si cariosum virus olet, vitiosum est. Easdem nardo sortitur vires: sed efficacius omnia prastat. Vrinam vehementius ciet, ac stomacho magis prodest Malabathri vis. Lippitudinibus, inflammationibusq; tritum, & in vino feruefactum cōmodè illinitur, subditum linguae, oris halitum, & suauitatem commendat. Vestium quoque odorem interpositum seruat, & ab erosione tuetur.

Officini

ANNOTATIO.

Officinis falsò Cinnamomū hodie dicitur. Est enim earum Calsia, nō quam hic Dioscorides, cui, sicut & alijs veteribus, fuit incognita, sed Actuarius libro. de cōposit. medic. depinxit.

Calsia.

CAP. XII.

Calsia, cuius cōplura sunt genera, iuxta odoriferam Arabiam gignitur, crassi corticis sarmento: folijs piperis. Eligenda est fulvescens, pulchri coloris. corallij, amula, perquā angusta, lōga, crassa, & fistulosa, gustu mordēs, & cum aliquāto seruore adstringens, aromatica, μετὰ πο-
vinofo odore: cuiusmodi est, quæ ab incolis achy. καὶ. i. cū
appellatur, ab Alexandria negotiatoribus da- multo.
phnitis. Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, ῥιγίρ cognomine, quæ rosam odore imitatur, præcipui in medicina vsus. Secundū locū tenet antedicta. Tertia, cui Mosylitico blasto, id est, germini cognomen est. Reliquæ viles, vt quæ asyphemū dicitur, nigra, insuavis, cortice tenui, ac rimoso: & quæ darca. & citto vocitatur barbaro nomine. Similior huic est pseudocalsia, quā vt explicari possit. quæ gustu coarguitur, cū. nec acris, nec odorata sit, hærentemq; medulla corticem habeat. Inuenitur etiā lata quoddā fistula, mollis, levis, surculosa, quæ antedicta præfertur. Damnatur candicans, scabra, hircinum virus, redolēs, & quæ tenui fistula: & scabra cute sit.

b

Vim

Vim obtinet calfaciēdi, vrinā cūdi, siccandi, & tenuiter abstringēdi. Cōuenit ad medicamēta oculorū, quæ præstāda claritatis gratia concinnantur, & ad malagmata: lentigines tollit cū melle illita: mēses trahit: cōtra vituperarū ictus pota auxiliatur: aduersus intestinas inflāmatioēs oēs, & renū vitia, pota proficit: scēminis in solio desidētibus, aut suffimētis, prodest ad dilationē vuluæ. Et duplo pōdere medicamētis mixta, cinnamomi vicē supplet, si ipsum desit: nam eisdem effectus prabet. Ad plurima perquā vtilis est.

Cinnamomi. CAP. XIII.

Cinnamomi genera plura, patriū sibi nomē vēdicātia. Præfertur tamē Mosyliticū, quod cassia, cui mosyliti nomen est, aliquā refert effigiē: sed in eo genere recēs, nigrū ex vino-so in cinerē vergēs, laue, tenuibus ramulis, ac frequētibus nodis cinctū, perquā iucūdē olēs. Optimi ferē iudiciū, iucūdi odoris proprietate cōstat: inuenitur enim cum optimo, eoq; quod peculiare est, odor ruta, aut cardamomo proximus. Insuper acre, mordēs, & cū calfactione quadātenuş salsum. quod nō citō cōfrucanti asperū, aut friātī lanuginosum, lauibz tamen internodijs appareat. Si certior fieri voles, vellito ab radice surculum. facilis est huiusmodi probatio: nanque fragmenta miscellanea q̄ adā esse videntur. Quæ autē melius spirant, suo halitu, cū nares primū consuluntur, olfactū ex plantia, deterioris dignotionem

tionem impediunt. Est etiā montanū, crassum, pumilum, fuluescens admodum. Tertium à Mossylico, perquam suauiter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedentibus geniculis. Quartum fungosum, candicans, aspectu tuberosum, vile: ac friabile, magnam habēs radicem, quæ cassiam planè representat. Quintum genus odore nares feriens, subrusum, & cortice fuluæ cassiæ simile, tangētī firmum, minus neruosum, densa radice firmatum. Is quæ thuris, cassiæ, myrti aut amomi odorem spirant, minus suauitatis inest. Deligito scabrum, albū, rugosum: at laue, & lignosum circa radicem, vt inutile, reijcito. Est etiamnum simile aliud, cui pseudocinnamomo cognomen est, vile, inualidi odoris, solutarumq; viriū. Vocatur etiam Zingiber, cum tamē sit xylocinnamomum, præbēs quandā cinnamomi faciem. Est autem lignosum cinnamomū, sarmenta longa robustaq; ferens, odore longè cinnamomo inferiore. Sunt qui xylocinnamomum à cinnamomo genere differre dicant, quod à natura eius abhorreat. Cinnamomū omne excalfacit, emollit, & concoquit: vrinam ciet: tam mēses, quam partus potum, aut ex myrrba impositum pellit: contra bestias, quæ virus eiaculantur, venenaq; conuenit: caliginem pupillis oculorum obuersantem discutit: crassitiem extenuat: lentigines, & vitia cutis in facie ex melle illitum detergit: contra tusses, defluxionē, aquam subter cutem

b 2

fusam

fusam, renū vitia, & vrina difficultatē efficacē est. Vnguētis pretiosis inseri solet. Et in summa, magni ad omnia vsus. Tritum vino excipitur, vmbraq; siccātū, quò diutius eduret, recōditur.

Amomum.

CAP. XIII.

A Momum exiguē fruticat, ex ligno se conuoluens in racemi modū, flore, ceu candida viola, paruo: folijs bryoniae similibus. Laudatur quā maximē Armeniacum: colore ad aurū vergēs, ligno subrufo, abūde odorato. Medicū, quoniā in cāpestrib. & aquosis enascitur, infirmū esse constat: est autem magnum, subuiride, tactu tenerum, frutice venoso, odore origani. Ponticū verò subrusum, paruum, fragile, racemosum, fructu turgēs. & odore nares feriēs. Deligito recēs, candidū: vel subrubrū, quod nec adstrictū cohaereat, nec conuoluatur, sed solutum diffundatur. semine plenum, vuis parus simile, graue, valde odoratū: modò cariem nō cōtraxerit, acre, gustu mordēs. simplici colore nō euariante. Vim habet calfaciēdi, astringēdi, exicādi. Somnū allicit: & illitū fronti, doloris sensum aufert: inflāmatioēs, & meliceridas concoquit, discutitq;: iuuat quos scorpis percussit, ex ocimo illitū: & podagricū cōfert: inflammations oculorū, viscerumq; lenit ex vna passa: ad vuluarū vitia in pessis, aut in se sessionibus vtile est. Eecoctū iocineri, renibus, podagra, potu conuenit: Antidotis immiscetur, & pretiosis vnguentis adulteratur. Amomum herba.

herba simili, quæ Amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusmodi rerum probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem, quæ ab vna radice suos integros surculos emittunt.

Costus.

CAP. XV.

Precellit Arabicus, candidus, levis, eximia odoris suauitate, Secundum locum sibi vendicat Indicus, levis, vber, vt ferula niger. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxeus, & odore feriens. Optimus est recens, albus, abũde plenus, densus, aridus: à teredinibus non erosus, sine graueolentia, gustu calidus ac mordens. Vis ei ex calfactoria: vrinam ciet: menses pellit: vitij, quæ vuluam malè habent, tam impositu, quàm fottu, & suffitu auxiliatur. Contra viperarum morsus sextantem bibere prodest: item aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationesq; ex vino & absinthio: venerem ex mulso stimulat: latas ventris tineas ex aqua pellit: horroribus ex oleo ante febrium accessiones, & neruorum resolutionibus oblinitur: vitia cutis in facie, cum aqua, vel melle illitus, emendat. Additur in antidota, & malagmata. Sunt qui, admistis helenij Comageni præduris radicibus, adulterent. Quod deprehensu facile est: siquidem neque gustu feruet helenium, neque validum odorem vibrat, vt caput tentare possit.

Iuncus odoratus. CAP. XVI.

Odoratus Iuncus in Affrica, & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa: proximus Arabicus, quæ aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitin: pessimus ex Affrica. Eligendus est rufus, recēs, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmētis, qui manibus conficando rosea odorem emittit, ignea mordacitatis ad linguā. Floris, culmorū, radicisq; est vsus. Vin vrinæ ciūda habet: mēses pellit, discutit inflationes, caput aggrauat, modicē astringit, comminuit, excoquit, ac venarum spiracula laxat. Flos eius in potu utilis sanguinem reijcientibus: doloribus stomachi, pulmonis, iocineris, & renū. miscetur antidotis, Radix astringentior est: ideo fastidijs stomachi, hydropicis, conuulsis. drachma vnā cū pari pondere piperis, per dies aliquot datur. Decoctum vulua inflammationibus, ad rēfidentiu fatus. vtile est.

Calamus odoratus. CAP. XVII.

Calamus odoratus in India nascitur. Melior est fuluus, densē geniculatus, & qui assulosē frangitur, pleni araneorum fistula, albicans, lentus in mandendo, & astringens, cum aliquanta acrimonia. Vrinam potu ciet: quare cum graminis, aut apii semine coctus, in aqua subter cutem fusa morbo, renum vitijs, stillicidio vrinæ, ruptisq; commodē bibitur: menses & potu

potu, & appositu pellit: tussu suffitu medetur
per se, aut ex rasina terebinthina, hausto per a-
randinem fumo: ad mulieres inessus decoqui-
tur, & clysteribus imponitur. Malagmatis, &
suffitionibus odoris gratia commiscetur.

Balsamum. CAP: XVIII.

Balsamum arbor alba violæ, lycij. siue pyra-
canthe magnitudine conspicitur. Folium
rute proximum, longè candidius, perpetu òvi-
rens. In Iudæa solùm quadam valle, & Aegy-
pto nascitur: his differens modus, scabritia, proce-
ritate, gracilitate. Quod igitur tenui, & capil-
lacea coma est: theristum vocant, quasi demessi-
le: fortassis quoniam ob gracilitatem facilè de-
metatur. Aestiuus sub ortu canis ardoribus, ar-
bos vnguibus ferreis inciditur, manatque è pla-
ga succus, quem. Opobalsamū vocant: sed tam
exiguus stillatu, vt annis singulis, ne plures
quidem, quàm seni septemue congij cogan-
tur: inibiq; pondus duplo rependitur argen-
to. Succus probatio est, vt sit recens, validi odo-
ris, syncerus, non ad acorem vergens, dilui fa-
cili, leuis, adstringēs, ac modicè mordens gustu.
Sed variè vitiatu, misto ab aliquibus terebin-
thi, cypri, lentisci: balani vnguento: item susino,
metopio, melle, aut Cypria cera liquida. Quod
maleficium facilè deprehenditur, nanque merus
in laneam vestem fusus, neque maculam facit,
neque si eluatur, notā relinquit, vitiatu autem

inheret, & lac instillatus coagulat, quod adulteratus nō efficit. Quinetiam syncerus in aqua aut lacte celerrimè liquatur, coloreq; lactescit: vi-
 tiatus verò olei modo innatat, se conuoluēs, aut in stella modū diffundēs. Syncerus senescēs cras-
 scit, deteriorq; redditur. Hallucinātur, quia-
 qua concretum pessum ire, & ad ima fidere arbi-
 trantur: postea dissipatum supernatare. E ligni
 genere, quod Xylobalsamum vocant, probatur
 recens, sarmento tenui, fuluū, odoratū, quadan-
 tenus opobalsamum spirans. Necessarius etiam
 seminis erumpit vsus: quare eligatur flauū, ple-
 num, grande, ponderosum, mordens gustu, fer-
 uens in ore, modicè opobalsamū olens. Adultera-
 tur semine hyperico simili, quod à Petra oppido
 defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanita-
 te, virium ignauia, sapore piperis. Efficacissima
 vis inest succo, & quā maximè calfaciēs: abster-
 git quæ tenebras oculorum pupillis offundunt:
 medetur perfrictionibus vulua cum rosaceo cera-
 to appositus: menses quoque, secundas, & par-
 tus extrahit: horrores illitu discutit: vlcera sor-
 dida expurgat, & cruda concoquit: vrinā potu-
 ciet: agrè spirantibus prodest: datur in lacte cō-
 tra aconitū haustū, aut serpētīū ictus. Miscetur
 acopis, malagmatis, & antidoti. In summa pra-
 cipua autoritas succo: secunda semini: minima
 ligno. Semen cōmodè p̄tui datur doloribus la-
 teris, pulmonum vitijs, tussi, ischiadicis, comitia-
 libus.

libus, vertiginosis, orthopnoicis, vrinae difficulta-
 ti, torminibus, ac serpentium morſibus: ad mulie-
 bres ſuffitus perquam vtile eſt: vuluſ aperit in
 deſeſionibus balnearum decoctum, & humorē
 euocat. Lignum eaſdem habet vires, aliquantō
 minores. Ex aqua potū cruditatibus, tormino-
 ſis, vulſis, venenatorum iclibus opitulatur: vri-
 nam cit: ad capitis vulnera cum ſicca Iri conue-
 nit: ſquamas oſſium extrahit, & ad vnguento-
 rum ſpiſſamenta additur.

Alpalathus.

CAP. XIX.

Alpalathus, alijs eryſiſceptron: frutex eſt ^{ἐρυσις} ^{αλπαθός}
 ſurculoſus, multis ſpinis horrens. Naſcitur id eſt, li-
 in Iſtro, Niſyro, Syria, & Rhodiorū inſula: quo ^{γνωστός} ^{ἐστίν}
 ad vnguentorū ſpiſſamenta pigmentarij vtun-
 tur. Optimus eſt grauis, detracto cortice rube-
 ſcēs, aut in purpurā vergēs, denſus, odoratus, gu-
 ſtatu amarus. Eſt & alterum eius genus candi-
 dum, lignoſum, ſine odore: quod deterius habe-
 tur. Vim calfaciendi cum adſtrictione obtinet.
 Vnde decoctū cum vino ad tetra oris vlcera col-
 luenda cōuenit: ad nomas genitaliū, & ſordida
 vlcera infunditur: ſubiectū in peſſo, partū ex-
 trahit. Aluum ſiſtit eius decoctū: & ſanguinis
 reiectionem potu cohibet: vrinae difficultatem,
 inflationeſq; diſcutit.

Muſcus.

CAP. XX.

Brian, id eſt, Muſcus, à quibuſdam ſplachnō
 appellatur. In cedro arbore, populo alba,

b

s

o

Et quercu inuenitur. Optimum est cedrinum
proximum populneū: in quo genere candidum
et odoratius prastat: nigricās improbat. Ad
stringendi vim habet. Decoctum insidentium
vulnus vtile. Vnguento balanino, oleisq; inspisse
di gratia inferitur: thymiamatum, acoporum
compositionibus conueniens.

Agallochum. CAP. XXI.

A Gallocha lignum est, quod ex India et
que Arabia deportatur, thuiæ ligno sim-
ile, maculatum, odoratum, gustu astringens cum
quadam amaritudine: cute verius quam corte
vestitur, aliquantulum versicolore. Manducatum
aut decocto os colluitur: commendandi halitus
gratia: sudores arcet toto corpori inspersum: pro
thure ad suffimenta substituitur. Radix epon-
draichma vnius pondere, humida stomachi
tia, et imbecillitatem, feruoremq; mulcet: sile-
ris, iocinerisue dolor extrahit, si dysenteria, et
tormina infestant, ex aqua bibere prodest.

Narcaphthum. CAP. XXII.

N Arcaphthum ex India desertur, cortice
sum, simile sycomori libro: quod iucunde
odori gratia sufficit. Miscetur thymiamatum
compositis. Costrictionibus vulnus sufficit prodest.

Cancamum. CAP. XXIII.

C Ancamū Arabicæ ligni lacryma est, my-
rrha quodammodo similis, virosi gustu
quam ad suffimenta usurpant. Vestes eo, addi-

is styrace, & myrrha, sufficiuntur: Vim proditur
obtinere extenuandi obesos, si ternum obolo
rum pondere ex aqua, aut mulso aceto plusculos
dies ebibatur: lienosis datur, comitialibus, & su
spiriosis: menses cum aqua mulsa pellit: oculorū
cicatrices cōfestim emendat: vino madefactum
medetur eorundē hebetudinibus, aduersus gin
guas humore pręgnantes, doloresq; dentiū, nō
aliud efficacius. Cyphi. CAP. XXIIII.

CYphi odorati sūffimēti cōpositio est, dica
ta dīs: qua abunde Aegyptij sacerdotes
vtūtur. In antidota miseri solet: suspiriosis da
tur in potu. Per multa cōponēdi rationes, quarū
vna hæc est. Sumito cyperi dimidiū sextariū, cū
pari baccarū iuniperi adultæ modo: vna passæ
pinguis, exēptis vinaceis, minas duodecim: resi
na purgata minas quinque: calami, & iūci odo
ratorū, & aspalathi, singulorū minā: myrrha
duodecim: vini veteris sextarios novē, cum dua
bus mellis minis. Vnam passam, detractis vi
naceis, tusam cū vino, & myrrha subigito: cate
ra tusa, & cribrata adijcito: die vno humorem
cōbibere finito. dein mel coquito, dum sibi gluti
nis asiscat crassitudinem: eliquatam resinam
accuratē permisceto cū reliquis diligenter con
tritis, & in fictile vas recondito.

Crocum. CAP. XXV.

CRocum optimū in medendi vsu Coryceū,
recens, & boni coloris, paulum candidi ge

rens in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus constans, non fragile, plenum, à quo detractum est nihil, quod madefactum manus inficit, nec situm redolet, aut cariem sentit, subacrescit huius generis non est, aut vetus, aut humore perfusum creditur. Secundus locus datur Coryceo, è tractu Lyciæ contermino. Tertius Lycio, è monte Olympo. Dein ex Aegibus Aetoliæ. Cyrenaicum & Cēturipinum inter Sicilica omnia viribus infirmius est. Omnium natura oleracea. Itali tamen ob succi copiam, & coloris venustatem, tingendis mortarijs dicauerunt: quibus de causis magno venditur. Vtilissimum in medicina quod antè descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate tuso, atque etiam sapa subtiliter contrita, quò pondus adiiciatur, simul argenti spuma, aut plumbagine. Sed maleficiū declarat insidens pulvis, præsertim si defrutum in odorando subolet. Thessalus ipsum tantum odoratum esse voluit. Alij exitiosum, tribus drachmis ex aqua potis. Procul dubio vim coquendi, emolliendi, atque substringendi habet: vrinam cit, elegantem colorem præstat: qui ex passo biberint, crapulam non sentient: oculorum fluxiones illitum cum humano lacte cohibet: additur in potiones, quæ interaneorum causa temperantur: ad vulnæ etiam, sedusq; cataplasmata, vtiliter inditur: venerem stimulat: vergētes ad igne sacrum inflāmationes mulcet: auricularijs collectionib

lectionibus vtile. Quò facilius conteratur, in calido sicili sole siccari oportet, celeriterq; versari. Vrinam mouet radix ex passo pota.

Crocomagma.

CAP. XXVI.

Crocomagma fit expressis vnguenti crocini odoramentis, & in formas digestis. Optimum est odoratum, modicè myrrham olēs, graue, nigrum, ligni expers, laue, subamarum, quod madesactum croci colorem reddit, gustatimq; vehementer dentes ac linguam inficit, multis durans annis: quale est quod à Syria defertur. Habet suas vires ad delenda, quæ caliginem oculis obuersant: vrinam cit, calfacit, concoquit, & emollit. Vires croci proportionē quadamtenus representat: quandoquidem plurimam croci partem sibi Crocomagma vendicat.

Helenium.

CAP. XXVII.

Helenium folia habet verbasci angustioris folij, asperiora, oblonga: caulem quibusdam in locis non emittit: radicem subalbidam, interdum subrusam, odoratam, subacrem, vegetam, magnā: ex qua agnatæ propagines li-
liorum, aut ari modo seruntur. Montanis, vmbrosis, & siccis locis provenit. Foditur æstate radix, particulatimq; dissecta siccatur. Potum radicis decoctum menses, & vrinæ ciet. Ipsaque in eclegmate ex melle prodest tussi, orthopnœæ, ruptis, conuulsis, inflationibus, & serpentium, moribus. In summa excalfaciens est. Folia eius.

ex vino,

ex vino cocta vtiliter ischiadicis illinuntur. Helenij radix & stomacho utilis est in passo cocta, si quidem salgamarij paululum siccata eam, modo decoctam, & frigida aqua madefactam, in sapientia conijciunt, & ad vsus recondunt. Trita, potius ad cruentas excreationes efficax est. Alterum Helenij genus in Aegypto gigni Crateuas tradit. Herba est cubitalibus ramulis, serpylli modo per humum repentibus: folijs lenticulae circiter ramos, sed longioribus crebriusque; radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima tenui, superne crassiore, cortice nigro. Nascitur in maritimis collibusque. Radix una in vino epota, contra serpentium ictus auxiliatur.

Omphacinum & omne oleum.

CAP. XXVIII.

Oleum: quod ex immaturis oliui exprimitur, ad multos vsus recte valentibus accommodatissimum est omphacinum id appellatur. Praestat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale vnguentorum compositionibus idoneum intelligitur. Stomacho vtile est, quod astringat: gingiuas contrahit, dentes firmat, si contineatur in ore: sudori cohibet, quo autem vetustius, et pinguius, eo ad medicamenta aptius est. Et ut reliqua in commune dicantur (omne oleum calfacit: emollit ventrem, & perfectionibus corpus tuetur, ipsumque propterea

ad obeūda munera reddit, aluū emollit, vlcera-
tū medicamentorū vires permistū hebetat: con-
tra venena datur assidue potū redditūq; vom-
itionibus: soluit aluum hemina mensura cū parī
ptisane succo aut aqua potum: ad tormina cali-
dū simul decocta ruta tribus sextarijs in potu
datur: ventris animalia pellit: idē maximē ilei
intestini morbo laborātibus infunditur. Vetus
magis calfacit, & vehemētius discutit: oculorū
claritati subtilū confert: Si vetusti nō sit occasio,
in vase decoquitur ad mellis crassitudinem, & s
vetustatem representet.

Oleum syluestris oliuæ.

C. A. P. X X I X.

Oleum quod syluestres oliuæ fundūt, vehe-
mēter astringit, & ad sanorū vsus secun-
dū sibi locū vendicat. In doloribus capitis utili-
ter pro rosaceo substituitur: sudores arcet, de fluē-
tes capillos inhibet: fursures, vlcera capitis manā-
tia, scabiē, leprasq; abstergit: tardius canitiē sen-
tiūt, qui eo quotidie perūgūtur, Cādīdū oleū fit
hoc modo, Albū colore, nec anniculo vetustius, in
nouū fictile oris patuli funditur, cētū heminarū
mēsurā, & sub solē media quaque die cōha re-
funditur, ex astoq; demittitur, vt assidua deuo-
lutiōe, icluq; agitatū respūmet: octaua die sœnū
græcū mūdū quinquagintā denariorū pōdere,
calida aqua madesactū, donec emolescat, in su-
pradi

prædictū oleū deijcitur, ita ne extillet aqua: post
ea tede præpinguis piceæ, assulatim cæsa aequali
pondus adijcitur, & transactis octo diebus, oleū
concha mouetur. Vbi candorem contraxerit, in
vas nouum vetere vino effusum recondi debet,
substratis sertulæ Campanæ corollis drachmas
vndecim pendentibus, cum pari iridis pondere.
sin minus, rursus soli mandandum, & idem ma-
nus obeundum, vsque dum inalbescat.

Sicyonium oleum. CAP. XXX.

Sicionij componendi ratio hæc est. In lebetem
Soris lati, stanno inductum, funditur noui
olei albi, quod crudæ oliuæ reddiderunt, congius
vñus: aquæ semicongius. Leni id igne coquitur,
leniter mouendo: at vbi bis efferbuit, & subtra-
cto igne refixit, innatans oleum concha decapu-
latur, & adiecta noua aqua conferuescit, & re-
liquis, vt diximus, peractis reponitur. In Sicyo-
nia maximè fieri consuevit, Sicyonij inde acce-
pto cognomine. Calfactioriam ad quendā vsque
modum vim habet. Febri, ac neruorum vitij
prodest. fœminæ ad cōmendādū faciei nitore co-
utuntur.

Strigmentum. CAP. XXXI.

Strigmenta à balneis calfaciunt, molliunt.
discutiunt: ad sedis rimas, & condylomata
illinuntur. Illa vero, quæ ex palæstris puluerem
sibi ascuerunt, in sorāis speciem redacta, articu-
lorum modos imposita adiuuant: ischiadicis in-
form.

fotus aut malagmatis locum, calida commodè
sufficiuntur. Derasa gymnasiorum parietibus,
simulacrisq; sordes, calfaciunt: tubercula, qua æ-
grè ad coctionem producuntur, dissipant: de qua
matis, & vlceribus antiquis profunt.

Eleaomeli.

CAP. XXXII.

IN palmyris Syria, quod aleomeli vocant, ex
quodam caudice manat, olei melle crassius,
sapore dulci. Bilem, cruditatesq; detrahit, sexta-
rio cum vna aqua hemina dato. Sed qui sum-
psere, torpescunt, & viribus deficiuntur. quod
minimè vereri oportet: verum crebrò excitare,
ne veterno pressi somnos captent. Fit & oleum
è pinguitudine surculorum. Optimum vetus,
crassum, pingue, non turbidum. Calfacit: priua-
tim caliginibus oculorum illinitur: lepras neruo-
rumq; dolores illitum emendat.

Cicinum oleum.

CAP. XXXIII.

Cicinum oleum hoc modo temperatur. Ma-
turi ricini qua voles quantitate torrido
sole flaccescunt, & aliorum more cratibus in-
strati tantisper insolantur, dum vestiens cortex
fractus decidat. Caro colligitur, & coniecta in
pilam diligenter tunditur: postea in lebetem stā-
no illitum, qui aquam habeat, demittitur, sub-
iectoq; igni feruescunt: & vbi insitum prorsus
humorem reddiderunt: sublato ab igni vase, in-
natās oleum concha tollitur: & reconditur. Sed
in Aegypto, vbi largior increbuit vsus, longè
secus.

secus fieri solet. Nam repurgatos ricinos mola mandant, & accuratè mollitos per sportulā tunculo exprimunt. Tum quidem ematuruerunt: ricini, cū continentibus orbiculis exuuntur. Cuminum oleum ad psoras, & vlcera capitis mania valet: prodest sedis inflammationibus, vuluis conuersis, atque praelusis: item indecoris citricibus, & aurium doloribus: emplastra efficaciora reddit additum: potu aquam aluo extrahit: ventris animalia pellit.

Amygdalinum oleum.

CAP. XXXIII.

Amygdalinum oleum, quod aliqui metopiu vocant, hoc fit modo. Semodius ex amaris nucibus repurgatis, siccat isq; in pila lignea pistillo leniter tunditur in ossas: aqua, qua ferbuerit, sextarius adijcitur, & vbi dimidia hora humorem hauserit, vehemētius quā antea tunditur: mox tabellus premitur, et quod digitis haesit, concha excipitur. Pressis nucibus rursus hemina aqua inspergitur, & postquam ebiberint idem opus psequendum. singulas heminas reddūt singuli modij. Contra vuluarū dolores stragulatius, conuersiones, & eorundem locorū inflammationes efficax est: vitij renum, calculosis, difficili vrina, suspiriosis, lienosisq; proficit: dolores capitis, grauitatem auditus, sonos incertos, tinnitusq; discutit: maculas, & vitia cutis tollit efascie, * et eā erugat cum melle, radice lilij, et Cypria

priacera, aut rosaceo cerato: & oculorum hebetudines emendat: vlcera capitis manantia, & furfures cum vino abstergit.

Balaninum oleum. CAP. XXXV.

Simili modo fit Balaninum oleum. Quod repurgat maculas, lentigines, varos, & cicatrices nigras: aluum soluit, stomacho aduersatur: contra aurium dolorem, sonos, & tinnitus auxilio est, cum anserino adipe instillatum. Similis sesaminum ex sesamo conficiendi ratio. Fit etiam è nuce inglande oleum, quod caryinum vocant, eandem vim habet quam balaninum.

Hyoscyaminum oleum.

CAP. XXXVI.

Hyoscyaminum sic fit. Semen candidum, recens, ac siccum tunditur, & calida aspergitur aqua, vt in amygdalino diximus: dumq; insolatur, siccata, quæ sub manu sunt, partes cû reliqua massa permisceantur: hoc autem fieri oportet, dum nigrescat, & grauiter oleat: mox pressum, atque excolatum reconditur. Ad aurium dolores efficax est: pessis miscetur, ad emolliendum vtile. Fit & è grano gnidio purgato, et tuso. Vis ei aluum soluere potu. Non secus enicinû oleum temperatur. cui facultas eadem est, quæ factò è gnidio grano, verum inualidior. Rhabdianum è rhabdiani semine fieri solet, ceterorum more. Phthiriaces mala valetudine cõtractas tollit: scabritias cutis in facie emēdat. Ad obso-

nia vtuntur Aegyptij. Melanthinum idem, quod raphanium potest, eodemq; modo paratur. Tritum sinapis semen, & calida aqua mada factum, adiecto postea oleo exprimitur. Id ad diuturnos dolores efficax est: transfert humores qui in aliqua parte concreuerunt.

Myrteum oleum. CAP. XXXVII.

Myrtei faciendi ratio hac est. E myrto nigra syluestri, aut satiuā, foliorum molliora quaeque tusa premuntur: succo pares omphacini olei portiones adiiciuntur, subiectisq; carbonibus inferuescunt, donec cōcoquantur: innatū oleum deraditur. Sed longè facilius hac compositio. Tenera folia contusa coquuntur in oleo & aqua, & quod innatat, eximitur. Priuatim alij deiecta in oleum folia in sole macerant: alij prius oleum, inspissant malicorio, cupresso, cypetro, & iunco odorato. Efficacius est amarum gustu, & oleosum, viride, translucens, & olēs myrtum. Astringit, & indurat: ideo medicamentum miscetur, quæ cicatricem obducunt: prodest ulceribus in capite manantibus, ambustis igni, & papularum eruptionibus. Facit ad attrita, & fursures, sedis rimas, condylomata, articulos laxatos: corporis sudores compescit: & ad omnia valet, quæ astrictionem, inspissationemq; desiderant.

Laurinū oleū. CAP. XXXVIII.

Laurinum fit hoc modo. Lauri baccae cas

matura sunt, in aqua coquuntur: siquidē ex ob-
 ducto cortice quandam pinguitudinem reddūt,
 qua manibus subacta, concha excipitur. Alij
 omphacium prius oleum cypero, iunco odorato,
 & calamo inspissant, deinde tenera lauri folia
 concoquunt. alij etiam baccas, donec oleum odo-
 re contraxerit. alij stiracem, & myrtum addūt.
 Optima laurus ad id latifolia, & montana. O-
 leum laurinum vtilius, quod recentius, quoq; vi-
 ridius colore, amarissimum, & acre. Vis ei ex-
 calfactoria, emolliens: venarū spiracula aperit,
 lassitudines discutit: omnibus nervorum vitijs,
 alioribus, destillationibus, aurium doloribus,
 malis renū frigore contractis, illitum non aliud
 iuvantius: attamen potum nauseam parit.

Lentissimum oleum. CAP. XXXIX.

Similis Lētissimi ratio. Nā ē maturo fructu tē-
 peratur, factis prius spissamentis, vt in lau-
 rino diximus. Hoc scabiem iumentorū, canūq; sa-
 nat: vtilissimum pessis acopis, & leprarum me-
 dicamentis: sudores cohibet. Nec secus Terebinthi-
 num fieri solet, quod † refrigerat, & astringit.

† In his verbis mendum subesse puta-
 mus, vt etiam doctissimē adnotauit Ma-
 nardus Ferrariensis lib. VIII. Epist. pri-
 ma. aliās siquidem sibi ipsū repugnasset
 Dioscorides, cū scripserit in Terebinthi
 mentione eius fructus excalfacere: hic ve-
 rò dicatur, oleo ex eisdem parato inesse

refrigerēdi facultatem. Huic deprauata
lectioni illud quoque refragatur, quod
sint nobis Græci Dioscoridis codices, in
quibus verba illa de Terebinthini olei fa-
cultaribus non leguntur, sed de eius tan-
tum conficiendi ratione mentio habe-
tur.

Mastichinum oleum. CAP. XL.

MASTICHINUM ē trita sit mastiche. Quod
contra omnia vuluæ mala efficax est:
mediocriter calfacit, astringit, & emollit. Adue-
sus prominentes stomachi duritias, cæliacorum,
dysentericorumq; cruciatus vtile: faciem emacu-
lat, & colorem nitidum facit. optimum in Chio
insula componitur.

Vnguentorum compositio.

CAP. XLI.

DE ratione vnguentorum consequenter
tractandum existimauimus: quandoqui-
dem ea in nonnullis corporum vitijs, aut medica-
mentis mista, aut corpori perfusa, aut naribus
obiecta, plurimum prosunt. in quorum probatio-
nibus consulere nares oportet, an ea oleant, ex
quibus temperantur. Optimum huiusmodi
iudicium. quod tamen in quibusdam planè ob-
seruari non potest, propter ea, quæ admiscuntur
odore ceteris præualentia: vt in amaracino, &
crocino, telino, & plerisq; alijs, quæ crebra circa
hæc meditatione experiri conueniet.

Rosaceum

Rosaceum. CAP. XLII.

Rosaceum sic fit. Iunci odorati quinque libras & bessum tundito, et subactas aqua in viginti olei libris, & quincuncem subinde mouendo, coquito: dumq; percolaueris, in olei libras viginti, & quincuncem, adijcito rosas nō made-
factas numero mille, & manibus melle perungis identidem moueto, interdum premens, finito nocte tota macerari, postea exprimito: & ubi recrementum pessum ierit, mutato vase, in craterem melle illitum recondito. Caterum rosas, quae antea pressae fuerunt, in labellum demittito, & affusis octo libris & quadrante spissati olei, iterum pramito, eritq; secundarium oleum. Quod si tertias vsque, quartasue perfusiones infundens exprimere voles, secundarium fiet, tertiarium, & quartarium vnguentum. Sed quoties id feceris, vasa melle oblini debent. Si verò secundam infusionem instituere libet, in expressum oleum numero pari recentes rosas, nullo humore imbutas inijcito: manibus melle prae-
made-
factis agitans premito: & iterum tertio, aut quarto simili modo exprimens facito, totiesq; recentes rosas detractis vnguibus immittito: fiet enim ita oleum multò validius. nam septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. Prælum melle perungatur, oleum à succo diligenter secerni oportet: nā si minimū qđ relin-

6 4

quatur

quatur, vnguentum corrumpet. Alij autem de tractis vnguibus, rosas tantum oleo macerant in sole hoc modo. Rosa quæ selibram pondere aquant, in sextario olei diebus octo madescunt, et usque tertiam perfusionem quadraginta diebus insolantur, & sic oleum reconditur. Alij calamo, aut aspalatho prius olei spissamenta faciunt. Alij coloris causa anchusam admiscunt, & salis quod minus oleat. Vim astringendi, & refrigerandi obtinet fomentis: & cataplasmatibus utile. Potum soluit aluum: Stomachi ardorem restringit: vlcera caua replet, & mulcerum quæ cacoëthe vocantur: vlceribus in capite morantibus: atque feruidis eruptionibus illinitur caput dolens eo perfunditur: dentes inter initia doloris collui prodest: ad genarum duritias illitum efficax est. ad lacescita interanea, & concitatas vulvas utilissimè subijcitur.

Elatinum. CAP. XLIII.

FRacta elate, tusa, & sacrificata, in labellum deijcitur: omphacium oleum triduo infunditur, mox per sportulam exprimitur: verum partes esse debent utriusque portiones. dein mundo vase ad usus reconditur. Viribus rosaceo proportione respondet: aluum tamen non mollit.

Melinum. CAP. LIIII.

Melinum hoc modo temperatur. Oleicongius decem aquæ sextarijs admiscetur. Adijcitur elata palmarum fracta quadrās, & in

ei odorati vncia: que die vno macerata coquuntur, mox in vas oris patuli oleum excolatur, & indita arundinacea crate, aut rara tegete, cotonea mala superponuntur, & vestimentis operata tantisper inibi resident, dum malorum vires ad se oleū alliciat. Aliqui cotonea decem dierum spatio operimentis inuoluunt, vt contineatur odoris suauitas, nec euanescat: postea biduo macerata oleo exprimuntur, oleumq; recōditur. In vim refrigeratorem, & astringentem habet. Cōtra scabiosa vlcera, & quæ serpunt, ac furfures, perniunculosq; effectum præbet: exulceratis vuluis infunditur: citatam vrinam sistit infusum: sudores cohibet: contra cantharidas, buprestim, pinorum erucas, bibitur. Laudatur maxime quod cotonea mala olet.

Oenanthinum. CAP. XLV.

OEnanthe è labrusca, optimè olēs postquā emarcuit, deiecta in omphacium oleum mouetur, voluiturq;: & cum biduo manserit, exprimitur, & reconditur. Astringit, proximum rosaceo effectum præbens: sed aluum non resoluit, aut mollit. Probatissimum est, quod odore enantem refert.

Telinum. CAP. XLVI.

FOeni græci libræ quinque, calami libra vna, Cyperi libræ duæ, oleis libris nouem septenis diebus macerantur, quotidie ter mouentur, postea premuntur, & reponuntur. Aliqui pro ca-

lamo cardamomum substitunt, & cyperi loco xylobalsamum macerant. Alij oleo antea his odoribus spissato fœnum gracum macerantes expriment, Hoc telinum abscessus emollit, & concoquit: omnibus vulvarum duritijs magnopere conuenit, fœminis difficilè parientibus subiicitur, vbi præ excretis humoribus loci siccitatem contraxerunt: sedis inflammationes lenit, tenesmo subditum prodest: vlcera capitis manantia, surfuresq; expurgat: ambustis, & perniciosis addita cera proficit: vitia cutis in facie emendat: pigmētis ad conciliandum faciei nitorem inseritur. Eligi oportet recens, quod non vehementer fœni graci odorem præ se ferat, & manus abstergat, sapore ex dulci in amarum inclinato: tale enim optimum indicatur.

Sampsuchinum. CAP. XLVII.

SErpili, cassiæ, abrotoni, florum sisymbrii, frondium myrti, sampsuchi singulæ portiones, quadam pro viribus ipsorum coniectatione, vnâ tunduntur, atque is omphacini olei modus adijcitur, qui madentium vires nō euincat: hac post quatrimum exprimuntur. denuo noua alia simili mensura, & aequali tempore macerata premuntur: ita enim validius reddi solet. Eligi oportet sampsuchum colore ex atro viridi, plurimum redolens, mediocriter acre. Vim habet acrem, calfaetoriam, extenuantem: aduersus vulnæ præclusiones, conuersionesq; effi-

cax est: menses, & secundas, & partus extrahit: vulua strangulatus recreat: lumborum, inguinumque dolores lenit: sed cum melle vti eo prastat: quandoquidem vehementi astringitione locos indurat. Lassitudines illitum discutit: in opisthotonicorum, vulsorumq; cataplasmata vti liſsimè additur.

Ocimum. CAP. XLVIII.

Ocimum oleum fit vt cyprinum. Ocimi folia decerpta librarum vndecim, et beſſis pōdo, die noctuq; viginti olei libris macerato, premito, colato: cumq; exhauseris quallum, rursus parem olei modum fundito, & exprimito. Vocatur autem id secundarium: nam tertia perſuſio nis non est capax. Deinde recens ocimum aquali pondere, vt in roſaceo diximus, rursus maceratur, & cum tanto temporis ſpatio maduerit, exprimitur, & oleum reconditur. quòd si in animo fuerit ter, aut quater madefacere, ſemper ocimum recens addes. Potest ex omphacino cōfici: ſed illo modo melius. Idem quod ſampsuchinum poteſt, ſed inefficacius.

Abrotoninum. CAP. XLIX.

Olei cyprini odoribus imbuti libris nouem & quincunce, foliorum abrotoni libras octo die noctuq; madefactas, premito. Quod si in longū tempus oleum velis aſſeruari, eieclis prioribus folijs, noua appones, et maceratas exprimes. Calſacit: ad vulua duritias, precluſionesq; efficac.

efficax est : menstrua, & secundas pellit.

Anethinum. CAP. L.

Olei libris octo & dodrante, florum anethi libras undecim & bessem, maceratas in oleo die vna, manibus premito, et recondito. Quod si iterum perfundere velis, recentes anethi flores così similiter madefacito. Vulvarum duritias emollit, venarum spiracula laxat, contra horrores febrium circuitu redeuntes auxiliatur: calfacit enim, & lassitudines discutit: prodest articulorum doloribus.

Sufinum. CAP. LI.

Sufinum, quod alij lilium appellant, sic temperatur. Olei libræ nouem cum quincunce, calami libræ quinque & quadraus, myrrha vncia quinque, permixto odorifero vino decoquantur, & colato oleo, cardamomi tusi & cœlestis aqua madefacti libræ tres & semis macerantur, premunturq; tres libræ cum semisse spissati olei assumuntur. nulle lilia decerptis folijs, in latum, nō tamen profundum, labellum demittuntur: iniectum oleū manibus melle perunctis agitur: die noctuq; conquiescunt, & in pixidem matutinis exprimuntur. quod defluet oleum, protinus ab aqua, qua simul expressa fuerat, colo incerni oportet: non enim, vt rosaceum moram tolerat: nam cum calfactum feruet, & computrescit: quare sepius decipulandum. Vasa melle illinenda, tenuis sal inspargendus, & si qua sordes

vassu

vasis faucibus hæsit, eximenda. Odoramentis iam expressis ex quasillo in labellum transfusis rursum olei prius odoribus imbuendi, quod primum pondus æquet, & cardamomi tusi drachmæ decem coniiciuntur. Hæc manibus scitè pressa, interiecta breui mora exprimuntur: quod profluit, repurgatur. Tertio eadem infunduntur, adiecto cardamomo, & sale, & manibus melle madefactus. Longè optimum erit, quod prius exprimitur: secundum, quod sequitur: tertium locum sibi vëdicat, quod nouissimum prodit. Denudò in melle liliæ euulsis folijs expressum primo oleum infunditur: tum eadem ratione proseguendum, idemq; faciendum, vt prius: addito cardamomo, dein expresso, fac eadem in secundo, & tertio, vt dictum est: & quò frequentius recetis lilia maceraueris, eo validius vnguentum efficies. Denique cum factum abundè videbitur, singulis compositionibus miscere conuenit myrrha quam optimæ duas & septuaginta drachmas, & croci decem, cardamomi quinque & septuaginta. Croci verò, & cinnamomi pares portiones tunduntur, & cribrata in lutram cum aqua demittuntur, expressumq; primo vnguentum infunditur, & paulo post excipiuntur vasculis siccis, myrrha, aut gummi antea persusis, & croco, et melle, & aqua madefactus. Eadem fiunt in altera, aut tertia expressione. Aliqui simplex ex balânio, alioue oleo, & lilijis componunt. Optimum esse

esse constat in Phœnice, mox Aegypto factū, sed cum primis laudatur, quod lilia redolet. Excalfacit, emollit: vuluæ præclusiones, & collectiones aperit: vtilissimum ad muliebria mala. vlcera in capite manantia, feruidas eruptiones, varos, furfuresq; emēdat: vibices, cicatricesq; celerrimè ad colorem reducit, ita vt sæpe fallant. In summa extenuat: potum bilem per aluum extrahit, vrinam ciet: sed stomacho alienum est, & nau-seam parit.

Narcissinum. CAP. LII.

Narcissini spissamenta ita fiunt. Sex libra aspalathi cum sextante tunduntur: olei eloti libræ septuaginta cum vncijs quinq; assumuntur. Aspalathus aqua madefactus in tertia olei parte coquitur: quo exēpto, calamus quinq; libris & besse adijcitur, cū myrrhæ gleba contūditur, cribrataq; ac vino veteri odorato immista, decoquitur: simulac autē cū ijs efferbuerit, eximitur. refrigeratum oleum excolatur, cuius portio in labellum mittitur, flores narcissi quāplurimi cōijciuntur, qui bidui spatium (vt in susino dictum est) permoti exprimuntur. Oleum subinde decapulandum: siquidē celerrimè putredinē sentit. Valet hoc ad emolliendas vuluæ duritias, præclusionesq;: sed capitis dolores facit.

Crocinum. CAP. LIII.

Cum Crocinū componere voles, prius olei, vt in susino diximus, spissamenta facies, eisdem

eisdem ponderibus, & mensuris: cuius olei libras tres & semissem, croci vnciã vnã assumes: identidem quotidie moueto, & sexta die, quã hoc assiduo peregeris, oleũ à croco colis incernito, eidẽ croco parem olei modum adijcito: moue triduo, dein contusa myrrhæ, atque cribrata drachmas quadraginta permisceto, & in pila agitatũ recondito. Aliqui oleo aromatibus ad cyprinũ imbuto in crocini compositione vtuntur. Optimum est, quod abunde crocum spirat, in medendi vsu expetitur. Proximum quod myrrham refert. Calfacit, somnum allicit, quare persape phreniticis subuenit persusum, aut naribus admotum, aut illitum: pus mouet, vlcera purgat: contra vuluæ duritias, atque præclusiones, & vlcera, quæ cacoëthe vocantur, prodest cum croco, cera, medulla, duplicato olei pondere: cõcoquit enim, emollit, humectat, & permulcet. ad oculorum glaucitates ex aqua illinitur. Huic autem proportionẽ respondent butyrium, onychinũ, & styracinum: quæ etsi nominibus distāt, viribus, & compositione cognata sunt.

Cyprinum. CAP. LIIII.

Olei omphacini eloti pars vna, aquæ celestis tantundẽ cũ semisse, cuius vna parte oleũ diluitur, altera adijciendis odoramentis admiscetur. Dein assũptis asspalathi libris quinque & semisse, calami libris sex & semisse, myrrhæ libra vna, cardamomi libris tribus & dodrãte, olei

olei libris nouem & vncijs quinque, aspalathum
 tusus, & aqua affusus decoquitur in oleo, do-
 nec conseruescat: myrrha autem vino vetere odo-
 rifero subacta, contususq; simul calamus, dige-
 runtur in offulas, quæ exempto aspalatho im-
 mittuntur, & ubi efferbuerint, sublato abeno
 oleum percolatur. Cardamomum tusum reliqua
 aqua aspersum infunditur, spatha agitatur,
 nulla, dum refrixerit, interpellatione. Post hac
 colato oleo in viginti octo libras olei, floris ligu-
 stri, quod cyprum vocant, sex & quadraginta
 librae cum besse instillantur, quæ sufficienter ma-
 defactæ per sportulam exprimuntur. Quod si
 copiosius desideretur, idem recentium florum pi-
 dus iniectum simili modo prematur: & iterum
 aut tertio, si quis velit, madefacere poterit, &
 ita reddetur efficacius. Eligi oportet bonum,
 quod cum odoris suauitate nares feriat. Aliqui
 cinnamomum addunt. Calfacit, emollit: ora vi-
 narum adaperit: vuluæ, nervorumq; vitij conueni-
 nit, pleuriticis, fractisq; per se, vel cerato immi-
 stum malagmatis imponi solet, quæ opisthotomi-
 cis, angina laborantibus, inflammationiq; in-
 guinum opitulantur: item in acopa adijcitur.

¶ Irinum. CAP. LV.

Scitæ quàm minutissimè contuse sex librae
 cum besse, in tribus & septuaginta libris &
 quincunce olei, æreo vase, additis decem aqua-

hermæ

hemini incoquito, quoad odorem acceperit: postea in capulam melle oblitam colato: ex eo aromatibus imbuto oleo, irinum primò temperatur, iride ex oleo inspissato macerata, vt scripsimus. Sed alia est componēdi ratio. In olei septuaginta libris & quicunce, xylobalsami (vt dictū est) contusi libras quinque & sextantem excoquito: postea detracto xylobalsamo, tusi odorati calami nouem libras & dextantem ady cito, & mirrhæ glebam vetere vino odorato persusam, & in olei ita odoribus imbuti quatuordecim libris, totidē tusa iridis: binis diebus ac noctibus madefacito, strenuè, & vehemēter distringito. Quod si vis ualidius fieri, par pondus iterum ac tertio similiter maceratum exprimito. Longè optimum est, quod solam irin olet, quale illud est, quod in Perga Pamphiliæ, & Eliæ Achaia cōponitur. Vim habet calfacloriam, atque emollientē: crustas adimit, sordida vlcera et putrida purgat: cōfert fœminis vuluæ causarjjs: item inflāmationibus eiusdē, atque prælusionibus: partus eijcit, hemorrhoidas recludit: cōtra aurium sonitus ex aceto, ruta, & amaris amygdalis prodest. diurnis destilationibus, naribus i. litū, & contra graueolētia earum vlcera, quas oxenas vocāt, auxiliatur: aluum purgat cyathus epotus: facit ad ilei cruciatus, vrinā mouet: difficiles vomitiones adiuuat: perunctis eo digitu, & immisissis, vel ijs, quæ ad vomitū cien-

d

dum

dum induntur: angina etiam illinitur, aut ex aqua mulsa gargarizatur: item contra arteria febritiam. datur etiam ijs, qui cicutam, coriandrum, aut venena fungorum hauserunt.

Gleucinum. CAP. LVI.

Gleucinum absolutè constat omphacino oleo, iunco odorato, calamo, Celtica nardo, spatha, aspalatho, sertula Campana, costo, & musto: circumdatis interim vinaceis vasi, quod aromata, vinum, & oleum conceperat. Tricenis dieb. bis in die mouetur, postea expressum: oleum reconditur. Calfacit, emollit, remittit: horribus, & nervorum, vulvaeq; vit ijs auxiliatur: omni acopo iuuantius: quippe quodd emolliat.

Amaracinum. CAP. LVII.

Amaracinum longè optimum in Cyzico se Arisolet ex omphacino oleo, & balanino: spissamentis è xylobalsamo, iunco odorato, & calamo factis: conditisq; amaraci, costi, amomi. nardi, cassiae, carpobalsami, & myrrhae odorib. aliqui, quò pretiosius fiat, cinnamomum addunt. Iael autem, & vinum assumuntur: hoc in vasorum illitionem, illud ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinum calfacit, soporem mouet, venarum spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, urinam cit: putrilaginibus, ac fistulis perquam utile: necnon humentibus hernijs, postquam medica manus operam suam impenderit: crustas, & tetra ulcera, quae theriomata vocant rum-

pit:difficili vrinae illita sede, & eius inflamma-
tionibus auxiliatur:hemorrhoidas illitus sol-
uit:vuluae subditum mēstruos cursus euocat:du-
ritias, ac vuluae tumores discutit:vulneratis ner-
uis, & musculis confert, laneo centunculo modi-
cè madefactum, & impositum.

Megalinum. CAP. LVIII.

FActitabatur olim Megalinum, sed nunc cō-
positio exoleuit, & prorsus obliterata est.
Cuius ad hystoriae complementum meminisse nō
fuit alienum. Mistura cum amaracino eadem
erat, sed resina exuperabat, hac tantū ratione
differens. Quare leuiter emollit. Resina vnguē-
tis, neque tutela, voluptatis gratia adiicitur,
sed coloris, crassamentiq; causa. Ea tantisper
coquitur, dum desinat olere: cuius coquenda ra-
tio declarabitur, cū de resina differemus.

Hedichroum. CAP. LIX.

Quod Hedychroon vocant, in Co fieri so-
let: eisdem præditum viribus. & mistu-
ris, quibus amaracium, sed suauius spirat.

Metopium. CAP. LX.

FIt in Aegypto vnguentum, quod Metopion
patrio nomine appellatur, propter galbani
mitionem: nam lignum, in quo galbannē nasci-
tur, metopion vocāt. Cōstat amygdalis amaris,
omphacino oleo, cardamomo, odorato iūco, cala-
mo, melle, vino, myrrha, balsami semine, galba-
na, & resina. Probaturn pingue, graui odore, qđ

magis cardamum, & myrrham, quàm galbanum recipiat. Calfacit vehementer, & adurit, atque extrahit: ora venarum aperit: vlcera purgat, extrahitq; ad præcisos nervos, & musculos, ad hernias humore contractas, cum erodentibus medicamentis efficax est. ceratis, et malagmatis inseritur: horroribus, convulsisq; præsertim quibus cervix in scapulas deiecta, & retrorsum contracta est, vtile habetur: sudores ciet, vulvas spiracula recludit, & eiusdem duritias laxat. In summa molliendi naturam habet.

Mendecium.

CAP. LXI.

MEndecium constat balanino oleo, mirrha, castia, & resina. Aliqui tamen post singulorum pondera, cinnamoni exiguum addunt, nullo compedio: nam quæ simul excocta non fuerint: vim nullam exhibent. Similem metopio vim obtinet, sed inferiorem multo.

Stactæ.

CAP. LXII.

Stactæ vocatur pinguitudo recetis mirrha cum exigua aqua tusa, & organo expressa. Ea perquam odorata, ac preciosa est, atque unguentum per se facit: quod Stactæ nominatur. Maxime probatur, quæ nullam olei mistionem admixit, cuius minima portio compos est virium plurimarum. Vim calfacloriam, myrrhæ, & calidis unguentis respondentem habet.

Cinnamominum. CAP. LXIII.

Cinnamominum confit è balanino oleo: & ex ylo

exyle balsami, calami, iunci odorati spissamentis: atq; cinnamomi, & seminis balsami ni suauitate conditur, quadruplaq; myrrhæ ad cinnamomum portione: mel ad cogenda omnia adijcitur. Laudatur non acre, molli odore, plenè myrrham redolens, crassum, odoratū, gustu perquā amaro. Id non à resina, sed myrrha crassitudine obtinuit: resina enim neque amaritudinem præbet, neque vllam odoris gratiā adijcit. Vim habet admodum acrem, amaram, & calfacientē. Itaque ora venarū aperit, calfacit discutit, diffundit: humores & spiritus attrahit, caput aggrauat: cōtra vulua vitia cum duplo oleo, cera, & medulla efficax est. Ita enim ferè multum acrimonia exolefcit, & quadā emoliendi vis cōtrahitur: alioqui adurit, et præ omnibus crassis vnguentis indurat, Facit mirum in modū ad fistulas, & vlcera, quæ putredinis vitū senserūt: item ad hernias humidiores, carbūculos, gāgrasque cum cardamomo: quin & ad febriū horrores, & tremores: aduersus serpentium morsus illinitur: scorpionum, & phalāgiorum ictibus, cum tritis grossis imponitur.

Nardinum.

CAP. LXIIII.

Ratio Nardini faciendi euariat. Nam aut malabathrino folio, aut sine eo fit: plerūque autem balinino oleo, aut omphacino. Iūcus odoratus spissamēti gratia adijcitur: sicuti propter odoris suauitatem, costus, amomum, nardum,

dum, myrrha, balsamum. Laudatur tenue, in
acre nardi arida, aut amomi odorem referens.
Vis ei extenuans, acris: expurgat, calfacit, ab-
sterget humores, rarefacit. Hoc liquidū est, ne-
habet strigmenti crassitudinem: nisi resinā reci-
piat. Fit etiam simplex ex omphacino oleo, ian-
co, calamo, costo, & nardo.

Malabathrinum. C A P. L X V.

Malabathrinū spissamēta nardini habet:
insuper myrrhæ plusculū additur. Qua-
de causa calfacit, crocino, aut amaracino vi-
ribus respondens.

Iasminum. C A P. L X V I.

Apuđ Persas fit, quod Iasminū cognomina-
tur, ex albis floribus violæ: quorū sextās in
Italicum sextarium sesamini olei demittitur,
violis, ut in lilino diximus, vicissim permutatis.
Apuđ Persas interepulandum vsurpatur odo-
ris causa. Quinetiam toti corpori conuenit: pra-
sertim cū in balneas descensum est. Sed his opi-
tatur corporibus, quæ calfactionem, laxatio-
nemq; desiderant. grauius tamen spirat, quā ut
libenter à plerisque recipiatur.

Myrrha. C A P. L X V I I.

MYrrha lachryma est arboris, q̄ in Arabia
gignitur, Aegptiæ spinæ non dissimilis: è
cuius vulnere defluit lachryma in subiectas tege-
tes: alia circū caudicem concrescit. Dicitur ex his
aliqua pediasimos præpinguis, quæ exp̄ssa, Sta-
clé

Eleemittitur. Alia gabirea pinguisſima, lato et
pingui ſolo naſcens: ea copioſam ſudat ſtaſtem.
Omnium prima eſt, quæ Troglodytica appella-
tur, accepto cognomine à loco, in quo provenit,
ſplendens, ſabuiridis, ac mordēs. Quinetiā legi-
tur tenuis quadam, quæ à troglodytica ſecūda
eſt, bdellij modo mollis, verūm odore grauiuscu-
la, aprici naſcens. Alia caucalis cognominatur
præter modū exoleta, nigra, & retorrida. Om-
nium deterrima, quæ ergaſima dicitur, pingui
carens, cano ſitu obducta, acris, ad gummi ima-
ginē vergēs, & viribus eius proxima. Improbata
aminea cognomine. Ex ijs paſtilli fiunt, ſed
è pinguibus pingues, & odorati: è ſiccioribus
haudquaquam pingues, & inodorati. Minus
odore pollet, quæ oleū non admittit, cum in paſtil-
los digerebatur. Adulteratur macerato gummi
aquā, in qua myrrha maduerit. Eligenda eſt re-
tens, fragilis, levis, vndique concolor, quæ cōſra-
cta venas vnguium modo cādidās & laues oſtē-
dat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calſa-
ciens. ſuperuacua, & inutilis eſt pōderoſa, coloris
picei. Calſacit, cohibet. ſoporē gignit, glutinat,
ſiccāt, astringit, vuluam emollit, & præcluſam
aperit: mēſes & partus celeriter extrahit cum
abſinthio, lupinorum cremore, vel ſucco rutæ ad
meta: tuberculo fabæ deſecratur in vetere tuſſi,
orthopnoxa, in laterum peſtorūq; doloribus, in
alui profluuiō, & dyſſenteria: horrores diſcutit

duabus horis ante febrim accessiones faba magnitudine pota cum pipere, & aqua: subdita lingua liquataq; scabritiem arteriae expolit: obis jam vocem expedit, ventris tineas enecat, contra gravem oris halitum mādatur, & aduersus alarum tedia cū liquido alumine illinitur: gingivas, & dentes stabilit colluto cum vino, & oleo ore vulnera capitis illitu glutinat: medetur fractis auribus, ac ossibus nudatis, peruncta cū cochlex carnibus: item purulentis auribus, in fiamatisq; cū meconio, castorio, & glaucio: ad varos autem cum cassia, & melle illinitur: impetigines ex aceto purgat: defluentes capillos cū ladanio, & vino myrteo illita, firmat: diuturnas destillationes lenit, † illitis penna naribus: oculorum vlcera complet, albugines tollit, caliginē discutit, scabitiem leuigat. Fit è mirrha, perinde atque thure, fuligo: & vt postea ostēdemus, ad eadem conueniens. Bæotica myrrha dissecta radix est arboris cuiusdā in Bæotia nascentis. Melior est, quæ myrrham odoris suauitate representat. Vis ei calfactoria inest, emollit, discutitq;: suffimentis commodissimè inseritur.

† Exemplaria Græca typis expressa habent, διαχρισμένη πτερό των μυξωσίων, id est, illita tē alæ narium. Que verba inunctionem ad partem nasi referre videtur, non ad instrumentum, quo debeat fieri inunctio. Siquidem, teste etiā Galeno lib. xj.

de vsu

de vsu partiũ, *πτερόν* seu *πτερύγιον* pars quædam nasi uocatur.

Styrax.

CAP. LXVIII.

Styrax lacrima est arboris malo cotoneæ similis. Prasertur pinguis, flauus, resinosus, albicantibus grumis, quam plurimum in sua odoris gratia permanens, qui dũ mollitur, melleum liquorem reddit: qualis è Catabalis, Pissidia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger, fursurosus, friabilis, canóque situ obductus. Caterũm lacrima inuenitur gummiũ similitudine, per lucida, & myrrhæ æmula, verũm perpauca manat. Adulteratur ligni scobe, quam vermiculi erodentes excusserunt, melle, & iridis sedimento, & quibusdam alijs. † Alij cerã, aut adipem odoribus imbutũ, flagrantissimis solibus cum styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigida aqua veluti vermiculos exprimunt, venundantq; . Styracem hunc, † quoniam in vermiculorum speciem contrahatur, scoleciten cognominant, quem tanquam syncerum imperiti approbant, non adnũm aduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam: siquidem atter admodum est, qui adulterationis vitio caret. Styrax calfacit, emollit, & concoquit: medetur tussi, destillationibus, raucelini, grauedini, & interceptæ voci: vulua præclusa, duritiæne laboranti conuenit: cit menses potu, apposituq;: aluum leuiter mollit, si exiguum cum resina

d s tere

terebinthina catapotij modo deuoretur. Misce-
tur vtiliter discutiētibus malagmatis, acopis.
Aoletur autem, & igni torretur, vt fiat
eo, veluti ex thure, fuligo: ad eadem conueniens
ad qua thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria sy-
racinum oleum componitur, quod calescit ve-
ementer, & emollit: verū caput dolore afficit,
grauatq; & soporem adfert.

† Quoniam in vermiculorū speciem
contrahatur. Hæc verba nō leguntur in
Græcis codicibus. Sed ea (vt arbitror)
Ruellio interprete adiecta sunt ad maio-
rem rei declarationem. Quæ hanc ob cau-
sam, lectore tamē admonito, nobis quo-
que relinquere placuit.

Bdellium. CAP. LXIX.

Bdellium alij bolchon appellant, alij madel-
con: lacryma est† Saracenica arboris: Proba-
tur gustu amarum, trāslucidum, taurini gluti-
nis in morem, intus pingue, liquefcens facile, li-
gni ac sordis expers, suffitu odoratum, vngui si-
mile. Est etiānum bdellij genus sordidum, ni-
grū, vberioribus glebulis in offas conuolutum,
aspalathi odore, ex India aduectum. Desertur
etiam à Petra oppido siccum, resinofum, liuescēs,
sed facultate secundum. Adulteratur gummi,
sed ita uitiatum nō perinde gustui amaritudi-
nem representat, nec vsque adeo suffitionibus
odora

odoratum. Calfacit, & emollit: duritias, & turgentia guttura, humiditasq; hernias discutit cū ieiuna salina dilutū: vulua spiracula laxat appesitu, & suffitu: & partus, humiditatesq; omnes extrahit: calculos potu comminuit, vrinam mouet: tuſſientib, & à serpente percussis vtilissimè datur: valet ad rupta, vulsa, laterū dolores, & discursantes spiritus. Malagmatis inferitur, quæ contra duritias, & neruorum nodos profunt. Contusum resoluitur affuso vino, aut aqua calida.

† Licet Saracenicae arboris lectio admitti possit, quod Saraca, vnde Saraceni dicti sunt, vrbs sit in Arabia, non tamen improbanda videtur lectio Arabicæ arboris. Quod non solum Plinius scribat bdellium in Arabia nasci, & Galenus alterum bdellij genus Arabicū faciat, sed etiam quod Oribasius lib. xj. legat *δένδρον ἐστὶ δέυνδρον ἀραβικόν*, hoc est: lacryma est arboris Arabicæ.

Thus.

CAP. LXX.

THus in ea gignitur Arabia, quæ thurifera cognominatur. Primatū tenet in eo genere masculū, stagonias appellatū, suapte natura rotundū: tale autē † indiuiduū est, candidū, vñōusp- cū frangitur, in thus pingue, in suffitu statim er p, id est dens. Indicum verò fuluescit, & colore luet, sed subrusum rotundū industria faciunt: nam in quadran- est.
gulares

gulares formas dissectum fœcilibus versant, pro
 nec rotunditatem contrahat: verum huiusm. du
 thus tempore flavescit, quod atomum, aut s. giu
 grum appellant. Secundum locum habet† An. cre
 bicum, & in Smilo nascens, quod aliqui cop. don
 uocant, minus multo, & fulvius. Est & genus por
 liud, cui amomite cognomen est, aliqui cand. no r
 quod dum molitur, mastiches more digitis ca t
 dit. Adulteratur omne thus† in itinere pin. fuli
 na, et gummi. quod facile deprehendi potest: siquo Ali
 dem suffitum gummi flammam non eiacular. dito
 & resina in fumum evanescit, thus vero stat. tor
 ardet: idem maleficiū ordo prodit. Ad cal. dim
 dum, & astringendum pollet: oculorum calig. tur
 nem discutit, caua vlcera complet, & ad cicatr. P
 cem perducit: cruenta vulnera glutinat, infra bra
 natq; cunctas sanguinis eruptiones, etiamsi cereb. ei
 bri membranis effluat: vlcera, quæ cacoethe v. den
 cantur, & sedis, & reliquarum partium perm. dur
 cet tritum cum eo & lacte linamentum form. dur
 cantes verrucas inter initia, impetiginēsq; ris
 aceto, & pice illitū tollit: ambusta igni, pernio. tia
 nesq; cum suillo adipe, aut ancerino, & vlcera. tur
 in capite manantia cum nitro, si infricetur, sanat. ad
 paronychys cum melle, auribus fractis cum pice, me. cre
 detur: ad reliquos aurium dolores cum dulci vino in. pa
 funditur: inflammata à partu mamma cum cimolia, & rosaceo magna utilitate perungu. for
 tur: additur ad arteria, viscerūq; medicamen. bu
 prodi

prodest sanguinis excreationi potū. Sed in secū-
da valetudine haustū insaniam mouet, & lar-
gius cū vino potū interficit. In fictili mūdo thus
crematur, flagrāte glebula succēsum à lucerna,
donec exuratur: post perfectā vstionē operire o-
portet, vsque dū restinguatur: sic enim in cineres
nō redigitur. Aliqui ollulam aneo vase cauo cir-
ca medium perforato cingunt ad excipiendam
fuliginem, vt in eius mentione mox ostēdemus.
Alij crudo fictili luto oblito, & in fornacem in-
dito, cremāt. Fictili etiā nouo vinacibus prunis
torretur, dū non amplius bullet, aut pinguitu-
dinem, vapo remūe emittat: facile enim cōminui-
tur, quod perustum non est.

Cortex thuris.

CAP. LXXI.

PRafertur thuris cortex crassius, pinguis, odo-
ratus, recens, leuis, minimē scaber, sine mem-
branis. Adulteratur admisto pini, aut nucis
eius cortice. sed horum index ignis est: siqui-
dem reliqui cortice suffiti nequaquam incen-
duntur, sed sine odore fumum eructant: thu-
ris verò cortex ardet, & cum odoris fragran-
tia vaporem eiacularur. Thuris modo vri-
tur: & vis eadem, quæ thuri, sed validior,
adstringentiorq; . Quare potu cruentis ex-
creationibus, vuluis fluxione laborantibus in-
passo confert: ad cicatrices oculorum, & caua,
sordesq; efficax est. tostus scabris lippitudini-
bus auxiliatur.

manna

Manna thuris. CAP. LXXII.

Manna thuris probatur candore, micarant frequentia, & puritate. Vim habet eandem, quā & thus, sed inualidiusculam. Sūt quę cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris contusi adulterant. Sed hæc igne deprehenduntur: neque enim æquè suffitu aerium vaporem, sed fuliginosum, & impurū expuit, & permixtum suaveolentia halitus virus habet.

Fuligo thuris. CAP. LXXIII.

Fuliginem thuris sic facito. Forcipicula lucenis accensas singulatim thuris glebas in novam fictilem ollam concavam imponito, & area vase in medio perforato, deterfa diligēter sorde, obtegito: alteram admoueto, ex altera eius parte, aut vtraque subiectis quaternū digitorum altitudine lapillis, quò facilius perspici queat, uratur; & quā locus capax fuerit, glebular alias supponito, & anteaquā prorsus prior gleba restinguatur, aliam imponito, donec sufficiens fuliginē videaris cōgisse. Continuo tamen externæ aramenti partes spōgia, aqua frigida madefacta, abstergatur: ita enim tēperato aru feruore, fuligo omnis inherebit, quæ alioqui per leuitatem decidua thuris cineribus admiscetur. Derasa itaque fuligine, cinis cremati thuris scorsum substrahendus est. Idem opus, quoad satisfactum tibi videbitur, obeundum. Oculorum inflammationes mitigat, fluxiones suspen-

dit, *ulcera purgat, cana explet, carcinomata sistit. Simili modo è myrrha, resina, styrace, reliquisq; lacrymis fuligo excipitur ad eadem conueniens.*

† *ἄτομος*. Hæc dictio hic, & paulò post legitur in vulgaribus Græcis codicibus: quæ in primo loco thus natura rotundum insignitur, in secundo verò arte tale factum cognominatur. Sed quia absurdum videbatur Marcello, Dioscoridem usum fuisse homonymia, ideo mutauit lectionem, alterum scilicet *ἄτομον* in *ἑυφομον*, ad rem nomen accommodans. Quam tamen lectionis mutationem minimè probat Manardus: qui præterea dubitat, quomodo atomos Latinis sit reddendus. Hæc difficultates mihi quidem videtur ab Oribasio sublata lib. xij. ubi primò non *ἄτομος*, sed *ἑυφύωντος* legitur, quæ vox sine controuersia illesum, atque non scissum thus facit: secundò verò nihil legitur, quod argumento est atomum secundum accreuisse Dioscoridi. Legitur autem *σύναγρος*, quæ vox ut est illius factitij thuris cognomentum Oribasio teste, legitimum, ita non mutanda videtur.

† Hic vulgaris lectio habet, *ὁ ἀραβίας, καὶ ὁ ἐν σμίλῳ, ὃν ἔνιοι κοπίακος καλοῦσι*, i. Arabias, & i Smilo nascens, quod aliqui copiscum vocant

vocant. Marcellus nō ἀραβίας sed ὀρόβια legit. Cui lectioni astipulatur Oribasius libro xij. vbi δ ὀρόβια & tantum, reliqua vero vt addititia non leguntur.

† Exemplaria Græca vulgata hoc in loco legunt μεθοδευόμενα & : quæ vox, innere, à Ruellio, & artificiosè conformatum, vertitur à marcello. Sed equidem eam aduentitiam putauerim, quod non legatur ab Oribasio.

Picea, & pinus. CAP. LX XIII

Pinus, & picea generi eidem ascribuntur. Sed quandam flagitant specierum distinctionem, arbores vulgò cognita. Quarum cortex astringit: prodest tritus, & illitus intertrigini, vlceribus summū corpus occupantibus, ambustisq; cū spuma argenti, & uisanna: vlcera delicatulorum acrimoniam recusantium cerato myrtino exceptus ad cicatricem perducit: tritus cum sutorio attramento serpentia cohibet: suffutu partus, & secundas eijcit: potus aluum sistit, vrinam mouet. Folia eorum trita, & illita inflammationes leniunt, vulnera ab inflammatione vindicant: trita autem, & decocta in aceto feruenti collutione dentium dolores multent: hepaticis vtilia sunt drachmæ pondere in aqua, aut mulsa pota. Pineæ nucis cortex, & folia potidem prestant. Teda earum particulatim secta, si in aceto coquatur, & decocto dens colluatur, dolori

dolores leuat. Ex his etiam fit spatha acoporū,
 pessorūq; compositionibus idonea. Quinetiam
 earum cremantarum fuligo ad librarij attra-
 menti confectiōem excipitur: ea circunlitioni-
 bus efficacissimè imponitur, quibus palpebras
 ornāt, coloremq; mētuntur, calliblephara Gra-
 ci vocant: arrosio oculorum angulis, callosis, gla-
 brisq; genus, & coliacrymationibus opitulatur.
 Pityides appellantur pinorum, piceaq; fructus,
 qui in conis inueniuntur. Vin astrictoriam ha-
 bent, & aliquantulum excalfacientem: tussi,
 & pectoris vitijs auxiliatur, per se, aut ex mel-
 le sumpti. Nucces pineæ cum repurgata mandun-
 tur, aut cum passō, aut cucumeris semine bibun-
 tur, urinam cient: acrimonias in renibus, & ve-
 sica hebetant: stomachi rosores leniunt. datæ cū
 portulacæ succo, virium infirmitatem roborāt,
 corruptorum quoque humorum labem obtun-
 dunt. Pineæ nucces integra recenter arboribus de-
 cerptæ in passō franguntur, & decoctæ, vetustæ
 tussi, ac tabitudini conferūt, si quotidie ex eo li-
 quore terni cyathi bibantur.

Lenticus.

C A P. L X X V.

Lenticus nota arbor est. Cui toti vis inest:
 Lastringendi: semini enim, folio, ramo, corti-
 ci, radicibusq; cognatæ insunt vires. Liquamen-
 tum autem ita fieri solet. Folia, cortex, & ra-
 dix in aqua coquuntur, & ubi abundè cocta,
 refrigerataq; sunt, folia abijciuntur: aqua de-

nuo coquitur, donec mellis habeat crassiti-
 dinem. Lentiscus sua astringendi dote, valde
 aduersus sanguinis reiectiones, alui proflumina
 & dysenterias in potu: item contra eruptionem
 sanguinis è vulua, & eiusdem, aut sedis pro-
 dentia. In totum acacia, & hypocistidis vi-
 cem representat. Idem facit succus è tritis
 lijs. Decoctum fotu cana explet, & fractura
 sa ferruminat, vuluæ fluxiones sistit, nomi-
 arcet, vrinam pellit, motus dentium colla-
 tione stabilis. Virentes surculi calamulorum
 vice dentibus repurgandis affricantur. Fit
gummi semine oleum: astringentiam vim habens: quod
 prodest, cum quid astringi opus est. Lentis-
scus Mastix resinam gignit, quæ lenticina cognomi-
officinis. natur, & ab aliquibus: mastiche. Potius
 est sanguinem reijcientibus, & tussi veto-
 ri: stomacho auxiliatur, sed ructum mouet.
 additur in dentifricia, & illitiones facit,
 ad nitorem cuti conciliandum: palpebras ocu-
 lis incommodas replicat: manducata halitum
 oris commendat, ginginas contrahit. Opti-
 ma, & copiosissima in insula Chio prou-
 uenit. Prasertur, nitedule modo, resplen-
 descens, & candore Tyrrhenica ceris simi-
 lis, adulta, retorrída, friabilis, odorata, stri-
 dorem edens. Viridis autem inferior est.
 Adulteratur thuris, resinaque pinea nu-
 mistura.

Terebinthus. CAP. LXXVI.

Terebinthus cognita arbor est, cuius folia, & semen, & cortex astringunt, & ad eadē, ad quæ lentiscus, conueniunt, simili parata modo, sumptaq;. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersatur: excalfacit, vrinam mouet, venerem excitat: cōtra phalangiorum morsus conuenienter in vino bibitur. Resina eius ex Arabia petraea defertur. Prouenit etiam in Iudaa, Syria, Cypro, Aphrica, & Cycladibus insulis. Sed præualet candida, perlucida, vitreo colore, & in caruleum vergente, terebinthum olēs. Terebinthina resinas omnes antecedit: proxima lenticina, & è pinu, & abiete: has sequitur è picea, & pineis nucibas resina. Natura omnibus calfacere, molire, discutere expurgare. Tussi, ac tabi cōueniunt per se, aut in eclegmate ex melle: vitia pectoris expurgant vrinā cient, cruda cōcoquunt, ventrē emolliunt, palpebras commodissimè replicant: lepras tollunt: cum aruine, ac sutorio atramento, nitroq;: auribus saniem emanantibus cum melle & oleo, itē in pruritu genitalium vtilēs, malagmatis, acopisq; admiscuntur. Laterum doloribus per se illitu & appositu auxilio sunt.

Resinæ aliæ. CAP. LXXVII.

Liquida resina è pinu, & picea, à Gallia, & Hetruria conuehi solet, atque olim à

Colophone petebatur: hunc Colophonia sibi cognomentum vendicauit, A Gallia quoque subalpina: quam vernaculo nomine larica, hoc est larignā, appellant incolae. Ea in linctu, & per se magnopere prodest tuſſi veteri. Colore inter se distant: siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, vt larigna. Cu pressus etiam liquidam fundit resinam, qua ad eadem pollet. Quæ verò aridarum generi ascribuntur, quædam ex pineis nucibus, alia abiete, alia picea, & pinu exierūt. Eligi debet longè omnium odoratissima, translucens, non retorrída, neque diluta, quandam ceræ faciem præbens, & friabilis. E picea, & abiete resina ceteris antecedunt: odorata enim sunt, atque thus odore imitantur. Præstantiores à Pityusa insula deferuntur, quæ secundum Hispaniā sita est. Sed quæ è picea, nucibus pineis, & cupressomanarunt, nihil ad illas, nec tantis viribus potiuntur. veruntamen eorundem gratia, quorum & illa, sumi solent. Lentiscina terebinthina respondet. Vritur resina omnis liquida in vase quadrupla capacitatis ad humorem, qui infunditur, itaque resinæ congruus in duobus aqua pluuia coquitur, subiectis leuibus prunis, resina assidue inquetur, donec omnis odor aboletur, & friabilis: & retorrída reddatur, ac digitis cedat. Caterū ubi refriguit, in fictile non putatum, quod aconitum vocāt, id est, non illitum, recondi.

reconditur. Fiet etiā eximij candoris, si resina omnis eliquata praeoletur, quod faculenta sordes excernatur. Vtūtur quoque sine aqua, primū lento igne, & vbi coire cœperūt, maior carbonū strues supponitur, & triduo citra intermissione discoquuntur, vsque dū antedictas natura suae notas exuerint: mox, vt dictū est, reponuntur. Aridas vnius diei spatio decoxisse satis est. Vt & odoratis malagmatibus, & vnguentorum colorationibus magnopere vtilis sunt. E resina perinde atque thure, fuligo excipitur, ad circunlitiones idonea: quibus palpebras fucant, & colorem mentiuntur. prodest glabris genis, collacrymationibus, erosisque oculorum angulis. Ex ea fit atramentum scriptorium.

Pix liquida. CAP. LXXVIII.

Pix liquida, quam alij conum vocant, ē pinguis-
simis pini, picea q; lignis congregatur, Optima est splēdens, sincera, lauis. Contra vena-
na, phthisim. purulentā excreationē, tusses. sus-
piria, & pectoris humores, qui difficile extussū-
tur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cū mel-
ledato: tonsillarū & vae inflammationes, an-
gineq; vtiliter perungūtur: purulentis auribus
infunditur cum rosaceo, & illitur cum trito sa-
le serpentium moribus: adiecta verò pari cera,
scabros vngues extricat, impetiginesq; emēdat:
vulua duritias, ac sedis tubercula discutit: cum
farinaq; hordeacea, & pueri impubis vrina

decocta, strumias rumpit: cohibet vlcera, quae sunt, cum pineo cortice, aut sulphure. aut sulfuribus illita. Caterum cum thuris manna, &urato profundos vlcenum sinus conglutinat: rimis sedis, & pedum magno auxilio illinitur: vlcera replet, & cum melle purgat: quin & cum vna passa, & melle carbunculos, & putrida vlcera emarginat, durumpitq;. Erodentibus medicamentis, quas septas vocant, Probè immiscetur.

Picinum oleum. CAP. LXXIX.

E Pice fit quod pisselaon appellant, separato liquore aquoso, qui supnatat pici, sicut serum lacti. Nam expansa, quandiu pix coquitur, supra cortinam vellera pura madescunt, acceptoq; halitu eius exprimuntur in vas, idq; tandem fiat, donec pix coquatur. Quas pix liquida, praebeet vtilitates: alopecias capillo replet cum farina hordeacea illitū: quibus & liquida pix medetur: iumentorum vlcera, scabiemq; emendat.

Fuligo liquidæ picis. CAP. LXXX.

Fit hoc modo è liquida pice fuligo. In lucerna noua, quae ellychnium habeat, nonnihil picis incendio, lucernamq; fictili vase in clibani speciem confirmato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, vt clibani esse solent, operito, & adoleri finito: consumptoq; liquore nonnum infundito, quoad sufficientē vsui fuliginē collegeris. Vis ei astringens, acrisq;. Vsi est ad

pigmenta, quibus palpebras linunt, & venustant, & ad circumlitiones, Item vbi glabris genus pilos restitui oportet, ad imbecilles, lacrymososq; oculos, insuper ad eorundem vlcera non inutilis est.

Pix arida. CAP. LXXXI.

Liquida pix decocta in spissam coit, quam vocant aliqui palimpissam. quo in genere quedam visci modo lentescit, boscas cognominata: altera sicca est. Probatur pura, pinguis, † odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia, & Lycia, picis, resinaq; simul naturā habentes. Calsaetoriam vim habet: dura emollit, pus mouet, tubercula panosq; discutit, vlcera replet: vulnerarijs medicaminibus commodè permiscetur.

Zopissa. CAP. LXXXII.

Zopissam aliqui aiunt derasam nauibus resinam cum cera, quam alij apochyma appellant. Ea dissipandi naturam habet: quoniam marino sale macerata sit. Alij pineam resinam hoc nomine uocauerunt.

† Hoc loco non ἐνὸδus, id est, odorata, vt communis lectio habet, sed ἰσῶδus, hoc est, viscosa legitur in Oribasij codice manu scripto, libro xij. simplicium, Harum lectionum quæ sit melior in probatione picis siccæ, aliorum sit iudicium.

Bitumen. CAP. LXXXIII.

Bitumē Iudaicū ceteris antepositur. Cuius

probatio est, ut purpurea modo splendeat, sive ponderosum, ac validum odorem vibret. nigra autem & sordidum, vitiosum est. Adulteratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacynthis & Sydone. Liquidum inuenitur in Agragantino Sicilia, fontibus innatans: quo utuntur ad lucernarum lumina, olei vice. Hallucinantur, qui id Sicilicum oleum nominant: nanque liquidi bituminis genus esse constat.

Pissasphaltum. CAP. LXXXIII.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidaurum, quæ pissasphaltos appellatur. Ea Ceraunjs montibus deuoluta impetu fluminis rapitur, aestuq; in litus expuitur, illic coacta in glebas, mistam bitumini picem redolet.

Naphtha. CAP. LXXXV.

Naphtham vocant Babylonij bituminis colamen, colore candidum: inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita ut ex spatulo protinus in eam transiliat. Ad suffusiones oculorum & albugines utilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur: vulnerum prociſſiones, strangulationesq; olfactu, suffitu, impositu, emendat: comitiales morbos suffitu deprehendit, gagata lapidis more: purgationem mulierum cum vino, & castorio potum elicit: tussim ueterem, & anhelitum adiuvat: serpentium morſibus, coxendicum, laterumq; doloribus auxiliatur: datur cœliaci in catapotio deuorandum.

cum aceto potum discutit sanguinem cœcretum:
 dysentericis cum ptisana liquatum infunditur:
 destillationibus suffitione medetur: mitigat
 dentium dolores oblitum. Caterum pilos incom-
 modos siccum replicat, specillo impositum: concal-
 factum autem, & cū farina hordeacea, nitro, et
 cera illitum, podagris, articulorum doloribus,
 lethargicisq; prodest. Pissasphaltos eadem, quæ
 pix, & bitumen, si misceatur, potest.

Cupressus. CAP. LXXXVI.

Cupressus refrigerat, & astringit. Cuius
 folia ex passō, & exiguo myrrhæ pota,
 vesicæ rheumatismis, & urinae difficultati auxi-
 liantur. Pilulæ autē ex vino tusa in dysenteria,
 alui fluxione, tussi, & orthopnoea, aut si reijcia-
 tur sanguis, conuenientissimè bibuntur: earū de-
 coctum eosdem præbet effectus: tusa cum fico du-
 ritias emolliunt, nariumq; polypo medentur: in
 aceto coctæ: & cum lupinus detrita scabros vn-
 guis eijciunt: hernias intestinorum prolapsu erū-
 pentes illitu reprimunt. Folia eadem præstant.
 Pilulæ cum arboris coma suffitæ, culices abigere
 existimantur. Folia trita, & imposita vulnera
 conglutinant, sanguinem supprimunt: trita ex
 aceto capillum tingunt: illinuntur per se, aut
 cum polenta ignibus sacris, vlceribus quæ ser-
 punt, carbunculis, & oculorum inflamma-
 tionibus: admodum cum cerato stomachum cor-
 roborant.

Iuniperus. CAP. LXXVII.

Iuniperi genera duo: altera maior, altera minor. Vtraque acris est. Excalfacit, & vrinam mouet: accensa serpentes fugat. Baccarum nulla nucis iuglandis magnitudine nonnunquam. *Auellanā* grandescere, alia nucem * ponticam aquam intellige. inueniuntur, rotunde, odorata, in mandanda dulces, subamara: quæ arceuthides etiam, id est, bacca Iuniperi, nominantur. Modicè calfaciunt, & astringunt, stomacho vtilis: contra peccoris vitia, tussim, inflationes, tormina, & serpentium ictus efficacissimè bibuntur: vrinam cient, vnde ruptis, conuulsis, & vuluæ strangulatui subueniunt. Folia acrimoniam habent: ideo tam ipsam, quàm eorum succum ex vino contra viperarum morsus illini, aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus, lepram eximit.

Sabina. CAP. LXXXVIII.

Sabina duorum generum est. Vna folijs expresso similis, spinis horridior, grauiter olens, acris, & feruens. arbor est coacta breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit, huius folijs nonnulli pro suffitu vtuntur. Altera tamarici folio similis est. Vtriusque folia nomas fistunt, collectiones illitu mitigant: quin & cum melle illita nigrities, sordesq; repurgant, & carbunculos rumpunt: cum vino pota sanguinem per vrinam eliciunt: partus apposita extrahunt.

& fo

& suffitu idem prestant. Vnguentis cal-
facientibus immiscetur, & priuatim glee-
cino.

Cedrus.

CAP. LXXXIX.

Cedrus arbor magna est, ex qua picem col-
ligunt, quæ cedria vocatur. Iuniperi mo-
do baccas parit, baccarum myrti magnitudine,
rotundas. Cedria optima est crassa, perlucida,
gravis odoris: quæ dum effunditur, guttatim
non dissipata coit. Cui ea vis inest, ut defuncta
corpora conseruet, & viuentia corrumpat: quæ
ex causa mortuorum vitam aliqui eam ap-
pellauere. Vestimenta quoque, & pelles eximia
calfaciendi, & siccandi dote, corrumpit. magni
ad ocularia medicamenta vsus: quippe illita o-
culis claritatem affert, albugines cicatricesq; de-
tergit: instillata autem cum aceto, vermes au-
rium necat: cum hyssopi decocto infusa sonitus,
sibilosq; sedat: cauis dentium indita eos fran-
git, & dolores leuat, idem facit cum ex aceto col-
luitur: peruncto ante coitum genitali, concipien-
di vim adimit: angina ea perunguntur, tonsila-
rum inflammationibus auxilio est: lendes, pedi-
culosq; illitu enecat: cerastæ morsibus cum sale
imposita subuenit: contra hausta leporis marini
venena, in passo sumpta, auxiliatur: in elephan-
tia aut linctu, aut punctione pfcit: pulmonū vl-
cera purgat, & si cyathus eius absorbaatur, pfa-

Cedrus
mortuorū
vita dicta

nat

nat: vermes, et tineas subter indita necat, et par-
tus extrahit. Fit & oleum à cedria separatum
dum coquitur, velleribus supra halitum eius
expansis, vt in pice. Eiusdem ad omnia vsus: pri-
uatim vehementer perunctum, scabiem quadra-
pedum, canum, boumq; persanat: ijsq; inheren-
tes ricinos enecat, & vlcera, quæ ex tonsura ac-
ceperunt, ad cicatrices perducit, Cedrides cedri
fructus vocantur. Calfactoriam vim habent
stomacho aduersantur: auxilio sunt tussi, con-
uulsis, ruptis, stranguria; menses ciunt ex polli-
ne piperis poti: contra haustum leporem mari-
num in vino si muntur: serpentes fugantur,
peruncto ex adipe ceruino, aut medulla, corpo-
re. In antidota adduntur. † Fuliginem, quomo-
do ex pice congeri oportet: quæ eandem, quam
pice, fuligo vim præbet.

† Hic lectorem admonitum volumus
illa de fuligine Cedri verba non legi in
Græcis tum vulgatis, tum etiam antiquis
quibusdam codicibus. Quare cum neque
à Marcello vertantur, qui plura exempla-
ria Græca habuisse fatetur, ea potius
addititia, quàm legitima censenda vi-
dentur.

Laurus. CAP. XC.

Laurus quædam tenui folio constat, alte-
ra latiore. Vtraque excalfactoriam na-
turam habet, & emollientem. Vnde decoctum

earum in muliebres inſeſſus additum, vulua,
 & veſica vitij conuenit. Virentia folia ſenſim
 ſubstringunt: illita quoque, ac trita veſparum
 apiumq; iſtibus opitulantur: eadem cum polē-
 ta, & pane illita inflammationem omnem mi-
 tignant: ſed pota ſtomachum effundunt, & vo-
 mitiones mouent. Lauri bacca magis, quam fo-
 lia calfaciunt. ergo in eclegmate trita cum mel-
 le, vel paſſo proſunt tali, orthopnœa, & omni-
 bus thoracis rheumatismus: contra ſcorpionum
 iſtus ex vino bibuntur: vitiligines emaculant.
 Succus baccarum vtilliffimè aurium dolori, &
 grauitati inſtillatur cum vino vetere, & roſa
 ceo. In medicamenta autem adiſciuntur, quæ
 neruorum laſſitudines reſciunt, acopa vocant:
 & ad vnguenta, quæ calfaciunt, & diſcutiūt.
 Cortex radicis calculos rumpit, partus necat, he-
 patici pdeſt, tribus obolis in vino odorato potus
 Platanus. C A P. X C I.

TEnerrima Platani folia in vino decocta,
 mox illita, oculorum fluxiones ſiſtunt:
 tumores, & inflammationes leuant. Decoctus
 cortex in aceto, dentes in dolore coluit. Virides
 pilule in vino potæ, ſerpentium morſibus auxi-
 liantur: exceptæ autem adipe, igni ambuſta ſa-
 nant. Inſidens foliorum, pilularumq; lanugo, o-
 culos, & aures offendit.

Fraxinus. C A P. X C I I.

FRaxinus arbor nota eſt. Cuius foliorum ſuc

cus, & ipsa ex vino pota, & illita viperarum ictibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ramenta, scobemq; potu perniciem asferre tradunt.

Populus alba, & nigra.

CAP. XCIII.

Potus albae populi cortex vncia vnus pondere, ischiadici, ac vrinae stillicidio prodest. sterilitatem inducere tradunt, si cum mulino rene bibatur, Folia quoque cum vino post purgationes pota idem prestare produntur. Tepens foliorum succus vtiliter aurium dolori instillatur. Pilulae, quae primo foliorum partu exiliunt, tria & cum melle illita, oculorum hebetudini medentur. Memoriae prodiderunt, corticem albae populi, & nigrae particulatim caesum, & sulcus stercoreatis mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre. Populi nigrae folia cum aceto illita: magna vtilitate podagricis doloribus illinuntur. Resinam populus fundit, quae in malagma ta additur Semen potum ex aceto comitialibus vtile est. Lachrymam populorum commemorat, quae in Padum amnem defluat, durari, ac coire in fuccinum, quod electrum vocant, alij chrysophorum. Id attritu incundum odorem spirat, & aurum colore imitatur: tritum, potumq; stomachi, ventrisq; fluxiones sistit.

Macer. CAP. XCIII.

MAcer ex barbaria aduehitur, cortex flauescens

scens, crassus, gustu perquam astringens, Qui cō-
tractuentas excreationes, dysenterias, & alui
fluxiones bibitur. Vlmus. CAP. XC V.

VLmi & folia, & cortex, & ramum ha-
bent spissandi. Folia trita ex aceto ad le-
pras efficaciter illinuntur: vulnera glutinant, sed
multo magis corticis tilia, si fascia loco intorque-
atur: nam in lori more flecti potest. Crassior cor-
tex in vino, aut aqua frigida vniatim potus
pituitas trahit. fracta ossa celerius solidesunt,
si decocto foliorum, corticis, aut radice fouean-
tur. Humor in folliculis enascens prima germi-
nis eruptione, cuti illitus nitore inducit, faciem
q̄ splendorem praestat: qui dum siccatur, in a-
nimalia abit, quae culicum formam gerunt. Fo-
lia cum tenerescunt cocta, oleorum more ad ob-
sonia usurpantur.

Lignorum marcor. CAP. XC VI.

EX caudicibus, lignisq̄ veteribus caries con-
geritur. quae farina modo illita vlcera pur-
gat: & ad cuatrisem perducit, serpentina cohi-
bet, si cum pari aniso & vino subacta, linteisq̄
imposita illinatur. Harundo. CAP. XC VII.

IN harudinū genere quadā nastos, id est, far-
etior vocatur, ex qua sagitta faciri solēt.
Alia semina, qua tibiariū ligula efficiunt. alia q̄
fistulis addita sit, syringias: cui multū inest carnis
crebrisuncta geniculis, ad librorū cōscriptionē ac-
comodata. Alia. crassa, concava, apud amnes na-
scens.

scens: quæ à quibusdam cypria, ab alijs donax appellatur. Alia phragmites, seu vallatoria, gracilis candicans, vulgo cognita: cuius trita radix per se, aut cum buibis suis illita, spicula aculeosq; corpore extrahit: luxata, lumborumq; dolores cum aceto mulcet. Virentia folia tusa, & imposita ignibus sacris medentur, & ceteris inflammationibus. Corticis cinere peruncta cum aceto alepecia sanantur, Panicula lanugo, si aures intrauerit, exurdat. Eundem effectum implet harundo, quæ cypria dicitur.

Papyrus. CAP. XCVIII.

Papyrus, quæ charta sunt, nullus nõ cognita, præcipua in medicina vtilitatis ad laxandas fistulas: mad. facta lino inuoluitur, vsque dum inaruerit: constricta enim, atque, immissa in hiatum humore completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radix: itaque Aegyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes, & mansam expuunt. Ipsis radicibus pro ligno vtuntur, Cremata papyricinis depascentia vlcera cum omnium partium, tum oris maximè, cohibet: verum melius id com. busta charta præstat.

Myrica. CAP. XCIX.

Myrice, seu tamarix, arbor vulgo cognita est cum apud pigras, & stagnantes aquas nascatur, fructum quasi florem ferens, compage muscosum. Aegyptus, Siriaq; alteram gignunt

mitiorem, sylueſtri cetera ſimilem. Fructum pa-
rit galla proximum, inæqualiter astringentem
gustu: quo conuenienter vtimur vice galla in
medicaminibus oculorum, oriſq; . Datur cruenta
excreationi in potu, & cæliaci, & cõtr.: proflu-
ua ſæminarum, regium morbum, et phalangio-
rum morſus: illitus tumores inhihet. Cortex in
eoſdem uſus adhibetur. Decoctum foliorum cum
vino potum, lienem abſumit: ad dolorem
dentium in collutionibus ſaluare, & mulie-
ribus fluxione vuluæ opportunè in deceſſioni-
bus: phthiriaſi, lendibusq; circumfuſum pro-
deſt. Abundantiam ſæminarum ſiſtit impoſitus
arboris cinis. Potorios calices è caudice lienofiſ
moluntur, quò datus in hiſ potus proficiat.

Erica.

CAP. C.

Erica fructicoſa arbor, myrica ſimilis, lon- Plinius
gè minor. cuius flore apes reprobum mel ef- fruticè di-
ficiunt. Tam floſ, quàm coma ſerpentium icti- cit.
bus illitu medetur.

Acacalis.

CAP. CI.

Acacalis fructus eſt naſcentis in Aegypto
fructicis, ſeminis myrica quadantenus ſi-
milis. Cuius aqua, in qua maduerit, ad collyria
additur, quæ ad excitandam oculorum aciem
conueniunt.

Rhamnus.

CAP. CII.

Rhamnus fruticat in ſepibus, ramos ferens
reſcios, & aculeos in acuta ſpina modum:
f folijs

folijs parvis, oblongis, suppinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. Tertium nigrioribus, latioribusq; folijs constat, & quadatenus rubentibus: cuius rami quinum ferè cubitorum longitudinem implent, spinosiores quidem, sed infirmioribus, minusq; rigentibus aculeis. Fructum edit latum, candidum, tenuem, folliculari

Leind's æo- species, = verticillo similem. Omnium folia ignis
 q. d. d. a, sacro, & serpentibus vlceribus, efficaciter illinū
 id est, as- tur. Fama est ramos huius valuis, senetris uē im-
 hodeli fru posuos, veneficia depellere.

Etui similē Halimus. CAP. CII.

Halimus frutex est sepimentis idoneus, simili
 lis rhamno, sine spinis, folijs olea, sed latioribus. Nascitur in sepibus, & maritimis. Folia decoquuntur ciborum gracia. Radix conuulsa, rupta, torminaq; mitigat, drachma ponderel in aqua malsa pota: eadem lactis vbertatem facit.

Paliurus. CAP. CIII.

Paliurus frutex cognoscitur, aculeatus, durus: cuius semen, pingue, & fuliginosum inuenitur. Quod potum tussi opitulatur, vesicæ calculos comminuit, serpentium ictibus aduersatur. Folia & radix astricloriam vim habet: quorum decoctum potu aluum sistit, urinam trahit: contra venena, & serpentium morsibus auxiliatur. Radix relictia tubercula, tumoresq; omnes discutit, trita, & imposita,

Acuta

Acuta spina. CAP. CV.

Acuta spina, quam pyrinam, aut pitya n-
them aliqui vocant, arbor est pyraastro si-
milis, spinosa valde, & minor: baccas pfert myr-
ti, planas, rubras, fragiles, & intus nucleum:
radicem multifidam, altè descendantem. Huius
bacca potu, aut cibo, alui profluvium, & abun-
dantiam sceminarum sistunt. Radix illita acu-
leas, et spicula extrahit: abortum fieri tradunt,
si ter radice venter aut sensim feriat, aut per-
ungatur.

Rubus canis. CAP. CVI.

Ructex est arboris instar, rubo longè ma-
ior. Folia fert multò latiora myrro, robustis-
sima ramos spinis, flore candido: fructu oblongo,
nucleo olivæ simili, qui per maturitateam sulcu-
scit, & flocculos intus continet. Fructus exem-
ptis interioribus floccis arefactus, alvū sistit, fer-
uefacti enim ij in vino, mox poti, arteriam in-
festant. Ligustrū. CAP. CVII.

Ligustrum arbor est oleæ folijs circū ramos
similibus, latioribus, mollioribus, & colore
viridioribus: flore cādido. muscoso, odorato: semi-
ne sabuci, nigro Optimū nascitur in canope, et as-
calone. Folia astr: et toriā vim habet: quare cōman-
ducata ulceribus oris medētur illita feruidis in-
flā: mitionibus, carbūculisq; psunt: decocto eorū.
de igni abūsta fouētur: capillū rufant trita so-
lia, q̄ in radicle succo maduerint, Flos ex aceto,

f. 2. fronti:

fronti illitus, capitis dolorem sedat. Cyprinum oleum, quod ex eo fit, odoratum, excalfacit, & mollitq; nervos: si quæ ferventi natura prædita sint, assumat.

Phyllirea. CAP. CVIII.

Phyllirea arbor est ligustri magnitudine, folijs oleæ nigrioribus, & latioribus: fructu lētisci, nigro, subdulci, racematim coerente, asperis nascitur. Huius folia astringunt: ad eadem vtilia, ad quæ oleaster, cum astringitione est opus: maximè ad oris vlcera commanducata, aut si decocto colluantur: pota vrinam, ac menses cuncti,

Cistus. CAP. CIX.

Cistus, quem aliqui citharon, aut cissaron vocat, ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus: saxosis locis nascens, folijs rotundis, acer.
 • Vox ex hiss-hirsutis. flos masculo vt mali punice, sæm. Plinio re- na albet. Vis astringens: vnde flores in vino apposita.
 stero bis in die poti, prosunt dysentericis, & ne mas per se illi cohibent: vetustati vlcerum, & igni ambustis cum cerato medentur. Hypocistis rhobethron, aut cytinus à nonnullis cognominata iuxta cistri radices nascitur, floris punici similitudine. Quædam rufa, & altera herbacea, tertia candida. Liguatur acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant, fractamq; macerant, & incoquunt, reliqua; vt in lycio prosequuntur. Vi- res acacia habet, verum aliquantò magis siccant.

ficat, & astringit. prodest dysentericis, cæliacis, sanguinem excreantibus: fœminarum profusio & pota, & indita.

† Hæc dictio non legitur in Græcis codicibus. Sed eam huc ad clariorem (vt puto) sensum ex Plinio trāstulit Ruellius: quòd verbum illud à Dioscoride studio fortasse breuitatis omissum, satius addendum esse duxerit, quàm subintelligendū. quod etiam Hermolaus fecit.

† Nil mirum esse debet, quòd Plinio duo tantum hypocistidis genera prodantur. coloribus rufo, & candido distincta: quādoquidem ijs dūtaxat Oribasius quoque contentus fuisse videtur libro xii. vbi genus *χλωρόν*, hoc est, herbaceum, vt vulgati codices habent, non legitur.

Ledum Ladanum. CAP. CX.

Est & alterum cisti genus, Ledon à nonnullis appellatum, frutex simili modo nascēs, longioribus folijs, & nigrioribus, quæ verno tempore quiddam contrahunt pingue. Foliorū vis astringens, ac eosdē, quos cistus, effectus præbens. Fit ex eo quod Ladanum dicitur. siquidē cūm cisti frondes pascuntur capræ, hirciq; pinguitudinem conspicuè barba carpūt, & suo lentore villosis cruribus adhærescentem reportant: quam depeccantes incolæ, colantesq; cogunt in offas, & ita recondunt. Alij verò attractis fu-

niculis, infidentem fructicibus lentorem abster-
gunt, conglomerantq; in ladanum, Maxime pro-
batur odoratum, subuiride, facile mollescens, pro-
gue, quod arenas nō collegit, nec squalore obfusi-
est, resinofum, quale in cypro gignitur. Arabi-
cum verò, Lybicumq; vilius: Natura ei spissando
calfaciendi, molliendi: ora venarum patefaci-
capillum fluentem continet, addito vino, myr-
rha, & myrteo oleo: cicatricibus decorem red-
dit, cum vino illitum: medetur aurium dolori-
bus, cum hydromelite, aut rosaceo infusum: suffi-
tu secundas eijcit: pessis immistum vulua duri-
tiam sanat, In medicamenta, quae dolore tussim
q; finiunt, & malagmata vtiliter inseritur: al-
uum sistit cum vino vetere potum, & urinam
ciat.

Ebenus.

C A P. C X I.

EBenus optima habetur Aetiopica, & nigra,
nullos habens venarum discursus, factusq; cor-
pus leuore: cum frangitur, densa apparet, mor-
dens gustu, atque astringens. Suffitur incundo
odore supra carbones, sine fumi tactio. Recens au-
tem ad ignem prolata, ob pinguitudinem accen-
ditur, & trita ad totum ruffescit. Altera est lu-
dica, internatis segmentis candicantibus, & mo-
dicè fuluis, item frequentibus maculis. ceterum
prior bonitate antecedit. Apud quosdam sesa-

mina

mina, aut spinea ligna consimilia pro ebena veniunt. Quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assulas resolvuntur, nihil mordacitatis in gustu; nec redolentia in suffitu praferentia. Caliginem oculorum absterget: ad veteres destillationes, pustulasq; mirum in modum pollet: si quissiam facta ex eo coticula collyrijs vtatur, melius proficiet. Ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes, ramentaeue vino Chio die, noctuq; macerata, in collyria digerantur. Nonnulli praeterita ipsa excolant, reliquaq; eundem in modum peragunt. Alij pro vino aqua vtuntur. Vritur in fictili: nono, donec in carbonem redigatur. Lavatur plumbi vsti modo, & ita sicca, scabriq; lippitudinibus conducit.

Rosa. CAP. CXII.

Rosa refrigerat, & astringit, sed sicca magis astringit. Succus recentibus folijs exprimitur, defectis forfice vnguibus (sic appellatur candida foliorum partes) reliquum in pila premi, & teri debet in umbra, donec coeat, & ita ad oculorum circulations recodi. Siccatur etiamnum folia rosarum, continuò versata, ne muceat, neue sitis in ijs insideat. Aridis rosis, & in vino decoctus expressus liquor, facit ad dolores capitis, aurium, oculorum, gingivarum, sedis, recti intestini, ac vulvae pena illitus, aut infusus. Eadem sine expressione tusa, praecordiorum inflammationi-

ribus, humidis stomachi vitijs, igni sacro illi
prodest: siccis. ac tritis semina asperguntur. mi-
sceri solent vulnerarijs antidotis, atque compo-
sitionibus, quas antheras vocant. Folia virtute
in cailliblephara. Flos, qui in medijs rosis inuen-
tur, siccatus, gingiuarum fluxionibus efficaci-
ter inspergitur. Capita pota citam aluum, &
eruentas reiectiones sistunt.

Rosei pastilli. CAP. CXIII.

Pastilli, quos rhodides vocant, hac ratione
conficiuntur. Rosarum viridium, quae nullo
antea humore madefacta extabuerint, drach-
mae quadraginta, Indica nardi drachma decem,
myrrhae drachmae sex, tritae digeruntur in pa-
stillos, qui trium obolorum pondus aequent: sic-
cati; in umbra in fictili non picato, atque ob-
turato reconduntur. Alij adijciunt costi dra-
chmas duas, iridis Illyricij totidem, & vinum
Chium cum melle miscet. Mulieribus moniliura
vice collo circumdato vsui sunt, ad retunden-
dum graue sudoris virus. Tritis etiam vtuntur
ad illitiones, & diaspasmata, quae fiunt ad su-
dores coercendos, ita vt à balneis inarescant cor-
pora, dein frigida aqua abluantur.

Lycium. CAP. CXIIII.

Lycium, quod aliqui pyxacatham vocat,
arbor est spinosa, ramis trium cubitorum,
aut longioribus: folijs buxi, densis: fructu pipi-
ris

ris, nigro, leui, amaro, densoq; : cortice pallido, non dissimili lycio madesaeto: radicibus multis, obliquis, lignosis. Nascur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisque alijs locis. aspera loca amat. Succı extrahendi ratio hac est. Rami cum radiculis tusi, & antè per multos dies macerati coquuntur: tum abiectis lignis, itidem liquor coquitur, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id lycium, adiecta decoctioni amurca, aut absinthij succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendum exempla, oculorum medicantis additur: reliquo ad alia vtuntur. Simili modo fit lycium semine expresso, & insolato. Optimum, quod vri potest, restinctumq; rubentem spumam ostendit, glebis intrinsecus nigris, intus, cum frigeris, rufis, odore minimè viroso, cum amaritudine astringens, crocino colore: cuiusmodi Indicum est, ceteris præstans, & efficacius. Lycium astringit, caliginem oculorū discutit: genarum scabiem, pruritus, veteresq; fluxiones sanat: facit ad purulentas aures, exulceratas gingiuas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusq; illitum: celiacus, dysentericis, potum, inditumq; conuenit: datur sanguinem excreantibus, & tussi ex aqua. contra rabiosi canis morsus in catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur: flauos facit pilos: reduujs, vlceribus, quæ serpunt, aut putrent, medetur: sceminarum profluvia appositum sistit: rabiosorum

ictibus ex melle potum, aut vice catapotij deuoratum, auxiliatur. Tradunt Indicum fieri Lycium, ex frutice lonchitide appellato. Ea spinarum generi ascribitur, ramos rectos habens, ternum cubitorum longitudine, maioresue, rubicraffiores, à radice numerosos: fractus cortex relescit: folia oleis similia. Herba in aceto decocta proditur lienij inflammationibus, & regio mabo mederi, & fœminarum purgationes elicere. Assueuerant etiam crudam in potu, eosdem effectus prestare: semen cyatho dimidio potum, pituitam expurgare, venenis quoque auxiliari esse.

Acacia. C A P. C X V.

Non est genuina **A** Acacia in Aegypto nascitur, spina instar arboris, fruticosa, non se in rectum attolens. Florem habet candidum, & semen lupini. Acacia, simile in folliculis: ex quo succus expressus siccaquãus ea tur in umbra, niger ex maturo semine, subinde vi acsus ex viridi Eligatur modicè rufus, & odoratur, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimitur ex folijs, & semine succum. Manat & gummi ex ea spina. Vis ei ad spissandum, refrigerandumq; efficax. Succus oculorum medicamentis utilis: valet ad ignem sacrum, vlcera quaserpunt, perniones, pterygia, & oris vlcera: proci dentes oculos reprimi: mensium abundantiam sistit: prociduum vuluam cohibet: citã aliũ suppri

mit, aut potus, aut subter inditus: capillos denigrat. Lauatur oculorū medicamentis, trito in aqua, mox effuso, quod concreuerat, donec pura extet aqua: & ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in cruda fidelia, donec. fictile fornacibus percoquatur: torreturque in carbonum halitu perskata. Spina decoctum solutos artus fotu committit. Praefertur eius spina gūmi, quod in vermiculorum speciem contrahatur, & vitri modo perluceat, ligni expers: proximum est candidum sordidum verò, ac resinosum inutile. Cutis meatus obstruit, & medicamentorum, quibus admiscetur, acrimoniam hebetat: ambustis ex ouo illitum, pustulas non patitur erumpere. Alterum Acaciae genus in Cappadocia, Pontoq; prouenit, Aegyptiae spinae similitudine, longè minus, tenerius, humile: aculeorū vallo munitur, folia habens rate: semen lenticula minus fert autumno, in oculis connexis, ternum, quater-vumue capacibus. Succus eius astringit, viribus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

Vitek.

CAP.

CXVI.

Vitek, siue lygos, frutex est in arborem ^{Barba-} assurgens. Nas citur in fluminum ripis, a- ^{ris agnus} sperisq; locis, ac torrentiū alueis: ramos gerit lon- ^{castus.} gos, fractu pernices: folia oliuae, sed molliora. Duo genera eius: vna harū albū florem mittit

cum

cum purpureo: altera tantum purpureum, & semen, ut piper. Excelsa factorias vires habet, & astrictorias. Semen eius potum venenatis ictibus aqua quæ cutem subyt, lienosisq; auxiliatur. lac euocat: menses ciet: drachma pondere in vino potum: genituram exoluit: caput tentat, & soporem affert. Decoctum herba, & semini in dissolutione, mulieribus vulua malo opportunus opitulatur: item inflammationibus. Purgatione mouet semen cum pulegio potum, etiam suffutu, vel appositum: capitis dolorem dissoluit illitum: instillatur cum aceto, & oleo capiti in lethargo, & phrenitide. Folia suffitu, aut substratu fungant venenata: illita quoque serpentium moribus auxiliantur: testium duritias, cum butyro, & folijs vitium emolliunt. Rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat: & cum folijs medetur luxatis, vulneribusq;. Virgam qui manu teneat, dum iter facit, negatur intertriginem sentire. Agnum, quasi dicas castum, vocant Græci, quoniam matronæ in Thesmophorijs Atheniensium castitatem custodientes, folijs huius cubitus sibi sternunt. & lygon, quæ vimen, propter inuictam ferè ramorum flexilitatem.

Salix. CAP. CXVII.

Salix vulgo nota est. Cuius semen, folia, cortex, & succus spissandi vim habent. Trita
folia

folia cum exiguo pipere, & vino pota, ileosis subueniunt: sumpta per se. & cum aqua præstant mulieribus, ne concipiant. Salignum semē in potu sanguinem expuentibus prodest. Cortex eosdem prabet effectus. corticis cinis admisto aceto maceratus, illitu clauos, & callos tollit, Ex folijs, & cortice succus cum resaceo in calyce punici calsactus, aurium doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras foueri utilissimū: furfures purgat in corpore. Excipitur succus, qui manat ex ea, cum floret, exciso cortice: in pla-
ga enim concretus humor inuenitur, qui ad purganda, quæ obstant oculis, suā vim prabet.

Siluestris olea. CAP. CXVIII.

Syluestris olea, quam aliqui cotinon, id est, Soleastrum appellant, alij Aethiopicam oliuā, folia astringunt: trita autem & imposita ignē sacrum, vlcera quæ serpunt, epinyctidas, carbūculos, reduuias, nomasq; cohibent: crustas emarginant cum melle illita: quinetiam sordida vlcera repurgant: inflammationes, panosq; cum melle imposita discutiūt: cutem à capite vulsam conglutinant, oris vlceribus, & priuatim infantium commanducata medentur. Succus, & decoctum eosdem habent effectus: sanguinis eruptiones, ac muliebri profluuium, admotus succus inhibet: vna oculorum, pustulisq; prodest: vlcera, & veteres defluxiones sistit: quapropter
in col

in collyria additur, ad palpebrarum erosiones per
 quam utilis. Exprimitur succus tritis folijs, affu-
 so vino, aut aqua, sicatusq; sole in pastillos di-
 geritur: sed longè validior ad recondendum suc-
 cus habetur, qui cum vino, quàm cum aqua ex-
 pressus est. auribus subuenit, siue vlceretur, siue
 pus effluat. Folia conuenienter cœliacis cum fa-
 rina hordeacea illinuntur. Vruntur cū floribus
 folia, vt spodij vicem cinis præstet, in cruda ol-
 la, oblito ore luto, vsque dum figlinū percoqua-
 tur: restincta q; vino, & rursus subacta, eodem
 modo vruntur: postremo ceruse modo elota cogū-
 tur in pastillos. Huiusmodi cinerem in medica-
 mentis oculorum, constat spodio non cedere, sed
 eisdem viribus præditum esse putandum est. Fo-
 liorum satina olea eadem vis intelligitur, sed
 aliquanto inferior: vnde ocularibus medicamen-
 tis ob suam mitiorē vim conuenientiōr est. Sudor
 ligno virenti accenso manans, illitu sanat liche-
 nas, furfures, & scabiem. Oleaginum semen il-
 litū medetur furfuribus, & vlceribus, quæ de-
 pascunt, vorantq; : quod autem intra nucleum
 est, ex adipe, & farina sabros ungues excutit.
 Colymbades trita, & ambustis illita, pustulas
 gigni prohibent: sordida vlcera purgant. Mu-
 ria succus collutas gingivas contrahit, & mo-
 tus dentium firmat. Olina flaua, & recens
 stomacho utilior est, ventri difficilis: nigra au-
 tem, & matura corruptioni opportuna est, sta-

macho aduersatur, oculus non conuenit, capitis
dolorem mouet: arefacta illitu depascentia vlce-
ra sistit, & carbunculos emarginat. Oleum syl-
uestri oliuæ gingiuis putri vligine laboranti-
bus colluitur, dentium mobilitates stabilit: calfa
Eisfotus gingiuis fluxione laborantibus utilis
est: lanam enim specillo circumligatam oleo ma-
desacere oportet, & gingiuis adnouere, donec
albe spectentur.

Lachrima Aethiopicæ oleæ.

CAP.

CXIX.

Lachryma, quam Aethiopica olea stillat,
scammonio similis quadantenus est, fulua,
stillis, exilibus constans, mordax. Quæ autem
ammoniæ, aut gummi similitudinē refert, colo-
re nigricans, nec gustu mordens, superuacua est.
Nostrates oleæ, oleæstriq; similem lacrymam su-
dant, quæ commodè ad oculorum hebetudines
illinitur: cicatrices, albuginēsq; illitu emendat:
urinam, & menses ciet: canis dentium impressa-
ad dolores efficax est. Inter venena scribitur,
partus pellit: lepras, & impetigines sanat. Ap-
pellatur autem Aethiopica, & agrestis olea.

Amurca.

CAP.

CXX.

Amurca expressæ oliuæ recrementum est.
Decocta in cupreo vase ad crassitudinem
mellis astringit, ceteros præbens lycij effectus.
Insper dictum dolori, & pulneribus cū aceto,
ano, aut mulso commodè illinitur: additur in
med.

medicamenta ocularia, & meatus inductu seu obstruentia. Vetustate meliorem fieri constat. Vtiliter infunditur sedis, genitalium, ac vulu exulcerationi. Si verò cum omphacino recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit: iumetorum scabiem cum decocto lupinae & chamaleonte illitu sanat. Cruda, & recentia murca podagras, articulariosq; dolores fouet, vtilissimum: peruncta in villosa pelle, & hydropicis imposita, tumoris molem reprimat.

Quercus, Glans, Fagus.

Ilex. C A P. C X X I.

Quercus omnis adstrictoriam vim habet, praesertim liber, qui cortici, & ligno intercedit: quinetiam tunica putamini glande subiecta. Decoctum ex ijs datur dysentericis, coliacis, sanguinem excreantibus. Trita in pestis faeminis fluxione vulua laborantibus subiicitur. Glandes eosdem effectus exhibent: urinam ciunt: capitis dolorem, & flatus in cibum sumpta pariunt: resistunt esitata venenatorum ictibus. Decoctum earum, & corticis cum lacte raticino potum, prodest contra toxica. Intritae cruda inflammationes illitu leniunt: ad duritias, quas cacoethe vocant, & malefica vlcera cum salsa axungia conueniunt. Iligneae glandes viribus quernas antecellunt. Fagus, & Ilex quercus generi assignantur, & consimile munus obeunt. Iligneae radice cortex cum aqua coctus,

dum

dum mollitus intabescat, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. Folia omnium tusa, & trita tumoribus prosunt, & imbecillas membrorum partes corroborant.

Castaneæ. CAP. CXXII.

Ardianæ glandes, quas aliqui Castaneas, Saut lopima aut glandes Iouis appellant, adstringunt ipsæ, similesq; effectus prebent: preferunt tunica, quæ carnem, et corticem media intercursat. caro his, qui ephemerum biberunt, conueniens est.

Galla. CAP. CXXIII.

Galla fructus est quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidem, sed articulorum manus modo rugosa, solida, nullo foramine peruia. Altera plana, leuis, perforata. Eligi debet omphacitis, quæ efficacior est. Vtriusq; vis vehementer astringere. trita excrecentia in carne, fluxiones gingivarum & vna, atque oris ulcerationem cohibent. Nucleus dentium cauernis inditus, dolorem sedat. Cremata carbonibus, donec igne flagrent, & vino, aut aceto, aut acida muria extincta, sanguinem supprimunt. Decoctum quibus insidere expedit, efficax est, & contra vulvas procidentes, fluxionesq;. Capillos de nigrant, aceto, aut aqua macerata: dysentericis, cæliacisq; cum vino, aut aqua trita conuenienter illinuntur, aut bibuntur: obsonijs addi debent, aut integræ in aqua præcoqui, in

g.

qua.

qua nonnihil excoquendū est, quod his affectibus cōferatur. In summa his vtendū ad adstringēda, aut sistenda, aut siccanda, quae opus sunt.

Rhus.

CAP. CXXIIII.

RHUS: quae obsonijs aspergitur, ab aliquibus erythros appellata, semen est coriandri fructicis, sic vocati, quoniā coriorū infectores vtuntur ad inspissandas pelles, Arbuscula est in petris, nascens binum ferē cubitorū altitudinis, folijs oblongijs, subrubentibus, in ambitu seratis † illucis modo: acino vuarum gracilium, densa, magnitudine terebinthi, quadātenus lateris ius corticosa tunica perquā utilis est. Folia vim habent adstringendi, & acaciae effectus praebet. Decoctum capillos denigrat: dysentericis insuntur. & in potus eorum, in seſſuq; adijcitur: instillatur auribus purulentis, gangrenas, & pterygia cohibet folia ex aceto, aut melle illita. Liquamentum fit ex aridis folijs, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadē, vt lycii, conueniens. Semen eosdē effectus exhibet: calicorum, dysentericorumq; obsonijs inspergitur: fracta, desquamata, liuidaq; illitū ax aqua, ab inflammatione vindicat: lingua asseritatuū melle abstergit: candida faeminarum profluvia sistit: hemorrhoidas sanat, cum querno carbone intrito admotum. Aqua, in qua semē maduit, decocta cogitur, coitq; , efficacior quodammodo

ipso

ipſo ſemine. Gummi deſert, quod dentium canis imprimitur, ad dolores finiendos.

† In vulgatis Grecis codicibus hic legitur *πρινοειδὴς*, hoc eſt, illicis modo. Hæc dictio qua ratione ab interpretibus Ruelio, & Marcello omiſſa fuerit, certè neſcio. Sed mihi quidem viſa eſt non omit- tenda, quò non modò eam quoque Oribaſius legat, ſed quòd etià Rhus folijs pulchrè Illicem æmuletur.

Palma.

CAP. CXXV.

Palma in Aegypto gignitur. Ea medio ma- turitatis vigore, autũno decerpi ſolet, Ara- bici myrobalani ſimilis, pomatis cognomine, co- lore viridi, & odore mali cotonei: quòd ſi ad ma- turitatem peruenire ſinatur, phœnicobalanus fiet. Palma acerba eſt, & adſtringens: contra alui ſcæminarumq; profluuiã, in Vino aſtero bibitur: hamorrhoidas fiſtit: vulnera glutinat illitu. Phœnicobalani recentes plus ſiccis adſtrin- gunt: capitis dolorem afferunt, copioſiores in ci- bo inebriant. Sicciores ſanguinem excreanti- bus, ſtomachicis, & dysentericis vtilis in cibo: il- linuntur cum cotoneo, & cerato ænanthino ve- ſica vitij. Caryotæ, præſertim eſu, faucium a- ſperitati medentur. Thebaicarum decoctum potu æſtuationem ſe dat: vires recreat cum hydroneſite veteri ſumptum: cibo idem fa- ciunt. Fit ex eis vinum ad eadem conue-

niens. Decoctum per se potu, & gargarizatio-
ne magnopere adstringit, & cohibet. Nuclei
palmarum, caterorum more, cremati in cruda
ficili, & vino restincti, cinere loto, spody vicem
efficiunt, miscenturq; in calliblephara. quod
non iustam vsionem acceperint, denuo creman-
di. Vim adstringendi habent. & spiracula ca-
tus obductu suo claudunt: contra oculorum vna,
& pustulas, palpebrarum desluuia, cum narde
effectum prabent: corporis excrescentias cum vi-
no reprimunt: vlcera ad cicatricem perducunt.
Sed inter primas vtilis ex palmis humilibus
Aegyptia.

Palma elate. CAP. CXXVI.

Palma, qua aliqui elate, aut spathā, appe-
lant fructus palmarū adhuc florentiū inuo-
lucrum est: calyxq; quo in spissamenta vnguen-
tarū vtuntur. Optima habetur odorata, ad-
stringens, ponderosa, praelusa, intus pinguis.
Vni adstrictoria: sistit vlcera, quæ depascunt:
laxatos artus committit: trita misceatur cata-
plasmatis, & malagmatis: prodest pracordijs,
imbecilli stomacho, & iocineri affecto, mista con-
ferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum subin-
de detersum, capillos denigrat, datur bibendum
congruē renum, vesicae, & viscerum vitijs: vni-
us, ac ventris fluxiones sistit: scabiem cum resi-
na, & cera sanat, si viginti diebus recēs apponatur.
Inuolutusq; in ea elate fructus, quē suo am-

plexa

plexu fouet,erate etiam vocari solet, & ab ali-
quibus borassus. Adstringit, & spathæ effectus
prestat, non sic vnguentis expetitus. Alba me-
dula caudicis recens in cibo, aut decocta, eadem
facit, quæ borassus.

Malum punicum. CAP. CXXVII.

Malum punicum ² omne boni succi est, sto- Vultu
macho vtile, perexiguū sufficiens alimen- malū gra
tum. Dulcia stomacho vtiliora habentur, sed ali natum.
quantulū in eo calorem gignunt, inflationes pa-
riunt, vnde in febris abdicantur. Acida adstrin-
gūt, æfluanti stomacho auxiliantur, & multò
magis cōtrahūt, ac vrinā cient: ora, gingiuasq;
lādunt. Vinosa verò mediam sortiuntur natu-
ram. Nuclei acinorum acidi punici in sole siccati
& obsonijs insparsi, concocti uie, fluent ē aluum,
stomachumq; sistunt: cœlesti aqua madescent, bi-
bunturq; commodè sanguinem excreantibus: ad
desessus dysentericorum, scēminarumq; fluxio-
ne vulua laborantium vtilis sunt. Expressus
nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris
virilitatis, & sedis vlcera, nomas, reduuias, &
ea, quæ in corpore extuberant, aurium dolores,
& narium vitia, præsertim acidorum. Huius
flores cytini vocantur: qui adstringunt, siccant,
cohibent: sanguinolenta glutinant: quas puni-
cū, præstant utilitates. humida gingiuarum vi-
tia, mobilesq; dentes decocto coluuntur: herniā

pro lapsu intestini erūpentem: cataplasmate pellunt. Memoria tradūt, qui tres quā minimū cytinōs denorauit: nullā eo anno lippitudinem passurū. Eliquatur hypocistidis exemplo. Malicorium asperum est mali punici putamē, quē aliqui sidion appellant. Id spissandi vim habet. & quos cytini, prabet vsus. Decoctum radice potu latas ventris tineas pellit, & easdem euocat. Balaustium syluestris punica flos est, cytino similis. Cuius complura genera reperiuntur: candidum, fuluum, colore rosaceo. Succus ex eo exprimitur, hypocistidis modo: cui adstrictoria vis inest, eadem faciens, quā hypocistis, & cytinus.

Myrtus

CAP. CXXVIII.

MYrtus satina nigra vtilior est medicina. Quā candida, & in hoc genere multo. magis montana: semē tamē imbecilius parit. Vnus myrti, & seminis astringit. Semē viride, aut aridum in cibo datur sanguinē excreantibus, & vesicae erosionibus. Succus virentibus bacis expressus, eosdem effectus exhibet: stomacho vtilis, vinnam cit: prodest contra phalangij morsum, & scorpionis ictus in mero. Seminis decoctum capillum tingit. Ius decocti in vino vlcera in extremis membris nata sanat: oculorum inflammationes illitum cū polline polentæ lenit: contra agilopas illinitur: crapu' am arcet praesumptum vinum, quod seruesacto aliquantum eius semine exprimo

exprimatur: aliàs enim acorem contraheret. Prestat idem seminis effectus: vtile procidentie vulnarum in defensionibus, sedis vitij, & sceminis fluxione vulua laborantibus: purgat fursures, vlcera capitis manantia, atque eruptiones papularum. fluentes capillos cōtinet. Additur quoque in medicamenta, quas liparas vocant, vti oleū, quod ex folijs eius factū est. Decoctū foliorum ad defensiones balnearum conuenit, & contra laxatos artus, & malè solidescentes: eo fracta ferruminationi repugnātia vtilissimè fouentur: viti:iginem emendat, purulentis auribus infunditur, & capillos denigrat. Succus eorum eadem efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis vlceribus, & partibus omnibus fluxione laborantibus, cœliaciq; prosunt: & admisto omphacino oleo, aut exiguo rosaceo cū vino, ad vlcera serpentia, ignem sacrum, testium inflammationes, epinyctidas, & condylomata. Arentium foliorū farina vtiliter inspargitur paronychijs, pterygjs, & contra alarum, sceminumq; perfusiones: cardiacorū sudores cohibet. Folia cruda, seu cremata cū cerato, ambustis, paronychijs, pterygjsq; medētur. Ex primitur folijs succus, adfuso vtcre vino, aut aqua cœlesti, cuius recētis vsus est: nā exiccatus planè carie sentit, et vires amittit. Myrtidanū dicitur, adnatū inequabile, verrucosum, intumescensq;, & concolor: quod perinde quasi manus, myrti caudicem am-

plectitur, coactumq; in pastillos siccatur in vmbra: multò efficacius & folio, & semine, ceratopessis, in sessionibus, cataplasmatibus admistum ubi adstringendum aliquid est.

Cerasia.

CAP. CXXIX.

Cerasia aluo utilia sunt, si viridia sumantur: eadem siccata illam sistunt. Gummi, quod cerasi resudarunt, cum vino diluto, tussis vetusta medetur: colorem commendat, visum exacuit, appetentiam inuitat: idem ex vino potum calculosis auxilio est.

Siliquæ.

CAP. CXXX.

Siliquæ recetēs stomacho aduersantur, alium soluunt eadem siccata sistunt, stomachoq; utiliores sunt: vrinam ciunt, sed præcipuè, quæ vinaceis conduntur.

Mala.

CAP. CXXXI.

Folia, flores & germina cum omnis mali, tum maximè cotoneæ adstringunt. Pomis acerbis adstringendi vis in est, maturis uerò longè secus. Ex ijs verna bilem gignunt, nervos omnes ledunt, inflationes pariunt. Cotonea stomacho utilia, vrinam ciunt: uerum tosta mitiora habentur. prosunt cœliacis, dycentericis, purulenta exitu sistentibus, cholericis, præsertim cruda. Maceratorum liquor commodè in stomachi. aut uentris fluxionibus, potui datur. Succus crudorum assumptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fouentur vulua, & sedes, si procidant. Cotonea

qua

que melle cōdiuntur, vrinam mouent: mel autē sibi constringentem illorum vim, & inspissantem adsciscit. Quæ cum melle coquuntur, stomacho, atque ori gratiora sunt, sed minus inspissant. Cruda cataplasmatibus adiunguntur, ad cohibendum aluum, aut si stomachus estuet, aut in vomitiones effundatur, ad mammarū inflammationes, præduros lienes, & condylomata. Fit vinum ex ipsis tussis, expressisq; : sed quò perduret, quindecim sextarijs succi vnus mellis adiungitur, alioquin in acorē degenerat. Prodest ad omnia, quæ dicta sunt, Fit & oleū ex ijs, quod melinum vocauimus: quo vtimur, quoties adstringenti oleo est opus. Eligi oportet vera, quæ sanè sunt rotunda, parua, & odorata, quæ rerò struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus vtilia. Flos & viridis, & siccus cataplasmatibus imponitur: ijs conueniens, quæ adstrictionem desiderant, inflammationibus oculorum, reiectionibusq; sanguinis: contra citam aluum, & mensium impetus, in vino bibitur. Melimela ventrem molliunt, & ab eo animalia expellūt: stomacho negotium exhibent: aestuationem faciunt, ea multis dulcia mala vocantur. Epirotica mala, quæ Latine orbiculata dicuntur, stomacho vtilia, sistūt aluum, vrinas euocant: malis tamen cotoneis inualidiora. Siluestria mala similia sunt vernis, & adstringunt. Sanè in hūc vsū immatura omnia opus sunt. Persica poma

maturatā stomacho, quā ventri vtilia sunt, acerbā aluum cohibent, sed sicca vehementibus. Decoctum ē siccus alui, stomachiq; fluxiones sistit. Armeniaca, quā à Latinis præcocia dicitur, minora sunt supradictis, & stomacho vtiliora. Medica mala, p̄ficacē, aut cedromela, quā Latini citria vocant, nemini non cognita. Arbor ipsa omnibus anni temporibus pomifera, alijs deciduus, alijs subnascentibus. Malum oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cum gravitate odoratum. semen habet pyri. Id in vino potum venenis resistit, aluum mouet: cōsuauitatem commendat, decocto eius colluto, aut succo: estur in malatia mulieribus. Vestiaris impositum ab erosionis vitio vestes vindicare existimatur.

Pyra. CAP. CXXXII.

PYrorū multa genera. Quæ tamē omnia adstringūt: pinde addūtur cōueniēter in repletia cataplasmata. Decoctū ē siccis, et cruda ipsa aluū sistūt: ieiunos esitata ledūt. Achras pyrastri genus est, qđ tardissimē maturescit. Vm pyro adstringētiorē habet, & ad eadē cōuenit. stringūt etiā eius folia. Ligni pyrorū cinis efficaciter lues auxiliatur, quos fungi strāgulāt. Aūt fungos syluestria pyra cū eis coquātur, innoxios fieri.

Mespilus. CAP. CXXXIII.

MESPILLUS, quā à nonnullis aronia vocatur, spinosa arbor est, folio pyracantha, siue o-

xyacantha. Fert pomum suaue, exiguo malo nõ
dissimile, tribus intus ossiculis : qua ex causa id
nonnulli tricocon appellanere. Tarde maturef-
cit, esu adstringit, stomacho gratum est, aluũq;
supprimit. Alterum mespilli genus in Italia
nascitur, quod aliqui setanium, alij epimelida
vocant. Arbor solijs mali, sed minoribus. Pomũ
fert rotundum, esui aptum, vmbilico latiore: qđ
adstringit, seroq; maturescit.

Lotus arbor. CAP. CXXXIII.

Lotus arbor est valde magnitudinis, ferẽs
baccam pipere maiorem, dulcem, cibis gra-
tam, stomacho facilem. Aluum sistit bacis. Ra-
mentorum ligni decoctum siue potu, siue infusio
ne dysenterici, ac sceminis fluxione vulua labo-
rantibus auxilio est : rufat capillos : citam al-
uum cohibet.

Cornus. CAP. CXXXV.

Cornus dura arbor est, baccas ferens oli-
ua modo oblongas, qua primũ virent,
dein per maturitatem rubescunt, aut cera colo-
rem representant. In cibo adstringunt : proflu-
uio alui, atque dysenteria salutare, siue in edu-
lio, siue in defueto exhibeantur. Muria, vt oliua,
condiuntur. Sanies, quam virentia folia tor-
rendo resudarunt, impetigini conuenienter illi-
nuntur. Sorba. CAP. CXXXVI.

Sorba colorem luteum referentia, priusquã
maturescãt, discepta, & sole siccata mādũtur

ut aluum sistant. Eadem est functio molitorum farina, si polente loco sumatur. Quod & decoctum eorum in potu præstat.

Prunus. CAP. CXXXVII.

Prunus arbor est nota. Cuius pomum est, sed stomachum malè habet, aluum mollit. Syriaca pruna, & præcipuè quæ Damasci gignitur, exiccata stomacho utilia sunt: aluum adstringunt. Folia pruni in vino decocta collutione, & gargarizatu, vuam, gingiuas, & tonsillas fluxione laborantes reprimunt. Præstant idem syluestrium Prunorum bacca, post maturitatem exiccata: cum sapa verò decoctæ stomacho utiliores redduntur, aluumq; magis adstringunt. Gumi prunorum agglutinat: potum in vino calculos: comminuit: ex aceto quoque illitum, lichenas infantium sanat.

Arbutus. CAP. CXXXVIII.

Arbutus siue vnedo, arbor est coronea malo non dissimilis, tenui folio: cuius fructus magnitudinem pruni magnitudinem implet. nullo intus nucleo huic memaculo cognomen est. Maturus aut flabidus fructus uet, aut rubescit: in esu acerosus, stomacho aduernequa- satur, capitisq; dolorem mouet.

quæ cedit: Amygdalæ. CAP. CXXXIX.

Amygdala amare radicum tritarum decoctum vitia cutis in facie corrigit. Illæ expressere nuces idem munus præstant: menses admota fert fraga ciunt: capiti dolori auxiliantur, illis a frõti, aut temporibus

temporibus cum aceto, vel rosaceo: epinyctidas vt nihil sanant ex vino: item putrescentia vlcera, & q̃ queat exserpunt, & morsus canum cum melle. Earum pressius. autem esu dolores finiuntur, aluum emolliunt, somnum faciunt, vrinam cient: contra sanguinis reiectiones cum amylo, & menta assumuntur: renum vitijs, & pulmonum inflammationibus ex aqua in potu, aut eclegmate cum resina, terebinthina dantur: calculosis, difficiliq; vrina in passo auxiliantur: & illinctu cum melle, et lacte hepatissis, tussi, & inflationibus coli, nucis auellanae, magnitudine. quinis, septenisue praesumptis, ebrietatem non sentiunt potores. Vulpes si cum quadam esca eas vorauerint, emoriuntur. Gummi eius calfacit, & adstringit: reijcientibus sanguinem potum auxilio est: impetigines, quae summum corpus occuparunt, illitum cum aceto tollit: tussi vetusta cum diluto vino potum medetur: calculosis cum passo bibere prodest. E nucibus Gracis, dulces cibo idoneae, sed multò minus valent in remedijs, quàm amarae: attamen extenuant, vrinam ciunt. Recentium esu cum suo putamine, humida stomachi vitia emendantur.

Pistacia. CAP. CXL.

Pistacia, quae constat in Syria gigni, pineis nobiscibus similia sunt, & stomacho amica. Trita cum vino serpentium ictus prosunt, siue edantur, siue bibantur.

Nux

Nuxiuglans. CAP. CLI.

NVces Iuglandes, quas nonnulli Persici vocant, sunt difficiles concocti, stomacho inutilis, bilioſæ, capitis dolorem inferentes, tuſſientibus inimicæ: vomituris tamen ieiunus in cibo aptæ. Cum rupta verò, et caricis præſumptæ, & à ſummo cibo, venenis reſiſtunt, nec minus ſi à veneni haſtu commedantur, largius eſtate, tineas latas pellunt: illinuntur mammarum inflammationi, abſeſſibus, luxatisq; cum mellis exiguo, & ruta, cum cepa autem, ſale, & melle, canis, hominisq; morſui proficiunt: tormina, cum calyce ſuo peruſtæ, & vmbilico admotæ, ſedant. Putamen combuſtum, tritumq; in oleo, & vino infantium capite peruncto, nutrit capillum, alopecias replet. Siſtum menſes nuclei vſti, ſi triti ex vino admoueantur: ijdem è veteribus illi carbunculus gangrenis, & ægilopijs medentur, alopecijs commanducati, & impoſiti præſentia ſunt remedio. Nucibus tuſis oleum exprimitur. Recentes ſtomacho innocentiores ſunt, vtpote ſuauiores; itaque allio miſtæ eximunt ærmoniam. Liures in corpore illitæ tollunt.

Nuces auellana. CAP. CXLII.

NVces auellana, quas & leptocarya vocant, ſtomacho infeſtæ ſunt: ipſæ tamen tritæ, & in aqua mulſa potæ tuſi veteri medentur: toſtæ cum exiguo piperis potæ, deſtillationem concoquunt. Cramatarum cinis cum æxungia

xurgia, aut adipe vrsi perunctus, alopecius capillum reddit, Aiunt nonnulli vsta earum putamina, & in cineris speciem redacta cum oleo, castorum oculorum pupillas infantibus denigrare, perfuso sincipite,

MORUS. CAP. CXLIII.

Morus arbor nota est. Cuius fructus aluum soluit, stomacho inutilis est, & facile corruptionem sentit. Hoc idem præstat mori succus decoctus autem, creto vase, atque insolatus, adstringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarum inflammationes addito mellis exiguo. Sed inolefcit vis eius, adiecto scissili alumine, galla, croco, et myrrha: item myricæ semine, iri, & thure. Immatura mori poma siccantur, tusaq; acinorum rhos vice, obsonijs miscentur, vt cæliacos inuent. Radicis cortex decoctus in aqua, & potus aluum resoluit, latas venteris tinea excutit: his quoque auxiliatur, qui aconitum hauerūt. Folia trita ex aceto illita, ambustis igni medentur, tinguntq; capillum, vitium, & fici nigræ frondibus simul coctis in aqua cælesti. Succus foliorum cyati mensura potus contra phalangiorum morsus auxilio est. Fernesaculi corticis, et foliorum iure, dentes aptissimè in dolore colluuntur. Radix circiter menses incissa, facto in ambitu scrobe, succum emittit, qui postmodum cœcretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est: tubercula discutit, et aluum purgat.

Sico

SYCOMORUS. CAP. CXLIII.

SYcomorum, aliqui etiam sycaminum, id est, smorum, vocant, cuius fructus sycomorum etiam, propter inefficacem gustum, appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo late abundans: folijs mori: pomum ter, aut quater anno fert, non ramis, vt fico, sed caudice ipso, caprifico nõ dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus: qđ non maturescit, nisi vngue aut ferro scalpatur. Nasitur plurimum in Caria, Rhodo, locisq; non multi tritici feracibus: vbi prouentu sæcundo, restibiliq; inuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Pomum alio vtile est, sed perquam exilem prabet alimentum: stomacho aduersatur. Succus primo vere tenera arbore antequam fructum ferat, eximitur, lapidis ictu summo cortice desquamato: si enim altiore plaga violetur cortex, nihil effluet. Spongia, aut vellere lacryma excipitur, qua siccata, et in pastillos coacta, fictili vase reponitur. Vis succi emollit, vulnera conglutinat, discuti collectiones coctioni repugnantes: bibitur etiam aut illinitur contra serpentium morsus, durator lienes, stomachi dolores, & perfrictiones. celerimè terebinthem sentit. Gignitur & in Cipro arbor genere distans, quæ cum sit vlinus, pradiis tamen est folijs sycomor, fructu pruni magnitudine, multo dulciore, supradictis cætera similis.

Caput

Fici. CAP. CXLV.

Fici matura recētes stomachū ledunt, aliuū sol
 nūt, sed faciliē cōtracta ab eis fluxio sistitur :
 sudorem euocant papulasq; , sitim sedant, calorē
 restringunt. Siccis natura excalfaciendi , vires
 alunt, sed sitim magis stimulant , aluo vtilēs,
 rheumatismis ventris , & stomachi contraria:
 gutturi autem, arteria, renibus, vesica, & ijs,
 quos longa valetudo decolorauit , anhelatori-
 bus, hydropicis, comitialibus aptissima. feruēfa-
 cta cum hyssopo , & pota , thoracem purgant:
 tussi veteri, diuturnisq; pulmonum vitijs conue-
 niunt. aluum molliunt tussē cum nitro, & cni-
 co, dein manducata. Decoctum arteria, & ton-
 sillarum inflammationibus gargarizatu pro-
 dest. cum hordeacea farina cataplasmatiscen-
 tur, & in muliebres fetus cum fœno græco , &
 ptisana. Caterū cum ruta cocta , torminibus
 insunduntur: cocta, illitaq; duritias discutiunt:
 parotidas, & furunculos emolliunt : panos ad
 maturationem perducunt , maximē nitro, iri,
 aut calce addita. Cruda, si cum antedictis tun-
 dantur, eadem efficiunt: cum malicorio , ptery-
 giā purgant: cum atramento sutorio , deplora-
 tis ferē tibiarum fluxionibus, & cacoethicis vl-
 ceribus medentur: quin & cum vino decocta ad-
 dito absinthio , & hordeacea farina, vtilissimē
 hydropicis illinuntur. Cramata cum cerato sa-
 nant perniones: pruriginēs : sonitusq; , si cruda

h

teran

terantur, & sinapi, liquoreq; aliquo excepta
 auribus instillantur. Tam sylvestris, quàm sati-
 nae fici lacteus succus coaguli modo lac contrahit.
 concretumq; dissoluit, vt acetum: exulcerat cor-
 pora, meatus aperit. soluit aluum, vulnam re-
 cludit cum detrita nuce Græca potus: menstrua
 ciet cum luteo oui appositus, aut Tyrrhenica u-
 ra: podagricorum cataplasmatibus cum farina fa-
 ni græci, & aceto utilis: lepras, lichenas, vitiligi-
 nes. vitia cutis in facia, psoras, vlcera in capite
 manantia, cū polenta expurgat: instillatus pla-
 ga, percussus à scorpione, venenatorum ictibus,
 & rabiosi canis morsibus auxiliatur: prodigi-
 dentium dolori lana exceptus, & canis eorum
 additus: verrucarum infornicationes tollit cum
 adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem
 præstat succus è teneris ramis sylvestris fici, qui
 lacte prægnantes, silentes adhuc oculo, tusi expri-
 muntur, et siccatus in umbra reponitur. Et lac,
 & succus imponuntur exulceratorijs medicami-
 nis. Decocti cum bubulis carnibus ramuli ficul-
 ni, facilem asserunt decoctionem. Lac efficiunt,
 quod magis soluat, si intercoquendum ficulneo
 furculo, spatha loco, moueatur. Grossi, quæ-
 rinei nonnullis vocantur, cocta illita, & struma
 nodosq; omnes emolliunt. Cruda formicas, ver-
 rucas, & thymos, nitro, farinaq; additis, tol-
 lunt. Folia eadem possunt. Illita cum sale. & a-
 ceto vlcera in capite manantia, epinyctidas, &

furfa-

furfures sanant : ijs ficosæ extuberationes , & palpebrarum scabritie perfricantur. Nigræ fici folijs, cauliculisq; , candidæ vitiliginis perunguntur : faciunt ad canum morsus, & vlcera , quæ ceria, id est, fauos, vocant. Grossi cum sylvestris papaueris folijs ossa extrahunt: furunculos cum cera discutiunt: contra muris aranei morsus, & scolopendræ venena, cum eruo, & vino illita, auxiliantur. Fit ex cinere ficus tam sylvestris, quàm satiusæ lixiuium, crematis ramorum cauliculis, quod subinde macerari opus est, & inueterasce re: siquidem inter caustica intelligitur. Gangrenis prædest: namque expurgat, & consumit, quæ excrescunt, eoq; sic vtendum est: spongia assidue hoc lixiuium imbuta superponitur. Interdum dysentericis, & influxiones vetustas, & sinus cuniculatim exedentes, magnosq; , instillari conueniet. Et enim purgat, conglutinat, carne replet, & oras committit, non secus atque emplastrum, quæ cruentis vulneribus iniiciuntur, enema vocant. Bibitur ad discutiendum sanguinem concretum, & contra præcipitationes, rupta, cõuulsa, cum cyatho aquæ recentis colatum, addito oleo exiguo: celiacis, dysentericis, per se cyathus datus prodest: nervorum vitijs: conuulsionibus, commodè illinitur ex oleo, vt pote quod sudores moueat: aduersus gypsi potum, & phalangiorum morsus bibitur. Hæc eadem præstant reliqua lixiuia, præsertim querni: omnia tamē

adstringunt.

Persea. CAP. CXLVI.

Persea arbor est in Aegypto, fructum ferens cibo idoneum, stomacho utilem. in quo plangia cranocolapta nomine inueniuntur, praesertim in Thebaide. Arida folia in farinam redacta, illitu sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in Perside exitiosam esse, translatamq; in Aegyptum, mutata natura in cibos receptam.

Iberis. CAP. CXLVII.

† Iberis, siue cardamantica, folia habet nasturtij: vere virentiora: caulem cubitalem, aut minorem. in incultis nascitur. Aestate lacteum florem promit, quo tempore efficacior est. Radices duas nasturtio similes habet, calfacientes, & adurentes. Ipsae enim ischiadicis cum salsa axungia emplastri modo utiles, quaternis horis alligatae, ut dein in balneas descendantur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

LIBRI PRIMI
FINIS.



PEDACII

DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE
Medica materia.

LIBER SECVNDVS.



N primo, charissime Aree, libro, quem de medicinali materia condidimus de aromatibus, oleis, vnguentis, arboribus, nascētibz ex eis succis, lacrymis, seminibusq; disseruimus. In hoc autem secundo de animantibus, melle, lacte, adipe, frugibus, atque oleribus explicabimus. subnexis herbaceis, quæ acri pradita sunt facultate, vt pote quæ cum ipsis cognatione iuncta sint: qualia allium, cepa, sinapi intelliguntur. Idq; ideo, ne cognatorum vires disiunxisse videamur,

Echinus marinus.

CAP. I.

Marinus Echinus stomacho, ventriq; utilis est, vrinam cit. Huius testa cruda inassata commodè medicamentis admiscetur, quæ psoras abstergunt, Cremata verò cinis sordida vice-

ra expurgat, luxuriantem carnem reprimi.

Echinus terrestris. CAP. II.

Terrestris erinacei corium cōbustum alopecij cum pice liquida aptissimè illinitur. Assecatum corpus, & cū aceto mulso potum renum vitij auxilio est: item aqua cutem subij, conuulsionibus, elephantia, & malè habitis, quos cachectos vocāt: viscerum fluxiones exiccāt. Eiusdem iecur fictili solibus excocto arefactum, ad eosdem vsus utilissimè reconditur.

Hippocampus. CAP. III.

Hippocampus marinum animal est exiguum. Cuius cremati cinis exceptus cum liquida pice, aut axungia, seu amaracino vngueto illitus, alopecias replet.

Purpura, buccina, cionia.

CAP. II II I.

Purpura vsta exiccāt, dentes abstergit, excrecentias in carne cohibet, vlcera purgat, & ad cicatricē perducit. Eadem praestāt concretata Buccina, sed vehementius vrunt. Si qui salis plena fictili crude adurat, dentifricio conueniūt: ambustus utiliter illinūtur, quibus solui medicamentum non oportet: nam posteaquā vulnus cicatricē duxerit, ipsum in testa modū induratum, sponte sua decidet. Fit etiam calx e buccinis, vt in eius mentione demonstrabimus. Cionia vocantur purpurarum, buccinarumq; medie partes, circa quas testa volumen clauicu

latum

latim intorquetur. Cremata simili modo, maiorem purpuris, buccinisq; facultatem vrēdi consequuntur, quoniam apprimendi naturam obtinent. Buccinorū carnes ori gratæ sunt, & stomacho vtilēs, sed aluum molliunt.

Mituli. CAP. V.

Mituli laudatissimi in Ponto. Cremati eundem buccinis effectum præbent. priuatim plumbi nore eloti, oculorum medicamentis cum melle vtiles habentur: palpebrarum crassitudines absunāt, albugines purgāt, & cætera, quæ oculis caliginem offundunt. Carnes eorum ad canis morsus vtiliter imponuntur.

Tellinæ. CAP. VI.

Recentes Tellinæ aluo vtilēs, sed maxime ius eorum. Salitæ vruntur, tritaq; in cinerem, & cum edria instillata, auulsos palpebrarum pilo renasci non patiuntur.

Chamæ. CAP. VII.

Chamæ, aliarumq; conchularū in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet. id cum vino assumitur.

Vnguis ophratus. CAP. VIII.

Vnguis, siue oyx conchylj tegumentum est, ei simile, quæ purpura integitur: quod in India nardiferis paludibus inuenitur, suauem ideo spirans odorem, quod conchylia inibi nardi pabulo nascantur. Colligitur posteaquā stagnantes aquæ aestiuis squaloribus inaruerunt. Lau-

h 4

datissi

datissimus qui à rubro mari desertur, candidus, pinguis. Babylonicus nigrescit, atque minor conspicitur. Ambo odoris gratia suffiuntur, sed aliquatenus castorem olent. Iidem suffitu esutias feminas vulvae strangulatu oppressas, conitialesq; poti ventrem molliunt. Crematum conchylium eadem efficit, quæ purpura, & bucinum.

Cochleæ. CAP. IX

Terrestris cochleæ stomacho vtiæ sunt, & non facile corrumpuntur. Optima Sardonica: Africana, Astypaleica, & quæ in Sicilia, ac Chio gignuntur, & quæ in Ligiæ alpi- bus, pomatia, id est, operculares, cognominata. Marina stomacho idonea. & facile illo excernitur. fluuiatilis virus olet. Quæ verò repribus, frutetisq; glutinata cohaeret, quam vocant nonnulli sesilon, ventrè, & stomachum turbat, vomitiones excitat. Cremata omnium teste ex- calfaciendi, & vrendi naturam scitiuntur: pur- gant lepras, vitilignes, dētesq; exundāt oculo- rū cicatrices, & vitia cutis in scie, albugines, ac visus hebetudines, si cum care sua vstæ: tri- teq; ex melle illinantur. Cruda um tegumentis imposita, aquæ inter cutem tumres exugūt: sed non antè soluentur, quàm omis hauriatur hu- mor. podagricas inflammationes leniūt: impaclos corpori aculeos illita euocant: nenses trita, & admota ciunt. Carnes carū cum thure, & myr- rha illita, cum vulnera alia: um maximè que

nerui

nerui acceperunt, conglutinant: trita in aceto: sanguinē naribus erumpentem infrenāt. Vinea corpus, & praesertim Africana, cum aceto deuoratum, stomachi dolores mitigat. trita cū testa, vino, & myrrha, si exiguum inde bibatur, colicę, vesicęq; cruciatus sanat. Terrestris pilos incommodos replicat, si quis abrafo acu lentore eius, pilum attingat.

Cancrī.

CAP. X.

Cancrorum fluuiatilium exustorum cinis, qui duo cochlearia expleat, adiecto dimidio radicis gentianę modo, triduo potus cū vino, magnopere prodest canis rabiosi morsibus: rimas pedū sedisq; perniunculos, & carcinoma, cum decocto melle lenit. Triti crudi, potiūq; ex asinino lacte, auxiliantur contra serpentinū phalangiorumq; morsus, atque scorpionum ictus. Decocti autem, & cum iure esitati, ijs prosunt, qui tabe conficiuntur, aut leporem marinū hauerunt. Nec aut scorpiones triti, & cum ocimo admoti. Possunt eadem marini, verū inefficacius omnia praestant.

Scorpio terrestris. CAP. XI.

Terrestris Scorpio tritus crudus, & impositus, suę plagę remediū est. Quin estur assatus, ad eadem.

Scorpio marinus. CAP. XII.

Marini Scorpionis fel conuenit ad suffusiones oculorum, albugines, & hebetudines.

h 5

Drac

Draco marinus. CAP. XIII.

DRaco marinus dissectus, & apertus, impositusq; ictus spine sue, qua ferit, medela est.

Scolopendra. CAP. XIII.

Scolopendra marina in oleo decocta si illinatur: auellit capillos: sed contactu pruritu facit.

Torpedo. CAP. XVI.

Marina Torpedo diuturnis capitis doloribus admota, cruciatus vehementiam mulcet, eadem apposita eversam sedem, perciduamq; coercet.

Vipera. CAP. XIV.

Viperinae carnes si coctae edantur, claritati oculis afferunt: neruorum vitij auxiliantur: increscentes strumas reprimunt. Detracta autem cute, caput caudaq; quoniam carne vacat, amputari debet. quippe commentitium est quod precipitur, certam utrinque mensuram praecidi oportere. Reliquum vero corpus exceptis interaneis elotum, dissectumq; discoquitur cum oleo, vino, salis exiguo, & anetho. Aiunt ijs, qui viperas esit, pediculos procreari: quod plane a veritate abhorret. Adijciunt aliqui longam senectutem agere, qui eo cibo vescuntur. Sal ex eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. Vinea autem vipera in fictile nouum demittitur: adijciuntur salis, caricarumq; tritarum, singulatim quinque sextarii, mellis cyathi sex, mox fictilis operculum luto oblinitur, et fornacibus inassatur, donec

nec sal in carbones redigatur, qui postea tritus in pulueris faciem, reconditur. Plerunque, vt ori gratior fiat, immiscetur spica, aut folium nardi, aut malabathri momentum.

Senecta anguium. CAP. XVII.

Senecta anguium in vino decocta dolori aurium, infusu: & dentiũ, collutione auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed precipue viperinam.

Lepus mar. & ter. CAP. XVIII.

Lepus marinus loligini parua similis est: qui per sese tritus, aut cum vrtica marina illitus capillos euellit. Terrestris leporis inasbatũ cerebrũ mādatur, iuuādis tremoribus, qui ualitudine cōtracti sunt: affrictu, aut cibo facile infantibus dēitionē pręstat: ex ustũ caput, & cũ adipe vrsino, aut aceto illitũ, alopeciarũ inanitatibus medetur. Leporinũ coagulũ post tridũ à concubitu potũ, conceptum adimere, partusq; spem intercipere proditur: vulua, & alui fluorem sistit: comitiales iuuat: cōtra venena ex aceto bibitur, pręsertim aduersus cōcretũ lac, & viperarũ morsus. Sanguis eius si calidus illinatur, vitia cutis in facie, vitiliginē, lētiginesq; sanat.

Pastinaca marina.

CAP. XIX.

Marina Pastinaca radius, qui eius cauda enatus aduersis squamis reflectitur, dentium dolorē mitigat; nā eos frangit, & euocat.

S epia

Sepia.

CAP. XX.

Sepia cocta dum estur atramentum, agri
 concoquitur: alui mollit. Collyrijs è testa fa-
 ctis conuenienter genarum scabritie perfican-
 tur. Vstum in sua testa, donec id, quod crusto-
 sum est, abscedat, postea tritum, expurgat viti-
 liginis, fursures, dentes, & vitia cutis in facie.
 elotum in medicamenta oculorū addi solet: con-
 tra albugines, oculis iumentorum efficaciter in-
 spiratur: pterygia oculorum absorbit, cum sale
 tritum, & iniectum.

Mullus piscis.

CAP. XXI.

Mullorum assiduo cibo, aciem oculorū he-
 betari constat. Is marini draconis, ara-
 nei, ac scorpionis moribus medetur: si crudus,
 atque dissectus admoneatur.

Hippopotamus.

CAP. XXII.

Hippopotami testes exiccati, ac triti, con-
 tra serpentium morsus bibuntur.

Fiber.

CAP. XXIII.

Fiber ancipitis vitæ animal, plerunque cū pi-
 scibus, & cancris ex aqua victum capeſcit.
 Huius testes serpentium venenis aduersantur,
 sternutamenta mouet, & in vniuersum varios
 obtinet vsus. Siquidem menses, ac partus ciunt,
 duabus drachmis cum pulegio poti: partus, ſcā-
 dasq; eijciunt: cōtra inflationes, tormina, singu-
 tus, venena, ixiāq; ex aceto bibuntur: lethar-
 gicos, & vtcunque veterno obdormiscentes ex-

titant infusi: cum aceto autem, & rosaceo olfactu, & odoris suffitu idem faciunt: poti & illiti profunt tremulis, conuulsis, & omnibus nervorum vitijs. In summa calfactoriam vim habent. Eligi debent testes, qui ex vno ortu connexi sunt (fieri enim non potest, ut gemini folliculi in vna membrana coniuncti reperiantur) liquore intus veluti ceroso, odore graui, & virus redolente, gustu acri, mordente. ac friabili, naturalibus tunicis circumdato. Quem fraude aliqui corrumpunt, coniungentes in sollem gumi, aut ammoniacum cum sanguine, & castorio subactum, & ita exiccantes. Vanum est, quod traditur, testes ab ipsis euelli, & à sese abigi, cum venatu vrgentur: siquidē tāgi nequeunt, ita, ut in sue, substricti. Opera autē pretiū est, diuisa pelle melleum liquorem cum euestiente tunica assumere, & siccatum potui dare.

Mustela vulgaris. CAP. XXIIII.

Mustela, quæ in domibus nostris oberrat, ambusta exenteratur, & inueterata sale, in umbra siccatur. Ea binis drachmis cum vino pota, aduersus omnia serpentium venena præsentaneo est remedio: toxico, simili sumpta modo, resistit. Eius ventriculus coriandro farctus, inuenteratusque, percussus à serpente, & comitialibus potu auxiliatur. Cremata in fictili podagricis confert, cinere ex aceto illito. Sanguine perunctæ struma inuantur: comitialibus etiam prodest.

Rana

Ranæ.

CAP. XXV.

Contra omnium serpētū venena pro antido-
to sunt Ranæ, si ex sale & oleo decocta elat-
tur, iusq; earum itidem sorbeatur: contra in-
teratos tendinum rigores pollent. Illitus earum
cinis, profluenta sanguinis impetus sistit: expul-
dis alopeciarū inanitatibus ex liquida pice reser-
nitur. Viridium ranarum cruor auulso gen-
tilos renasci prohibet, in vestigia euulso-
rum stillatus. decocta in aceto, & aqua, dentium
lores collutione leniunt.

Silurus.

CAP. XXVI.

Silurus recens in cibo nutrit, & facilem pre-
bet alium: sale verò conditus, minimum sup-
peditat alimentum. arteriam expurgat, & re-
cem expedit. Illita saliti caro, aculeos, & infusa
corpori spicula extrahit. Muria eius incipienti-
bus dysenterijs prodest, si in desidentium solu-
adijciatur: fluxiones siquidem ad summa co-
elicit, ischiadicis infusa medetur.

Smarides.

CAP. XXVII.

Smaridis piscis saluti caput exustum, ex-
scentes ulcerum oras, puluillosq; reprimunt:
mas cohibet: thymos, clauosq; absumit. Caro
secus atque salsamentum prodest à scorpi-
percuſsis, aut à cane demorsis.

Mænæ.

CAP. XXVIII.

Mænarum ex capitibus cinis, si illinatur
callosas sedis rimas abolet. Eius etiā

rum oris putrilagines collutione sedat.

Gobius. CAP. XXIX.

Gobius recens in suillum ventrem coniectus, si consuta rima in duodecim aquæ sextarijs, donec duo supersint, decoquatur, excolatus & sub diuo refrigeratus potui detur, alius sine molestia deijcitur. Illitus contra serpentium, canumq; morsus auxilio est.

Thunnus. CAP. XXX.

Conditanei thunni caro, quæ omotarichon vocant, sumpta ijs auxiliatur, quos vipera nomine prester momorderit: sed oportet vinum quàm plurimum subinde cogantur haurire, ita vt vomitione reddatur. Contra acrimonias estiatorum maximè valet: canum moribus utilissimè illinitur.

Garum. CAP. XXXI.

Garum omne, quod ex piscibus, carnibusq; sale maceratis liquamen est, si ex eo fotus fiat, depascentia vlcera sistit. Morsis à cane medetur. dysentericis, atque ischiadicis infunditur: nonnullis, vt exulcerata adurat: alijs autem ad laceffenda, quæ vlcera non senserunt.

Ius piscium. CAP. XXXII.

Recentium piscium ius, modo per se, modò ex vino potum, alium subducit. Priuatim ad hunc usum conficitur è phycidibus, & scorpiõibus, & iulide, è percis, & recetibus alijs saxatilibus, nec virus resipientibus, simpliciter

cum

cum aqua, oleo, & anetho.

Cimices Lectularij.

CAP. XXXIII

Cimices, qui in cubilibus enascuntur, canisabrum inclusi, si ante februm significationes septem deuorentur, quartanis auxili sunt: & citra fabras sumpti, percussis ab assidue profunt: vuluarum examinationes olfactu reuocant. Poticum vino aut aceto, adherentes sanguisugas abigunt: triti, & vrinaria fistula impositi, vrinae angustias leuant.

Millepedæ. CAP. XXXIII.

Millepedæ, quæ sub aquario vase stabulantur, animalia sunt multis pedibus nitentia, quæ contacta manu contrahuntur in orbem. Hæ ex vino potæ difficili vrinae, & regio morbo auxiliantur. Millepedæ cum melle anginis vtiliter illinuntur, trita, & in cortice mali punice calfacta, doloribus aurium, addito rosaceo, conuenienter instillantur.

Blatta.

CAP. XXV.

Blatta eius, quæ in pistrinis inuenitur, interanea trita, aut cum oleo decocta, aurium dolores instillatu mitigant.

Pulmo marinus. CAP. XXXVI.

Podagas, pernionesq; emendat pulmo marinus recens, tritus, & illitus.

Pulmones. CAP. XXXVII.

Svillus, et agninus, vrsinusq; pulmo impos-

tu, attritus à calceamentis contractos, ab inflammatione tuetur. Vlpinus verò si arefactus bibatur, suspiriosos adiuvat. Adeps quoque liquefactas, infusus q; aurium dolores finit.

Iocinera.

CAP. XXXVIII.

A Sini iecur inassatum esu comitialibus prodest: veruntamen ieiunis edendū præcipitur. Capræ verò inassati decidua sanie, inungi lusciosos prodest: & dum coquitur, apertos oculos halitu eius vaporari. prodest in cibo tostum ad eadem. Tradunt hircini iocineris cibo comitiales deprehendi. A primum recens si arefactū teneratur, ex vino potum, contra serpentium, †volucrumq; morsus auxilio est. Iecur canis, qui rabie exagitat, tostū, & in cibo ab emorsis sumptum, ne tētentur metu aquæ tueri creditur. Vtuntur autem ad arcendos aquæ pavores dente eo, qui caninus dicitur. hūc à cane, qui momordit, exemptum, & folliculo inditum, pro amuleto brachio adnectūt. Inueteratum autem sale margi iecur, ex hydromelite binis ligulis potum, secundas pellit.

† Sunt qui hoc loco non πηνῶν, quod est volucrum, legant: sed κτηνῶν, id est, quadrupedum, priore tantum mutata litera. Certè facilis hic fuit librariorum lapsus: tamen quæ sit vera Dioscoridis scriptura, non faciliè intelligi potest, cum Plinio, aues etiam dentatæ prodantur.

8:

geni-

Genitale cerui. CAP. XXXIX.

Genitale cerui tritum, & in vino potum, viperæ demorsis auxiliatur.

Vngulæ asini, & capræ. CAP. XL.

Vngularum asini cinis per dies multos binis cochlearibus potus, proditur comitiales adiuuare. eadem oleo subacta strumas discutit: & illita perionibus medetur. Caprinæ cinere peruncta ex aceto alopecie sanantur.

Lichenes equorum. CAP. XLI.

Lichenes sunt in equorum genibus, & super vngulas indurati calli, qui triti, & in aceto poti, comitialibus mederi traduntur.

Coria veteramentaria. CAP. XLII.

Veteris corij cremati illitus cinis ambusta igni, intertrigines, necnon calceamentorum attritus sanat.

Gallinæ, & galli. CAP. XLIII.

Dissecta gallinæ, & adhuc calentes apposita, serpentium morsibus auxiliantur: sed identidem alias sufficere oportet. Earum cerebellum in vino bibendum datur contra serpentium morsus: sanguinem à cerebri membrana profluentem sistit. Quæ interiorē ventriculi galli sinu residet membrana, secti in laminas cornus specie similis (ea verò inter coquendum abiici solet) siccatur, tritaq; in vino conuenientissime stomachicis datur in potu. † Ius è vetere gallinæ aluum deijcit. Abiectis itaque interaneis

saltem

salem coniungi oportet, & consuto ventre decoqui in viginti sextarijs aqua, donec ad tres heminas redigantur: totum id refrigeratum sub diuo, datur. Aliqui incoquunt olus marinum, mercurialem, cucum, aut siliculam. Crudos humores, crassosq; , attram bilem, & strigmenta elicit: prodest longis febribus, suspirijs, articularijs morbis, & inflationibus stomachi.

† Codices Græci typis expressi hoc in loco habent. ὁ δὲ ξωμὸς το νόσασκε & μάστιγα δίδωται ἐπιπράσεως χάριν φανλοκίτων, ἡγεῖ ἐπὶ τῶν σώματι πυρρῶν λιτῶν σπενδαδῆς. hoc est ad sensum. Ius galli iunioris maximè datur ad temperandos humores vitiosos: & in ardoribus stomachi simpliciter paratum. Verba illa Ruellius, cuius interpretationem alioquin sequimur, vel neglexit, vel illegitima iudicauit. Nos verò huc ea afferenda duximus, non solum quòd in vulgatis codicibus, ac antiquissimò (teste Marcello) legantur: sed quia etiam à Serapione referuntur. Quibus etiā subscribere videtur verborum series, & communis rei vsus.

Ouum.

CAP. XLIII.

OVum molliculum plus alit sorbili, & durū plus molli, Luteū ouis cōtra oculorū dolores

lores vtile est: inassatum sedis inflammationibus prodest, cum croco, & rosaceo: & condylomato cum meliloto: cū vna autem fruticis eius, quæ rhoa dicunt, aut galla in patinis frigitur, vitæbo aluos sistat: per se etiam offerri solet. Candidum oui crudum refrigerat: spiramenta cutis cludit: inflammationes oculorum infusum leuiter ambusta, si statim eo perungantur, pustulas non sentiunt: faciem à solis adustione tuetur: frons impositum cum thure fluxiones arcet, avertit: inflammationes oculorum lana exceptum, addito rosaceo, melle, & vino mitigat: vtiliter contra hamorrhoidis serpentis morsus crudus sorbetur: summè tepidum prodest vesicae rosaceis, reum exulcerationibus, gutturis scabritiæ, reiectionibus sanguinis, destillationibus, & thoracis rheumatismus.

Cicadæ. CAP. XLV.

Cicadæ, quæ inassata manduntur, vesicæ doloribus prossunt.

Locustæ. CAP. XLVI.

Locustæ odoris suffitu vrinæ difficultatem adiuvant, præsertim quæ feminas male habent. earum carnes nullo sunt in usu. Est & quædam genus locustæ, quæ asiracos, aut onos dicitur, sine pennis, præ longis cruribus. Exiccata ætem si ex vino bibatur, contra scorpionis morsus magnoperè proderit. Hac abundè resciunt Aphri, qui Leptim incolunt.

Osifra

Ossifragus CAP. XLVII.

Venter eius avis, quam Latini ossifragum appellant, particulatim potus, calculos cum lotio pellere prodiit.

Galerita. CAP. XLVIII.

Galerita auicula est parua, apicem in vertice, pannonis modo, gestans. Hac assa, & in cibo sumpta, coeliacos adiuuat.

Hirundo. CAP. XLIX.

Dissecis crescente luna pullis hirundinis, qui primo partu exclusi sunt, in ventre eorum lapillos offendentes: è quibus duos, vnicoloro variū, alterum purū & ximes: ij priusquā terrā attigerint, in iuuenta corio, aut ceruina pelle brachio: aut collo adalligati, comitialibus prodeunt, & saepe prorsus eos recreabunt. Hirundines, uti ficedulae, in cibo, aciei visus medicamentum praebeant. Tā pullorum, quā matrum in filiali olla crematarum cinis cū melle oblitus, oculis charitatē adfert: angina eo commodē perunguntur: vna & tonsillarum inflammationibus hoc cinere succurritur. Et ipsae, & pulli exiccati, si drachmā pondere ex aqua bibantur, hos iuuant, qui angina morbo conflantur.

Ebur. CAP. I.

Eboris scobe illito, paronychia sanatur. Vim adstringendi ebur obtinet.

Suillus talus. CAP. II.

Vis talus comburitur, dum è nigro albescat:

qui tritus, & potus inflationibus coli, longioribus torminibus medetur.

Ceruinum cornu. CAP. LII.

Ceruini cornu cinis elotus, binis ligulis epotus, prodest dysentericis, excreantibus sanguinem, celiacis, regio morbo, & vesicae doloribus. cum tragacantha: foeminis fluxione vulvae laborantibus, cum liquore huic rei accommodato. Cerui cornu contusum, crudo fistili, luto circumlito, & in furnum indito, vritur donec albescat. Id cadmia modo elotum, vlcerebus oculorum, & desuctionibus salutare est: infusum dentes expurgat. Crudi cornu suffiti nidore serpentes fugantur: serues factum in aceto, si eo gingivae colluantur, maxillarum a dentitione dolorem adimit.

Erucae. CAP. LIII.

Erucae, quae in oleribus gignuntur: cum oleo peruncti, a venenatis bestiis feriri negantur.

Cantharides. CAP. LIIII.

Efrumentis congesta Cantharides ad reconducendum idoneae sunt, quae fistili vase non picato conduntur, & raro modoque linteo obligato ore & deorsum conuerso suspenduntur super accensum feruentis quae accerrimi halitus, donec astu exanimantur: postea lino transfixae reponuntur. Potentissimae omnes variae, luteis, quas in penis truerfas habent, promissoque corpore, crassa, ac blanda

tatum

tarum modo perpingues: sed inertes, ac imbecillæ, quæ vnius sunt coloris.

Buprestes, & Pignorū erucæ. CAP. LV.

Simili modo reconditur buprestes, genera quadam cātharidū, & pignorū erucæ: quæ supra cribrū suspensum feruēt: cinere paulisper intosta, reponūtur. Vis omnium communis erodere, vlcerare, calorē elicere: qua de causa admiscuntur medicamentis, quæ lepras, ferosq; lichenas, & carcinomata sanāt. mēses ciūt pessis emolientibus addi. Aliqui cātharidas antidotis impositas, aqua subter cutē auxiliari prodiderunt: argumento, quod vrinā moueāt. Alij pennas, pedesq; contra potarum veneficia, remedio esse tradiderūt.

Salamandra. CAP. LVI.

Salamandra lacerta genus est, iners varium, quod frustra creditum est, ignibus non vri. Vim habet erodentem, calfatoriam, exulcerantem. Additur, vt cantharis, in medicamenta, quorū vis est exesse, & lepras abolere: similiq; modo reconditur. Liquefacta in oleo pilos euellit. Exenterata, detractis pedibus, & capite, in melle seruatur ad eundem vsum.

Araneus. CAP. LVII.

Araneus, quæ holcum, alij lycon, id est lupum vocāt, subactus cū splenio, & linteo illitus, prolitusq; vtrisque tēporibus, aut fronti, tertianos circuitus persanat. Tela eius im-

sita sanguinem sistit: vulnera, quæ summam cutem occuparunt, ab inflammationis iniuria videntur. Est & alterum aranei genus, qui candidam, tenuem, densamque telam orditur. quæ in aranea ligatum, & lacerto appensum, quartanarum cunctibus mederi narrant. Decoctus ex rosaceo, & infusus, aurium doloribus auxiliatur.

Lacerta. CAP. LVIII.

Lacerta caput intritum, & appositum, aculeos, & omnia corpori infixæ extrahit: verrucosos, formicantes verrucas, & pensiles quas acrochordonas vocant, tollit. Iecur exesit dentibus coniectum dolores finit, Si diuulsa admoueat, ictis à scorpione leuamentum præstat.

Seps. CAP. LIX.

Seps, quam aliqui lacertam chalcidicam vocant, in vino pota, morsus suos sanat.

Scincus. CAP. LX.

Scincus aut Aegypti, aut India, aut rubri maris alumnus, quamuis inueniatur in Libia Mauritania. Est autem terrestris crocodilus, sui generis, sale inueteratus cum nasturtio. Aiuunt carnes, quæ renes amplectantur. id sibi virum vendicasse, aut si drachma potere bibantur, venere accendant. Verum decocto lentis cum melle, aut semine lactuca cum aqua pota, veneris cupiditates inhibentur. additur in antidota.

Terreni vermes. CAP. LXI.

Terreni vermes impositi, præcisos nervos glutit

glutinant: tertianas discutiunt. Decocti cum ancerino adipe, infusi, affectis auribus medetur: cum oleo autē decocti, si in contrariam aurē instillentur, dentium doloribus prestant auxiliū. triti in potu ex passo urinam ciunt.

Mus araneus. CAP. LXII.

Mvs araneus dissectus, & impositus, sui mor-
sus veneficia luit.

Mures. CAP. LXIII.

Mvres, qui in domibus oberrant, concisos scorpionum plagis vtilissimē imponi, in cō-
fesso est. Si inassitos infantes ederint, oris sali-
uam exicari promittunt.

Lac. CAP. LXIIII.

Lac generatim omne boni succi est, corpus
alit, aluum emolit: stomachum, & intesti-
na † inflatione vexat. Venum tamē dilutius
astino habetur, & è viridi pabulo aluum magis
emollit. Probatum autem candidū, equali crassi-
tudine, quod vngui instillatū cogitur. Aluū mi-
nus tentat caprinū: quoniā pecus hoc adstringē-
tibus pabulis, robore, lentisco, & oleaginis fron-
dibus, & terebintho magna ex parte vescitur:
inde stomacho accommodatissimum reddi solet.
Ouillū autem dulce, crassum, & præpingue: nō
autem vsque adeo vtile stomacho. Bubulum ta-
men, asininū, & equinum, vētri magis idonea:
sed ipsum turbāt. Quibus in locis pecora, scam-
moniam, veratrum, clematidum, aut mercuria-

lem pascuntur, lac omne ventrem, & stomachum subuertit: quale in Iustinis motibus esse, à nobis proditum est. Siquidem capra, quibus candidum veratrum pabulo fuerit, primo foliorum partem euomunt: & eorum lac haustum nauseam creat, & stomachum in vomitiones effundit. Venter adstringit lac omne decoctum, praecipueque candentibus calculis marinis exustum. Et in summa, omnibus auxiliatur in ternis exulcerationibus, praesertim faucium, pulmonum, interaneorum, vesicae, & renum: foris verò contra pruritum cutis, eruptiones papularum, & vitiatos corporis sudores, rectes cum melle crudo, addito sale, datur exigua aqua dilutum. Minus inflat quodcumque semel feruesfactum. Decoctum cum calculis marinis ad dimidias, vlcerosas ventris fluxiones adiuvat. Lac quodcumque serum continet implicitum, quod ubi discessit à lacte, multò potèntius ad purgationes redditur. Datur quibus sine acrimonia volumus deiectionem moliri, vt melancholicis, comitialibus, lepris, elephantiis, & eruptionibus toto corpore papulis. Ex omni lacte fit, quod scissum, id est scissile, appellatur, Lac autem fictili non seruet, ramoque ficulneo recenti mouetur, in sparsis, postquam bis, aut ter efferbuerit, totidem acc. nulsis cyathis, quot sunt hemina lactis: ita enim ferescens liquidum ab eo diuiditur, quod in caseum concreuit. Sed cum seruet, ne supersundatur, conueniet spongia ex frigida continuo fictili la-

brum detergere, sextariumq; argenteum frigida aqua plenum demittere. Bibitur heminiis per intervalla singulis, vsque ad quinas, ita vt intercedentibus spacijs, potantes ambulent. Lac autem recens efficax est contra rosiones, & stionesq; ab exitiis medicamentis factas: vt à cantharidibus, aut salamandra, bupreste, aut pignorum eruca, hyoscyamo, dorycnio, aconito, aut ephamero: praesertim bubulum ad id eximie confert. gargarizatur autē exulceratis faucibus, tonsillisq;. Asinū peculiariter collutos dentes, gingivasq; stabilis. Fluxiones alui, si vlcera sentiātur, tenefmosq;, ouilum, bubulū, aut caprinum, cum marinis lapillis decoctum sistit, per se autē, et cum hordeacea ptisana, aut haliceo cremore infusum magnoperē intestinorū rosiones mitigat: exulcerata vulua immittitur. Humanum lac dulcissimum est, & maximē alit: mammis autem exulcū, prodest tibi, & stomachi rosionibus: contra haustum leporem marinum praesidio est: oculis cruore ex ictu suffusis, cum thuris polline instillatu: podagricis vile est, cum meconio, & cerato illitum. Lac omne respuendum splenicis, hepaticis, comitialibus, vertiginosis, & nervorum vitio laborantibus, febriculosis, & capite dolentibus: nisi si quis interdū purgationis gratia, vt ostendimus, schistum prabeat. Primiparae canis lacte perunctos narrant glabrescere: potum contra venena anti-

doti

doti vicem obtinet: abortus mortuos expellit.

Caseus.

CAP. LXV.

CAseus recens sine sale sumptus alit, stomacho utilis est, & facile in membra delegatur: carnem facit, aluum modicè emollit: alui tamen alio praestantior, pro natura lactis, à quo cōficitur. Decoctus autē, et experssus: deinde inasatus, aluū sistit. illius oculorum inflammacionibus, & sugillatis prodest. Qui verò recens salitus est, minus alimenti prabet. carnem aptè minuit, stomacho aduersatur, negotium ventris interaneisq; exhibet. Vetustiore sistitur alui, Sero, quod à caseo manauit, quàm optimè canes aluntur. Quod hippatē vocant, caseus est equinus: ea virus redolet, magnoperè alit, bubuloq; proportionē respondet. Nec desunt, qui hippatē equinum coagulum appellant.

Butyrum & eius fulligo.

CAP. LXVI.

ELacte pinguiſſimo probatum sit butyrū, quale ouillum est. Fit & ex caprino, agitato in vasis lacte, donec pingue separetur. Butyrū natura oleosum est, & emolliens: vnde largius epotum, ventrem resoluit: prodest, vbi oleū nō adfuerit, contra venena Cum melle si infusetur, dentitiones adiuuat: gingiuarum pruritus, & oris vlcera infantibus emendat. Illitum foris capatoria alimentorum facit corpora, & ab albidis pustulis per summa scatentibus affe-

rit. Contra inflammationes, & duritias vuluæ, quod nec virus resipit, nec vetustatem sentit butyrum efficax est: dysentericis, & coli. exulcerationibus infunditur. In medicamenta addi solet, quæ pus mouent: vtile præsertim cū nervi, aut cerebri membrana, vesica ceruix, & vulnera acceperit. Id autē purgat, replet, carnē creat, ab aspidē percussis vtilissimē imponitur. Recens obsonijs additum olei vicem pensat, & adipis vice fungitur in bellarijs. Colligendæ ex eo sulliginis ratio hac est. Butyrum in lucernam nouam ingestum accenditur, fictiliq; operculato, quod superne in siphunculi speciem desinat, & in sima parte cuniculos clibani modo habeat, crematur & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur. fuliginis modus, quem facere institueris: penna post deraditur ad vsus. Eius effectus est in medicamentis oculorum, exiccare, & adstringere: fluxiones cohibet, & vlcera celeriter ad cicatricem perducit.

† Illud hoc loco non prætereundum duxi, quod in Græco codice manu scripto non *φυσικὸν*, hoc est, inflationē pariēs, sed *φυσικόν*, id est, naturale legatur. quod lac potius stomachum iuuat, quàm inflatione vexet: id enim innuit verbum naturale. Hanc lectionem, secutus fuisse videtur Serapio: quippe qui ex Dioscoride ita trāscribat. Et lac confert stomacho. Quin.

& facilis potuit esse librariorū lapsus ob
vorum similitudinem.

Lanæ. & œsypus. CAP. LXVII.

Succide lanæ molles è collo, feminibusq; lau-
datissime habentur. Subveniunt intorini-
tia vulneribus, percussis, desquamatis, lividis,
ossibus fractis, aceto, oleo, aut vino imbuta: si-
quidem facile succos combibunt, quibus immer-
guntur. & ob pecudum sordem (sic enim œsypum
vocant) emolliunt. capitis, stomachi, aliarumq;
partium doloribus, cum aceto, & rosaceo effi-
citer imponuntur. Crematarum lanarum cinis
crustas obducit, excrecentias in carne cohibet,
& ulcera ad cicatricem perducit. Munda autē
& carptæ, in fictili crudo, caterorum more, vr-
runtur. Nec secus fimbriati marinarum purpu-
rarum flocculi cremari solent. Aliqui cum sordi-
bus lanas carpunt, & melle irrigant, eodemq;
modo vrunt. Alij in fictili oris patuli, vernicula
inter se distantia componunt, & conceptas
carminatasq; lanas, oleo ita suffusas, vt me stil-
lare quidem possint, assulis tede subiectis, &
eisdem, lanisq; permutatim interstratis, leniter
succendūt, & vstas tollunt. Quod si è teda pix,
pinguitudōe vlla profluxit, collecta recōditur.
Lauatur ad oculorum medicamenta. cinerem
in labellis, aqua addita, manibus confricant, &
considerare patiuntur: idq; sæpius, mutantes a-
quam, donec linguam adstringat, nec mordeat.

Œsyp

Oesypū vocant Græci, succidarū lanarū pingui-
 tudine: cuius parandi ratio hæc est. Succida mol-
 les, radícula non curata, calida aqua lauatur.
 & quibuscunque sordibus expressis, & in la-
 bellum oris ampli coniectis, aqua infunditur.
 magnòq; impetu ligula, vti respumet, agitur,
 aut lignea rude validiusculè conturbatur, quò
 largius sordida spuma colligi possit: deinde ma-
 rina respergitur: & confidente pingui, quod su-
 pernatat: collectoq; in altero fictili vase, de-
 nuo aqua in labellum fusa agitur: spuma ite-
 rum mari perfunditur, & demum eximitur.
 hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pingui-
 tudine, nihil prorsus spumæ extet. Collectū oesypū
 manibus emollitur, & si qua incedit spurcitia,
 confestim demitur: exclusaq; sensim omni aqua,
 recetiq; affusæ, manibus misceatur, donec admo-
 tum linguae oesypum adstringat leuiter, nec
 mordeat, atque pingue, candidumq; spectetur:
 tum in fictili vase conditur. verum omnia feru-
 do sole fiant, Nonnulli excolatū pingue frigida
 aqua eluunt, & manibus, non secus atque cera-
 tū mulieres confricant: ita enim candidius redditur.
 Alij elotū lanis, & sordibus quibuscūq; exēptis
 ac læto igni in aneo vase ex aqua decoctis, pingue
 qd̄ supernatat, collectum aqua, vt diximus, la-
 uat: colatūq; in fictilē patellā, quæ calidā aquā
 cōtineat, linteo opunt, atq; soli madet donec cadē-
 di fiat & satis grassū. At; bid iij. atio a iij. a
 effusis

effundunt, nouamq; adiūciunt. Melius est laue,
radicula non curatum, quod succidarum virus
oleat, & si manu in concha fruetur cum aqua
frigida, albescat, nihil in se duri, aut concreti ha-
bens: veluti quod cerato, aut adipe adultera-
tur, Oesypum excalfacit, explet vlcera, & emel-
lit, praesertim sedis, ac vuluæ, cum meliloto, &
butyro. In veliere appositum menses, & partum
euocat: vlcera non aurium modo sanat, sed et geni-
talium cum anserina adipe: contra erosos angu-
los oculorum, scabiososq; genas quæ occaluerunt
& ciliorum defluuia, efficax est. In testa non
torretur, donec redactum in cinerem pinguitudi-
nem amittat. Ex eo etiam fuligo colligitur, ut
demonstrauimus: quæ in oculorum medicamen-
ta commodè addi solet.

Coagulum. CAP. LXVIII.

Leporis coagulum tribus obolis ex vino, re-
nenatorum morsibus, cæliacis, dysentericis, et
fæminis fluxione vuluæ laborantibus, ac reiectio-
nibus à pectore, auxiliatur. sanguinem in grumescen-
tiâ discutit. Post menses purgationes appo-
situm vuluæ cum butyro, præstat mulieribus, ut con-
cipiant: potum verò partum enecat, & à puer-
perio, pariendi spem addimit. Equi coagulum,
quæ hippacen aliqui vocant, priuatim calidum
dysentericisq; conuenit. Hæc agni, hinnuli,
capræ latuicornis, & dorci, apri, cerni, vitu-
li, bubalique coagula, similes naturas for-

tiuntur: contrà aconiti potum in vino, & concretum lac in aceto conuenienter assumuntur. Hinnuli priuatim triduo à purgationibus admotum. partus spem intercipit. Vituli marini castorei vires repræsentat: comitialibus, strangulatis vuluis, potu conferre existimatur. Sed si sit vituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergitur, qua paulisper cùm alterius animantis, tum præcipuè agni coagulum, maduerit: nã si erit sycerum, statim liquefit in aquam: sin minus, consimile permanet. Excipitur autem catulis, qui nondum natare possunt. In summa, coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissoluit.

Adeps. CAP. LXIX.

Adeps anserinus, aut gallinaceus recens, & sine sale cõditus, ad vuluæ vitia proficit. Sale inueteratus, & qui temporis spatio acrimoniam concepit, vuluæ inimicus est. Recens exemptis membranis in fictilem oliam demissus, quæ altero tantoperè capacior sit, quantus sit modus adipis, quem curare institueris, obstrueto diligenter vase, flagrantissimo soli exponitur: eliquesens inde humor in fictile alterum excolatur, donec adeps omnis absumatur: mox loco vehementer frigido reconditur, & ad vsus digeritur. Alij fictile fulciunt super aquam calidam, aut tenuem & elanguidam prunam, quæ solis vicem penset. Est & alia curandi ratio. Exemptis membranis teritur, coniectusq; in ollam eli-

k qua

quatur, adiecto minuti salis momento: mox li-
 neo colo transfusus reponitur. Vtiliter in medi-
 camenta additur, quæ lassitudines, & fatiga-
 tiones leuant. Suillus adeps, & vrsinus hoc co-
 rantur modo. Recens, præpinguis, renibus potissi-
 mum detractus, in largiore aqua calescit, &
 quam frigidissima, exemptis tunicis, diligentissi-
 me manibus conficitur, & exprimendo ferme
 siccatur, subindeq; noua aqua abluitur: ceterum
 fictili capacitatis tunicis duplici inditus, in aqua
 demergitur, & subditis lenibus prunis spatula
 mouetur: eliquatusq; colo transfunditur in a-
 quam. Vbi verò refrixit, & guttatim aquam
 omnem exclusit, in pralotum fictile demittitur,
 & infusa aqua leniter eliquari debet, & manu
 deprimi, quò facilius faculentum virus pessum-
 eat: postea in pillam spongia madefactam tra-
 funditur. Vbi coire cepit, residens in imo sordes
 eximitur. Tertiò citra aquam eliquatur, repur-
 gatusq; fictili bene operculato, perquam frigi-
 lis locus reponitur. Hirinum seuum, ouillum, cer-
 uinumq; ita curato. Elotum ex his quodunque
 tunicis (vt in suilli mentione dictum est) exem-
 ptis, pila emoriendum tradito, ac manibus frica-
 to, affusa paulatim aqua, donec ne amplius qui-
 dem cruentum virus excernatur, aut pingue ali-
 quod innatet, sed nitida inspecletur. Deinde in
 ollam fictilem conijcito, et adiecta aqua, vt su-
 perueniat, leni pruna liquefacito, & moueto

arque in aquā colato: cumq; refrixerit, iterū in
loto fictili eliquato, & quæ antè diximus, faci-
to. Tertiò sine aqua liquefactum, in perfusam
liquore pillam colato, refrigeratumq; ut in suis
liratione diximus, recondito. Bubulum autem
seuum, renibus maximè detractum, exemptis
membris, aqua marina ex alto petita eluen-
dum est: mox in pillam tundendum diligenter, af-
fusa maris aqua. Cū verò dissolutum fuerit in
fictilem ollam coniciendum, & marina aqua,
quæ non minus dodrante superemineat, proluen-
dum decoquendum, donec omnis aboleatur odor,
additis ad singulas semi Atticas minas, quater-
nis Tyrrhenica cera drachmis: excolatumq; de-
tractis quæ pessum ierāt sordibus, in nouo fictili
reponendum, opertumq; soli interdum credendū
ut ad cādorem reducat, & odoris virus eva-
nescat. Præsertim taurorum pigue sic curari de-
bet. Renibus euulsus pingue profuente amissa-
qua abluto, detractisq; tunis, fictili nouo, post
quam exiguum salē inperferis, liquefacito: dein in
nitētē aquā excolato: et ubi cōcrescere cepit, ma-
nibus iterū cōfricādo vehemēter lauato, aqua
sapius insusa refusaq; donec quam optimè elotū
videatur. Rursus in olla cum pari modo vini o-
dorati decoquito, & cū iterum efferbuerit,
depto ab igni vase, ibidē finito pernoctare: postri-
die si grauius adhuc olet, noua olla repetitū, v-
no odorato pfundatur, eadē q̄ prius fiant dum.

omne virus euanescat. Colliquatur et sine sale, praesertim affectionum earum causa, quibus sal aduersari solet: sed ita paratum non magnopere albescit. Eodem modo pardorum, ac leonum pingua curari oportet. Taurinum autem, & vitulinum pingue, necnon ceruinum, atque etiam huius animalis medulla odoris imbuatur, hac ratione. Pingue, quod odoratum reddi debet, demptis, quo diximus modo membranis, elatum, & vino quàm odoratissimo, nulla marina aqua diluto, feruesactum, pernoctare sinitur: iterum id genus vinum eadem mensura infunditur, colliquatur, & exquisitè colatur, nouem eius heminis, iunci Arabici septem drachma addiuntur. Quòd si ipsum odoris fragrantioris fieri voles, quadraginta floris eiusdem drachma cum paribus palmae, calami, & cassiae modis adduntur: & xylobalsami, aspalathi singulae drachmae: cinnamomi, cardamomi, & nardi singula unciae. Omnia exactius tunduntur, & affuso vino odorato, in vase operto, quod super carbones firmiter collocatum sit, ter effervescunt, & semoto ab igne vase inibi pernoctant: postridie vinum effunditur, aliudque generis eiusdem adijcitur. Ter simili modo bene confervescat: deinde maturum excepto adipe vinum effundatur, & abluto vase, si quid imò subsiderit, detergatur. Postremò eliquatum pingue, & excolatum, ad usus reconditur. Hoc autem

modo odoramentis imbuitur, quod antea cura-
tum est. Verum anie dicta prius inspissari solent,
quò facilius sibi odoramentorum vires adscis-
cant. Itaque assumens quodcunque horum ro-
les, cum vino feruefacito, impositis vnà myrthi
ramulis, serpyllo, cypero, item asspalatho plenius
tuso. Aliqui tamen ad hunc vsum, vno dunta-
taxat horum contenti sunt. Cum autem ter effe-
buerit, exemptum leniter, & linteo colatum, a-
romatis, vti expositum est, imbuitur. Adipibus
spissamenta sic fiunt (quencunque acceperis, opor-
tet, vt recens tundatur.) Syncerus, & sangui-
nis expers adeps, reliquas habens notas, quas
sape retulimus, in ollam nouam demittitur, in-
fuso vino albo, vetere, odorato, quod semipedis
altitudinem superet: lento igni feruescat, dum
uernaculus odor aboleatur, planeq; vinum redo-
leat. At vbi deposito vase refrigit, due adipis
mine in ollam mittuntur, & duo vini eiusdē
sextarij, & seminis loti, eius inquam, cuius è li-
gno ludra tibia faciliantur, tusi minae qua-
tuor adijciuntur: lento igni subinde miscendo de-
coquantur: cūq; odoris virus euauerit: excola-
tusq; adeps refrigerit, vnà contusi asspalathi mi-
nae, cum amaracini floris minis quatuor, & ve-
tere vino subigitur. Nocte vna hac odorem ra-
piunt, combibuntque: postridie in fictile ollā tricō-
giālē ea omnia cū auipe iniecta, additis sextarijs
tribus vini, vnà feruescunt, quousque & vim.

Et odorē spissamentorū adeps ipse contraxerit:
 qui eliquesces colatur, et reponitur, Quod si ma-
 iorē odoris fragrantia efflagites, drachmas octo
 quā pinguisima myrrha vino macerata, quod
 multos in annos asseruatū est, misceto, Gallina-
 ceus, anserinusq; sic odoribus imbui solēt. Cuius
 vis eorū pcurati sextarij duo fīctili olia excipiū-
 tur: erysiceptri xylobalsami, palma elata, et ca-
 lami planē tontusi, singulorū sescuncia admiſce-
 tur: vini Lesbij veteris cyathus vnus adiicitur:
 ea ter efferuescunt prunis, mox à se sublato ab
 igne, die, noctūq; refrigerātur: postridie liquata
 per linteū crassum mundū in vas ex colātur. V-
 bi verò adeps coierit, concha excipitur, fīctiliq;
 nouo dentius operto perfrigidis locis reponitur.
 Hyberno tēpore id instituere oportet: astate si-
 quidē pingua non coguntur. Nec desunt qui
 Tyrrhenica cere momentū adiciant, quò faci-
 lius in vnū corpus omnia coalescant. Eadem ra-
 tione suillus adeps, & vrsinus, ceteriq; id genus
 odoramētis imbuūtur, Verū sampsuchi odorē a-
 deps ipse representabit hoc modo. Curati quā op-
 timē adipis, praesertim taurini, muna vna, tēpe-
 stuiq; sampsuchi exquisitē confracti sesquimina
 miscentur, & inperso largiore vino digerūtur
 in offas, quae in vase cooperto nocte quiescunt.
 Matutinis in fīctili olla leuisculo igni affusa a-
 qua leuiter coquūtur, dūq; suū adips odorē exue-
 rit, defecatas, ac bene optus, nocte tota pmanet.

Postero die deterfa sorde, qua pessum ierat, sam-
 psuchi, vt dictum est, co. ut usi iterum sesquimina
 priori. pastilio adijcitur, eodemq; modo in ossas
 cogitur: alijs qua diximus peractis, decoquitur,
 & colatur, & si qua fundo hasit spurcitia, dera-
 datur, & frigido loco reconditur. Si quis tamen
 incuratum adipem anserinũ, gallinaceum, aut
 vitulinũ à putredine tueri velit, ita faciundum
 est. Quẽuis adipem diligẽter elotũ, & siccatur in
 umbra super cribrũ, per lintea munda manibus
 vehemẽter exprimat, linoq; consutum vmbroso
 in loco suffodiat, & post multos dies noua char-
 ta inuolutũ, frigido loco recondat. Pinguis autẽ
 indito mellẽ vindicantur à putredinis vitio.
 Vis omnium est excalfacere, mollire, rarefacere.
 Taurinus adeps, bubulus, & vitulinus aliquã-
 tum abstringunt Earundem virium cõpos leo-
 ninus: nam resistere eum aiunt ijs, qui insidias
 moliuntur. Ceruino, elephantinoq; perunclos,
 serpentes fugiunt. Adstringentior est caprinus:
 qua ex causa decoctus cum polenta, hoc, & ci-
 seo dysentericis datur, & cũ ptisana succo insun-
 datur. Ius decocti phthysicis in sorbitionibus pro-
 dest. datur quoque vtiliter ijs, qui catharidum
 venena hauserunt. Hircinus, vt qui valutilissimẽ
 discutiat, podagricis auxiliatur, cũ fimo capræ,
 & croco impositus, huic proportionẽ respondet
 ouillus. Suillus verò cõtra vulua, & sedis vitia.
 idoneus est: ambustis igni medetur. E sue vetu-

stissimus quisque sale conditus excalescit, & emollit: elotus vino pleuriticis prodest: cinere, aut calce exceptus, inflammationibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asininum tradunt cicatrice corporis contolores reddere. Anserinus, gallinaceusq; cōueniunt muliebribus malis & ad labiorum rimas, ad mangoniꝝ andam faciem, & contra aurium dolores. Vrsinum constat raptos vitio alopecie capillos restituere, pernionibus subuenire. Vulpinus medetur aurium doloribus. Flumina tilium piscium pingua perunctis oculis claritatem afferūt, si in sole liquecant, & mella admisceantur. Vipera adeps contra oculorum hebetudines, suffusionesq; efficax est, addita cedria, melle Attico, & pari oleo vetere: pilos alis euulsos perunctis radicibus recens, & per se illitus obliterat, atque renasci non patitur.

Medulla. CAP. LXX.

Laudatissima est ceruina, mox vitulina, post hanc taurina, dein caprina, & ouilla. Colliguntur aestatis exitu, cum appetit autumnus: quippe cum alijs anni temporibus cōcrementū sanguinis, & veluti caro friabilis, in ossibus inueniatur: nec facile cognosci potest, ni quis eam ossibus extrahat, & recondat. Omnes medulla molliunt, calfaciunt, rarefaciunt, vlcera explēt. Ceruina perunctos venenata fugiunt. Curantur recentes, adipis modo, aquæ respersu subacta selectisq; ossibus tantisper elotæ, & in linteum expre

expressæ, donec aqua syncera emanet: et deterfa
 sorde penna, si qua innatet, liquata in duplica-
 to vase in pilam exprimuntur: & ubi coiere,
 omni face, quæ ad ima sedit, derafa, ficticili nouo
 reponuntur. Quod si libet incuratas reponere,
 facite omnia, quæ de anserum, & gallinarum
 adipe demonstrauimus.

Fel. CAP. LXXI.

FEL omne reponitur hoc modo. Recens prali-
 gato ore folliculi lino tandiu demissum in
 feruentē aquam, dum quis spatium triū stadiorū
 percussaret, mox exēptū siccatur vmbroso loco,
 aspergunt nō redolēte. Sed qđ ad oculorū medica-
 mēta adiūci solet, ligatum lino in vitreum vas,
 quod mel habeat, immittitur: circūuoluto ad os
 vasis lini principio, & operto vase reconditur.
 Est autem omnis fellis vis acris, & excafaciēs:
 intensis tamen, & remissis viribus differūt. Si-
 quidem prastātius in effectu esse videtur fel ma-
 rini scorpionis, & piscis qui callionymus appella-
 tur, marina testudinis, hyanæq;: item perdicis,
 aquilæ, gallinæ candidæ, & syluestris capræ, qđ
 priuatim prodest cōtra suffusiones incipiētes, &
 oculorum caligines, argemas, & genarū scabri-
 tias. Ouillo, suillo, hircino, atque vrsino, tauri-
 nū multo efficacius. Felle omni perfacilem, præ-
 sertim infantibus, deiectionem quis molietur, si
 intinctū eo tomētum, aut fimbriam sedi subij-
 ciat. Priuatim taurino angina cum melle perun-

guntur: sedis vlcera sanat, et ad cicatriceꝝ vsque perducit. Idem auribus fractis, & purulentis cū muliebri lacte, aut caprino inſtiliatū, medetur: & ſibilo earundē ex porri ſucco. Admiſceri inſuevit vulnerarijs emplaſtris, et circūluntio-
bus, quæ contra venenata parantur: phagedæni-
cis vlceribus, colicis, & ſcroti doloribus ex melle prodeſt: lepras, ſurfures cū nitro, & terra cimo-
lia quā optime purgat. Onillum, & vrsinum
contra eadē polent, verū inefficacius hæc præ-
ſtant. Vrsinū eclegmate comitiales adiuuat. Fel
teſtudinum anginis, et in ore infantium nomus,
prodeſt: naribus inditum comitiales erigit. Syl-
ueſtrum caprarum felle peculiariter perunculi
luſcioſi ſanantur. Hircinum idem obit munus:
thyſia abolet, & luxuriantes elephantorum
extuberationes illitu reſtimit. Suillum autem
contra aurium vlcera, reliquaq; omnia magno
vſu aſſumitur.

Sanguis. C A P. L X X I I.

Sanguis anſeris, anatis, & hædi, vtiliſſime in
ſantidota miſcentur. Palumbi autem, turtu-
ris, & columbæ, ne non perdicis, oculis cruore
ſuffuſis, & recentibus eorum vulneribus, luſcio-
ſisq; illuminantur. Peculiariter columbæ ſanguis,
cruorem membranis celebri erumpentem inhi-
bet. Hirci, capra, cerni, & leporis ſanguis maſſa-
tus ſartagine, dyſenterias, & cæliacorum proſu-
mia ſiſtit: in vino potus cōtra toxica efficax eſt.

Lepo

Leporinus sanguis ita vt tepet illitus, viria cutis in facie, lentiginesq; emaculat. Caninus com-
modè ab his bibitur, quos efferata in rabiem
bestias momorderit: contra epotum toxicum au-
xilium est. Testudinis terrestris sanguinem epo-
tum tradunt prodesse comitialibus. Marina au-
tem testudinis cum vino, & leporis coagulo,
cuminoq; contra serpentium morsus, & hausta
rubeta venena conuenienter bibitur. Taurinus
cum polenta illitus, duritias discutit, emollitq;.
Sanguis equarum, quæ admissuram expertæ
sunt, in medicamenta additur, quæ erodunt, se-
ptica vocant. Sanguine chamaeleonis genarum
palpebris euelli creditum est. Hoc idem viri-
dium ranarum sanguine præstat. Mestruus sanguis
faminarum circulum conceptum inhibere existima-
tur: aut si omnino mulier menstrua supergredia-
tur, leuat podagræ dolores, & ignem sacrum illitus.

Fimum. CAP. LXXIII.

Amentarie bonis fimum, si recens admo-
ueatur, vulnerum inflammationes mitigat:
folijs autem inuoluitur, & calfactum cinere fer-
uenti superponitur. coxendicis cruciatus fotu cõ-
pescit: illitum ex aceto duritias, panos, & stru-
mas discutit. Priuatim suffitu fini, quod a ma-
sculo boue redditum est, procidentes vuluæ reprimuntur:
accensi nidore culices abiguntur. Fimum ca-
prarum, præsertim in montibus degentium, po-
tum in vino, regium morbum emendat, menses cit

cum odorem haustum, & partus euocat. Tritum in farinam, & impositum lanis cum thure, feminarum profluvia sistit, ceterosque sanguinis impetus ex aceto cohibet. Medetur alopecys exustum, & cum aceto, aut oxymelite illitum: cum axungia verò impositum his, qui podagra tentantur, auxilio est. Caprillum in aceto decoctum imponitur serpentium morsibus, vlceribus, quae serpunt, igni sacro, & parotidibus. Vtile ischiadici vstionem hunc in modum accipiunt. In eo interstitio, ubi pollex brachiali committitur, cana veluti lacuna subsidet, in qua lana oleo imbuta substernitur, deinde sigillatim feruētes stercora caprini pillulae imponuntur, dum vapor per brachium ad coxam sentiatur peruenire, & coxendicis dolorem mitigare. adustio id genus Arabica appellatur. Oniolum ex aceto illitum sanat epinyctidas, clauos, pensiles verrucas, thymos, & ambusta igni, rosaceo cerato exceptum. Fimum suum sylvestris aridum: in aqua, aut vino potum, reitelliones sanguinis sistit: vetustum lateris dolorem mulcet: adrupta, & conuulsa ex aceto bibitur: luxatis cum cerato rosaceo medetur. Tam asinorum, quam equorum fimum, siue crudum, siue crematum, addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. Armētarij, qui herba pascitur, siccum fimum liquatum in vino, mox potum contra scorpiionum ictus magnopere auxiliatur. Columbinum vehementius & excalfacit, & vrit: cum hordea

hordacea farina mixtum, strumas ex aceto discutit: carbunculos emarginat, tritum cū melle, lini semine & oleo: ambustus igni medetur. Galli naceum verò omnia eadem, sed inefficacius præstat: priuatim tamen cōtra venena fungorū, et coli cruciatus ex aceto, aut vino bibitur. Ciconia fimum, si ex aqua hauriatur, comitialibus prodesse credunt. Vulturini fimi nidore partus excutiuntur. Murinum detritum cum aceto, & illitū, alopecijs medetur: cum thure, & mulso calculos expellit: subdita infantibus muscerda, alui deiectionem promouent. Caninū, quod flagrantissimo canis sydere fuerit exceptū, cum vino, aut aqua potum, sistit aluū. Humanum sterces illitum, vulnera ab inflammatione vindicat, & obiter intumescere non patitur: sed ea statim glutinat. sicco ex melle anginae perungi cōmodissimè tradūtur. Terrestris crocodili fimum, crocodileam vocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, nioremq; seruat. Optima est candidissima, & friabilis, amyli modo, minimè ponderosa, in humore statim eliquescens: quæ cū teritur, fermenti acorem quadātenus refert. Adulterant eam sturnorum fimo, quos captos oryza pascunt ipsumq; non dissimile vendunt. Alij amyllum, aut cimoliam miscent, & adscito anchusæ colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, vt se contrahat in vermiculorum speciem: qui siccati pro crocodilea vaneunt. Inter

omnes

omnes conuenire inuenio, humanum, stercus, ca-
uinumq; gutturi impositum, anginis auxiliari.

Vrina. CAP. LXXVIII.

Humanam urinam suam cuique bibere,
contra vipera morsus, ac venena, incipien-
temq; aqua inter cutem proderit: scorpionis, vi-
pera marmorum, draconisq; morsus, ea conueni-
entissime fouetur. Canina ad profundus canis mor-
sus idonea est: pruritus, & lepras nitro addito
expurgat. Sed vetus vlcera capitis manantia,
fursures, psoras, & feruidas eruptiones, multo
magis abstergit: uomas, & precipue genitalium,
cohibet: auribus infusa manans pus suppressit:
decocta q; in calyce mali punici, earum vermicu-
los abigit. Pueri, impubis resorpta vrina, ortho-
pnoeis auxiliatur: decocta in aereo vase cum melle
emendat cicatrices, argema, caliginesq; ex ea et
cupro idoneum auri ferramen conficiunt. Quod
in vrina subsidit, illitu ignem sacrum mitigat:
feruescens cum cyprino, inditumq; vulua do-
lores mulcet, stragulatibus leuat, genas deterget,
oculorum cicatrices expurgat. Tarrina si cum
myrrha instilletur, aurium dolores leuit. Apri-
na viribus eiusdem praelata est: priuatum commi-
nuit vesicae calidulos, & potu expellit. Caprim
ad aquam qua cutem subigit, cum nardi species
quotidie binis cyathis cum aqua bibitur, urinamq;
per aluum extrahit: aurium doloribus insilla-
ta medetur. Asinina traditur renum vitis me-
deri

deri. Lyncis vrinam, quam lyncurium appellāt. simulac excernitur, glaciari coireūe in calculi duritiam, vulgò creditū est. quare quod de ea proditum est, vanū esse conuincitur. Est enim quod à nonnullis vocatur succinum pterygophoron, ideo dictum, quod pennas ad se alliciat. Id potum ex aqua stomacho, aluoq; fluxione laboranti conuenit.

Mel:

CAP. LXXV.

Prinicipem locum obtinet mel, quod Atticae regionis est, præcipuè ex Hymetto, mox Cykladibus insulis, & è Sicilia, cognomine hyblaū. Magis probatur dulcius & acre, odoratius, subflauum, nec humectum, graue, & minimè fluxum, quod ob sequacem lentitiā non faciliè abrūpitur, tractumq; resilit in digitos. Mel abstergendi vim habet: ora venarum aperit, humores euocat: qua ratione in sordida vlcera, sinusq; cōmodissimè infunditur. Decoctum, atque impositum, abscedētem carnem glutinat: medetur impetigini coctum cum liquido alumine, & illitum: item aurium sonitui, & dolori cum fossili sale trito, tepidū instillatur: lentes, & fræda capitis animalia illitum necat: nudū glandē recutitis operit, præsertim quæ circuncisione aperta nō est, si melle præputium à balneo triginta diebus emolliatur: oculorum caliginē discutit: faucibus, tōssillis, angina collutū, gargarizatū medetur: vrinā ciet: auxiliatur tussi, & à serpente

pente percussis contra haustum meconium, cum rosaceo calidū assuuiur: aduersus venena fungorum, & rabiosi canis morsus linctum, aut potum proficit. crudum tamē aluum inflat, tuſsim laeſſit, & ea de re despumati vsus aptior est. Primatiū tenet in mellis genere vernum, deinde aestiuum: hybernū vero, utpote quod crassius constet, deterrimū reputatur, ceragini faciunda idoneum. Quod in Sardinia gignitur mel, amarum est: quoniam apes inibi absinthio rescātur. quo vitia cutis in facie, & macula aptissimē perunguntur. Heraclia in Ponto quibusdam anni temporibus, propria quorundam florum dote, mel conflatur: quod qui edere, mente abalienantur, ac sudore diffluunt. Remedio sunt esitata ruta, & salsamenta, aut epotū mulsum, resumpta, quoties vomitione reſciuntur. Acre autem est, & orſactu sternutamēta mouet. Quod cum costo illitum, ſceminarū cutem emendat, & cum sale sugillatiōes rapit. Est & aliud cōcreti melis genus, quod ſacharon nominatur. In India vero, & felici Arabia in arundinibus inuenitur. ſalis modo coactum est, dentibus, ut ſal, fragile: aluo idoneum, & stomacho vtile, si aqua dilutum bibatur: vexata vesicæ, renibusq; auxiliatur. Illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt.

Cera. CAP. LXXVI.
Cera optima est subfulua, suppinguis, pura, odor

et odorata, & halitū quadantenus melleum re-
 ferens, natione Pontica, aut Cretica. Secundum
 locum obtinet candicans, & suapte natura pin-
 guis. Candida fit hoc modo. Ex ea radunt albū,
 sincerumq; atque transfundūt in vas, quod sa-
 tis habeat marinæ ex alto petita, inspersoq; ni-
 tri momento, decoquūt: cumq; iterum, tertious
 inferbuit, separatim vas refrigerāt, ac cera pa-
 stillū eximunt, deterfa sorde, si qua fortè adha-
 sit: tū denuo indita noua maris aqua fernet, vt
 retulimus: et vase dempto ex igne, fundum ollis
 la noua aqua frigida madefactum, in cerā sum-
 mā suspensa manu intingunt, quò celerius cōcre-
 scat, & quā minima portio extrahatur. Susce-
 pto primo ceræ orbiculo, iterū vasis imum aqua
 refrigeratum, tātisper in cerā immitti debet, diū
 tota excipiat. Orbiculi lino cōsuti, interuacan-
 te spatio suspēdūtur, & interdū cōtinuò sub so-
 le, noctu sub luna asperguntur, vsq; dum perse-
 ctè albescāt. Verū si eximius ille cādor deside-
 retur, eadē facilitari, & identidē recoqui opera-
 pretium est. Nec desunt, qui pro marinā, in mu-
 ria quā acerrima semel, aut iterum excoquant:
 dein laguncula tenui, rotunda, ansam habente
 extrahunt: postea orbiculos, substrato affatim
 cespite herbofo, insolāt, donec candorē summum
 contraxerint. Precipiunt hoc obeandū munus
 vere, sūm sol remissa vehementia humorem pa-
 rat, vt non facile liquetur. Cera omnis mollit,

l. calsa

calscit modicè explet corpora: datur in sorbitione dysentericis, ac millij magnitudine decem grana cera hausta, lac in nutribus non patiuntur coagulari.

Propolis.

CAP. LXXVII.

Propolis eligi debet flava, odorata, styracem referens, in vehementi ariditate mollis, & mastiches more ductilis. Magnoperè calscit, & euocat: aculeos, & omnia infixa corpori extrahit: in vetere tussi sufficit: proficit: impetigines admota tollit. Ea in alueariorū soribus, cerasa natura inuenitur.

Triticum.

CAP. LXXVIII.

Optima è tritici generibus ad secūda valetudinis vsus habentur, qua reiecta, & iam perfectè adulta, colorem luteum referunt, dein sequuntur trimestria, qua nonnullis sita nominantur. Itaque cruda in cibis teretes in neas gignunt: canū morsibus prosunt, mansa & imposita. Confectus eorū similagine panis, pius alit, quā cibarius. E trimestriū farina panis leniore cibum prabet, & qui faciliè in mēbra demandetur. Farina eorum cum hyoschyami succo illinitur aduersus neruorū fluxiones, quas Greci rheumatisimos vocāt: itē cōtra interaneorum inflationes: lentigines ex aceto mulso tollit. Furfures autem in acri aceto decocti, turgentem mām. sedant: viperarū icthibus auxiliatur: & torm. nosis prosunt. Farinaceū fermentum calsa

ialfaciendi,extrahendiq; vim habet : priuatim
 callos pedum,clauosq; extenuat: & cetera tu-
 bercula furunculosq; ex sale concoquit, & ape-
 rit. Sitaniorum farina, cōtra venenatos ictus cū
 aceto, aut vino commodissimè illinitur : eadē si
 decocta in glutini modū delingatur, cremen-
 tis excreationibus pderit: cōtra tussim, & exaspe-
 ratas arterias, cum mentha & butyro decocta,
 efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsā, aut
 hydrelæo decocatur, omnē discutit inflammatio-
 nem. Panis & crudus, & coctus cum aqua mul-
 sa in flāmationes omnes illitus mulcet, cū emolliat
 & quā lente huius refrigeret : sed herbis, succisūe
 huius rei accōmodatis admisceatur. Vetus panis
 aridus, adiectis cōuenientibus, citam aluum co-
 hibet. Recens muria maceratus, illitus vetustas
 impetigines sanat. Glutinum ex similagine, &
 polline, quo charta glutinantur, sanguinem ex-
 creantibus prodest, si liquidius, ac tepidum
 cochlearis mensura detur sorbendum.

Hordeum. CAP. LXXIX.

Hordeum est candidum, purumq; . Id mi-
 nus, quā triticum alit. Ptisana tamen
 ob cremorem in decoctione redditum, plus ali-
 menti prebet, quā polenta ex hordeo facta. cō-
 tra acrimonias, atque gutturis scabritias exul-
 cerationesq; pollet: quibus etiam triticea ptisa-
 na præsidio est: sed plus alit, magisq; urinam mo-
 uet. Lac abūde suppeditat, si cum fenuiculi semi-

ne decocta sorbeatur. Hordeum obsterget, vrinam ciet, inflationem parit, stomacho aduersatur, tumores concoquit. Farina hordeacea decoquitur in mulsâ aqua cum fico, vt inflammationes, collectionesq; discutiat: duritias cum resina, & fimo columbarum concoquit: cum melilotto autem, & papaueris calyce dolores finit, qui latius excruciant: aduersus intestinorum inflationes cum ligni semine, fœnogræco, & ruta illini inuat: strumas cum pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri vrina, ad concoctionem perducit: & cum myrto, aut vino, aut malicorio, aut sylvestribus pyris, aut rubo, alui profluvia sistit: podagricis inflammationibus cum cotoneis, aut aceto pdest: decocta in acri aceto, modo quo hordeaceum captaplasma, & calida imposita, lepræ medetur. Cremor verò farinae ex aqua, atque cum pice, & oleo decoctus, puri mouendo est: cū aceto subactus, itidem & cum pice contra articulorum fluxiones prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflammationesq; mitigat.

Zythum. CAP. LXXX.

EX Hordeo potus fit, cui Zitha nomen est. Is vrinam ciet, renes, & nervos tentat: membranæ, præsertim cerebrum vestientibus, officit. Inflationem parit, vitiosum succum creat, elephantiasin gignit. Persusum Zytho ebur, obsequiosum, & operi tractabile redditur.

Curni CAP. LXXXI.

Fit &

Fit & ex hordeo potus, quem Curmi nominant, eoq; saepe potu pro vino vtuntur: verum dolorē capitis mouet, malum succū gignit, nervis nocet. Consimilia etiam potus generi ex tritico fieri solent in Iberia, quæ occidentem spectat, & Britannia.

Zea. CAP. LXXXII.

ZEA = duorum gerum est, vna simplex: al^a Vulgò tera in geminis potaminibus grana bina spelta. iuncta gerit, ob id dicoccos appellatur. Plus quàm hordeum alit, ori grata. digeritur in panificia, minus quàm trituum alens.

Crimnon. CAP. LXXXIII.

Crimnon crassior est ex Zea, triticoq; farina, ex qua pultem faciunt. Abundè alit, † sed agrè conficitur: aluum vehementius adstringit, si Zea, ex qua fit, prius torreatur.

ANOTATIO.

† Neque Ruellium, neque cōmunem, vulgatamque Græcam lectionem hic secuti sumus: sed Marcellum, qui probatissimi codicis testimonio non ἐυκατέργασον, qd facile cōficiatur, sed ἀκατέργασον, quod agrè concoquatur, legendum putat.

Olira. CAP. LXXXIIII.

Eidem Zea generi † olyra adscribitur, sed minus aliquantò nutrit. In panes, vt Zea, cogitur. Fit quoque ex olyra crassior farina, quam Græci crimnon vocitant.

ADNOTATIO.

† Ne quis frustrà quærat Siliginis caput, lectorem admonitum volumus, hic nos minimè secutos esse Ruelliū, qui *ὀλυσσιν* siliginem, vertit, sed Græcam vocem retinuisse. quòd *ολυρά* à siligine planè differrecēseamus, vt in cōmētario ostēdimus.

Athera. CAP. LXXXV.

Athera ex *zea* fit tenuissimè molita. Est autē sorbitio, quasi liquida pulicula, infantibus conueniens, & cataplasmati efficax.

Tragos CAP. LXXXVI.

Tragos quandam halicæ frugis figuram gerit. Multò minus, quàm *zea* nutrit, quod multum aceris habeat: quare ægrius conficitur, aluumq; magis emollit.

Auena. CAP. LXXXV.?

Avena genicula quadā habet: folio, & stipula triticū imitatur: & in cacuminibus dependentes paruulus veluti locustas bipedes gerit, in quibus semē cōtinetur, vtile ad cataplasmata vti ordeum. Pulte huius aluus sistitur. prodest tussientibus in sorbitione succus.

Oryza. CAP. LXXXVIII.

Oryza frugū generis est, in palustribus, riguisq; nascens. Mediocriter alit: sed aluum suppressit.

Halica. CAP. CXXXIX.

Halica fit ex *zea*, quā *dicoccon* appellanti.

mus. Plus alit, quā oryza: aluū magis cohibet: stomacho lōgè vtilior. Decoctū in aceto, illitaq; lepras tollit: vnguiū scabritias extricat: incipiētibus hægylōpys medet, Decoctū dysentericus, quos excruciat dolor, infusum, idoneum est.

Milium. CAP. XC.

Milium in panes coactum, minus ceteris frugibus alit: sistit pulte sua aluum, vrinam cit. Torretur milium, seruensq; in sacco ponitur, vt torminibus, reliquisq; doloribus, si foueatur, auxilio sit.

Panicum. CAP. XCI.

Panicum frumentaceis seminibus annumeratur, milio simile, eodemq; modo in panes subigitur. Eosdem habet vsus, minus tamen & nutrit, & stringit.

Sesamum. CAP. XCII.

Sesamon stomacho inutilis cibus. halitus grauitatem facit, quoties inter mādendū, comissuris dentium inhaesit: nervorum crassitiem illitu discutit: medetur auribus fractis ambulstis, inflammationibus, coli doloribus, & cerasa morsibus: capitis dolores, qui a stuatione concitantur, ex rosacea lenit. Eadem efficit herba decocta in vino: praesertim inflammationibus oculorum, doloribusq; prodest. Ex ea fit oleum, quo Aegyptij vtuntur.

Lolium. CAP. XCIII.

Lolium, quod inter legetes nascitur, molitur

litum, nomas putrescentia vlcera, gangrenasq;
compescit cum raphanis, & sale illitum: & ex
aceto, & sulphure viuo feros lichenas, & lepras
sanat: strumas quoque discutit, cum fimo colum-
bino, & ligni semine decoctum in vino; rumpit,
que agrius ad coctionem perducuntur. Decoctū
ex aqua mulsa vtilissime ischiadicis illinitur: si
cum polenta, thure, myrrha, aut croco suffiatur,
conceptionem adiuuat.

Amylum. CAP. XCIII.

Amylum ex eo appellatū est, quod sine mo-
la fiat. Optimū ex trimstri, natione Cre-
ticum, aut Aegyptium. Ratio faciendi amyli haec
est. Purgatū trimestre triticum madescit quin-
quies die, & si fieri potest, nocte: cum emoluitum
fuerit, esunditur sensim sine agitatione aqua,
quò minus cremor vtilis vnā excludatur. vbi
mollissimum esse videtur, mutata aqua pedibus
calcari oportet: rursus infusa, teritur: tum demum
enatantes ibi surfures incerniculo eximendi, re-
liquumq; quallo sportisq; siccatum tegulis nouis
confestim torreatur flagrantissimo in sole: nam-
que si paulisper v dum maneat, acorem concipit.
Contra fluxiones oculorum, pustulis, cauaq; vl-
cera efficax est, sanguinis reiectiones petu colli-
bet, exasperatas fauces lenit. lacti, atque obso-
nīs admiscetur. Fit etiā amyllum ex zea, qua
maceratur, ac eluitur vno, aut altero die, & su-
baete farina modo manibus subigitur: pressaq;
feruen-

feruentissimo in sole, vt antè retulimus, exiccatur. Nullus in medicina vsus, ad alia tamen conueniens.

Fœnum græcum. CAP. XCV.

Fœni Graci farina vim habet emolliendi, discutiendiq; in aqua malsa decocta aduersus tam internas, quàm externas inflammationes, efficaciter illinitur: lienem cum aceto, & nitro trita extenuat. Succus decocti eius fœminarum malis subuenit: & siue tumor, siue praeclusio sit vulua, sonetur, & insident. Fœni graci in aqua decocti cremor expressus, capillos, surfures, & manâtia capitis vlcera purgat: locos dilatat, et emollit, si cum anserino adipe possi vice subijciatur. Viride cum aceto vtilissimum imbecillibus locis, & vlcera sentientibus. Decoctum eius prodest aduersus tenesmos, fœtidamq; dysentericorum prolauiem. Oleum, quod ex eo exprimitur, & myrto, capillos, & genitalium cicatrices absterget.

Linum CAP. XCVI.

Linum vulgò notum est, cuius semen easdè, quas fœnum græcum vires habet. Discutit, & emollit omnem intus, forisq; inflammationē, cum melle, oleo, exiguaq; aqua decoctum, aut melle cocto exceptū: vitia cutis in facie, varosq; crudum tollit: illitū cū nitro, & fœculneo cinere, parotidas, duritiasq; discutit: vlcera, que serpūt sanosq; cum vino decoctum expurgat: vngues

scabros eximit, cū pari modo nasturtij, & mel-
lis: vitia pectoris extrahit, si ex melle in eclegma-
tis viem sustitatur: tuſſim lenit: venerem sti-
mulat, si farina piperis, & melle exceptum, pro
placenta largius adsumatur. Huius decoctum
interraneorum, vuluaq; erosionibus immitti-
tur: alui excrementa euocat, ad vulua inflam-
mationes in desensionibus per quā vtile.

Cicer. CAP. XCVII.

Cicer satiuū aluo idoneum est, urinā diet,
inflationem parit: colorem commedat, mē-
ses ac partus expellit, lac auget. Cum eruo deco-
tum illinitur ad inflammationes testium, verru-
cosas informicationes, ad scabiem, vlcera capiti
manentia, impetiginesq; item contra carcinoma-
ta, & vlcera, quæ cacoëthe vocantur, cum melle,
& hordeo prodest. Alterum genus arietinū na-
minatur. Vtrunq; cit vrinas, dato cū rore mari-
no hydropicis, aut regio morbo laborātibus, eorū
decocto. Ledūt ea ex ulceratā vescicam, & renes.
In verrucarum formicantium, pensiliumq; ge-
nere, prima luna singulis granis singulas tan-
gunt, eaq; grana linteolo deligata abijci post se
præcipiūt, ita decidere eas arbitrātur. Sylvestre
cicer, folijs satiuo simile est, odore acris, sed se-
mine discrepat. Idem quod satiuum prestat.

Faba. CAP. XCVIII.

Faba inflationem exitat, agrè concoqui-
tur, tumultuosa somnia facit, tuſſi confert,
carnem

sarnem gignit, media calidi, frigidiq; natura. Decocta in posca, & cum suo cortice esitata, dysenterias, & celiacorum profluvia sistit: contra vomitiones cōuenienter manditur. Inflatio lenior cotralitur, si aqua prior intercōquendum abijciatur. Viridis plus negotij stomacho exhibet, maioremq; flatū parit. Lomētū eius et per se, & cū polēta illitum, inflāmationes, quas vulnus excitauit, mitigat, cicatrices cōcolores facit: turgentes grumoso lacte māmas, etiā si inflāmatione tentētur, adiuvat: lac restinguit: furunculōs sugillata, & parotidasq; cū ſœni graci farina, & melle discutit: cum rosa autē, thure, & oui candido, procidentes oculos, tumores, vnasq; reprimat: subactū vino, suffusiones, & iētus oculorum recreat. Māducata sine cortice faba, ad auertēdas fluxiones, frōti illinitur. decocta in vino testīū collectiones sanat: quō tardius pedes erūpat, pueris imo vētri illinitur, vitiliginē purgat. Fabarū cortice illiti capilli, qui post euulsione renascūtur, gracilescūt, et minus alimētī capessunt: cū polēta, scisso alumine, et vetere oleo impoſiti cortices, strumas discutiūt. Decocto earū lane inficiūtur. Faba dēpto cortice in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi ſolet sanguinis defluxionibus ab hirūdine cōcitatīs: nāq; eas supprimit, si semisecta apprimatur.

A Faba ægyptia. CAP. XCIX.
Ægyptia Faba, quam aliqui Ponticam
vocat.

- πλεῖς & vocant, in Aegypto plurima provenit, in Asia id est, plu etiam Ciliciæq; lacubus inuenitur. Folia habet rima.

ampla, † etiam si ad arborum frondes comparatur: caulem cubitalem, digiti crassitudine: flore roseum, dupla papaveris amplitudine: & ubi flore exuitur, fert folliculos vesparum fauis similes, in quibus faba supra operculum, bullanti ampullæ modo, prominet. Ciborion, aut Cibotion, id est arculam, ideo nominant, quoniam se ratatur ipsa humenti glebæ mandata, & ita in aquam demissa. Radice firmatur harundine crassiore, quæ cruda coctane estur. ei Colocasia nomen est. Faba virens manditur, & excicata nigrescit: vulgarem magnitudine superat. Astringendi facultatem obtinet, & stomacho vtilem dysentericis, exiliacisq; prodest, in sparsa polenta vice, lomento: datur quoque in pultæ. Cortices in vino mulso decocti, si terni inde cyathi bibantur, magis proficient. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio viride spectatur, gustu amarum, si tritum, cū rosaceo coctum insilietur.

† Græci codices hoc loco habent οὐ πύραρον, id est, instar galeri. Quæ autem horum loco affert Ruellius ex Plinio sumpsit loco citato. Vbi verbis, quæ illa sequuntur, rectius fortè hunc Dioscoridis locum interpretari videtur.

Lens. CAP. C.
Lens frequēti uso aciem oculorū obtundit.
 egrè

agrè concoquitur, stomachũ malè habet, eumq;
& intestina inflat: sed aluum cum cortice cocta
sistit. Praestat in cibo, quæ facillimè coquitur, ni-
hil atri in maceratione reddens. Vim habet ad-
stringēdi: quæ ex causa aluũ cohibet, si detracto
antea cortice discoquatur accurate, primaq; a-
qua inter coquendũ effundatur (quippe primũ
id decoctum ventrem resoluit.) Somnia tumul-
tuosa excitat: capiti, nervis, ac pulmone inutilis:
melius suo fungetur munere contra alui fluxio-
nes, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut
beta nigra, aut baccis myrri, aut putamine pu-
nici, aut aridis rosis, aut mespilis, sorbis uē, pyris.
Thebanis, aut molis cotoneis, aut cichorio, aut
plantagine, aut gallis integris, quæ post deco-
ctionem abijciuntur, vel rhoe, quæ obsonijs in-
spargitur: verũ acetum cum ea diligenter per-
coqui debet, aliàs aluum cõturbat. Contra sub-
uersionem stomachi, triginta grana lentis de-
librata deuorari proderit. Decocta cũ polenta,
& illita, podagras lenit: sinus cum melle gluti-
nat, crustas rumpit, vlcera purgat. Decocta in
aceto duritias, & strumas discutit: cum cotoneo
aut meliloto medetur inflammationibus oculo-
rum, sedisq; addito rosaceo, sed in amplo sinu,
aut inflammationibus sedis, quæ maius reme-
dium exigunt, cum putamine punici, ac siccis
rosis, adiecto melle, decoquitur: nomis quæ in
gangranam euaserunt, adiuncta maris aqua:

pustullis, & his quæ serpunt, igni sacro, pernionibusq; , vt antea dictum est: contra mammas in quibus lac in grumos coit , & præ nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris, & illius auxiliatur.

Phasioli. C A P. C I.

Phasioli inflant spiritus cientes, agrè coquantur. Virides cibo aluum emolliunt, ad vomitiones idonei.

Eruum. C A P. C I I.

Eruum parvus frutex omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in valvulis habet: è quibus farina fit, nomine eruina, ad medendi vsus conueniens. Eruum capiti onerosum est: aluum esu turbat: sanguinem per urinam extrahit: elixio boues saginantur. Paranda farinatio hæc est. Vberiora grana candidaq; deliguntur, permiscendoq; aqua resperguntur, donec sufficienter combibant: postea torrentur, vsque dum hians cortex disrumpatur: molitaq; , farinario cribro incernuntur: postremo farina reconditur. Hæc aluo utilis est: urinam ciet: meliorem colorem efficit: sanguinem per vesicam , aut aluum cum torminibus elicit, si largius in cibo, aut potu assumatur: vlcera cum melle purgat: lentiginos, & vitia cutis in facie, & maculas, totumq; corpus emendat, nomas, gangrenas, duritiasq; , serpere non patitur: mammarum duritias

emollit: atra vlcera, qua theriomata vocant, fauosq; emarginat: carbunculos rumpit, cum vi no subacta illitu morsibus viperarum, canum, hominumq; medetur: vrinae difficultates tenesmosq; ex aceto mitigat. Eruum tabidis, qui alimentum non sentiunt, tostum, & ad nucis magnitudinem melle exceptum, sumptumq; conuenit. Eius cremor perniones, & pruritus in toto corpore, sanat fouendo.

Lupini. CAP. CIII.

Statius Lupinus notus est. Cuius farina cum melle delinctu, aut potu, ventris animalia expleit. Ipsi quoque macerati, & cum sua amaritudine esiti, eadem efficiunt. Decoctum eorum idem munus praestat, cum ruta, & pipere potum: quare lienosis prodest. eodem vlcera tetra, qua theriomata vocant, gangraenas, iucipientem scabiem, eruptiones pustularu, vlcera in capite manantia, vitiligines, maculasq; fouere vtilissimu: menses & partus extrahit, cum myrrha, & melle subditum in vellere, Eorum farina cutem liuoresque corrigit: inflammationes cum polenta, & aqua mitigat: tubercula, & coxendicum cruciatus, ex aceto lenit: strumas in aceto cocta, illitaq; dissipat: carbunculos rumpit. Decocti caelesti aqua, donec in cremorem lentescant, faciem abstergant: medentur pecora
 sca

scabiei, cum radice nigri chamaleontis, ita ut re-
pente decocto abluantur. Cit vrinam radix cum
aqua cocta. Lupini triti, ubi macerati dulces-
cere coeperint, cum aceto potius, fastidium detrahunt,
& cibi aviditatem faciunt. Gignuntur & sylue-
stres Lupini, sativis similes, sed omnino minores:
qui eadem qua sativi possunt.

Rapum. CAP. CIIII.

Decocta Rapi radix alit, inflationem parit,
humorem ac fluxam carnem creat, vene-
rem stimulat. Decocto podagra, pernuionesque fo-
ventur: contritoque rapo, atque imposito iuvan-
tur. Si ex cauta radice rosaceum, ceratum adi-
gatur, & ferventi cinere eliquescat, exulcerati
pernuionibus proficiet. Cyma eius decocta man-
dundur, ac vrinam ciunt. Semen antidotus, et the-
riacis, praesertim quae sensum doloris auferunt,
anodyna, vocant, idoneum est: potum contra ve-
nena salutare est: venerem conutat. Rapum mu-
ria conditum, minus alimenti sufficit: sed multo
magis appetentiam recreat. Sylvestre rapum in
arvis nascitur. Frutex est in cubiti altitudine
assurgens, ramosus, levis in cacumine. Folia fert
lania, digitali latitudine, aut maiora: & fru-
ctum in siliquis calyculisque cumque eorum invo-
lucra aperiuntur, alia intus siliqua spectatur,
quae quadam capitis specie praebet: in qua semina par-
vula concipiuntur, foris nigra, intus alba. Additur
in medicamenta, quibus ad detergendam cutem in sa-

tie, totoq; corpore vtimur, praesertim quae ex lupini, & erui, tritici, aut lolij farina, fieri solent.

Napus. CAP. CV.

COcta Napi radix inflat, modicum alit. Semen eius potum venenorum vires hebetat: antidotis admiscetur. Conditur sale radix.

Raphanus. CAP. CVI.

RAdix, quae Graecis raphanus dicitur, ex-calfacit, flatus gignit, ori suavis est: sed stomacho aduersatur, ructus ciet, vrinam pellit, aluo aptior: summo tamen cibo sumi debet, quod magis eius distributionem adiuuet: cum autem praesumitur, cibum suspendit: quare vomituris commodissime datur ante cibum: sensum aciem excitat. Decocta contra veterem tussim, & pituita crassitiem in pectore efficax est. Cortex ex aceto mulso, celerius vomitiones mouet: hydropicis commodissime illinitur, lienosis vtibilis: sugillata cum melle rapit, & nomas amolitur: contra viperarum ictus auxiliatur: alopecias ad pilum reducit: lentigines cum loliacea farina emendat: his qui fungis strangulantur, tam cibo quam potu salutaris est. Semē vomitiones facit, vrinam mouet, menses cit, lienem rxtenuat: cum aceto illitum gāgranas validissime emarginat: coctum cum aceto mulso, anginis perquam vtiliter gargarizatur: contra cerasi morsus, potū ex vino, auxilio est. Syluestris raphani, quam Romani armoratiam vocant, folia satiuo simi-

m lia

lia, sed magis lampsanam imitatur: radix gracillius, tenera, subacris. Tam folium, quam radix in olera recipitur: sed hac excalfait, urinam coctat, astuosa est.

Sifer. CAP. CVII.

Sifer vulgò cognitum. Cuius radix decocta tri: grata est, & stomacho utilis: urinam ciet, & appetentiam inuitat.

Lapathum siue rumex.

CAP. CVIII.

EX generibus rumicis, oxylapathi vocant. quod in acutum tendit, dura habens extrema, in palustribus nascens. Alius est sativus, & illi dissimilis. Tertiū genus sylvestre, paruum, plantagini proximum, humile, & molle. Quartum est, quod alij oxalida, alij anaxyrida, ant. lapathon vocant. Folia eius sylvestri, ac exigua rumici similia: caule non magno: semine subacuto, rubente, acris, in caule & agnatis appendicibus, emicante. Omnium decocto olere alius emolitur. Crudi illius, melicerides, rosaceo, ant. croco adiecto, discutiuntur, Sylvestris, et oxylapathi, & eius, quā oxalida nominant, semen ex aqua aut vino utiliter bibitur, contra dysenterias, & celiacorum affectus, stomachi fastidia, scorpiionum ictus. Quod si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu patietur. Radices ex aceto coctæ aut illitæ cruda, lepras, impetigines, & scabrosos ungues persanant: sed antea locus aceto.

& nitro in sole perficiendus est. Pruritus corporis, decoctum earum sedat, si foveatur, aut in folijs balnearum conficitur. Cocta in vino, & in stillata, aurium, dentiumq; dolorem mulcent: strumas, parotidasq; discutiunt: lienem cum aceto extenuant. Aliqui amoliendis strumis radicem gestamine vtuntur, eas collo appendentes. Trita, & admodum fœminarum profuua sistunt: cum vino autem pota regio morbo medentur, calculos vesicæ comminuant, menses cient, scorpionum ictibus auxiliantur. Hippolapathon oculus est magnus, in paludibus nascens. Easdem habet vires, quas supradicta rumicis genera.

ANNOTATIO.

† Nihil fortasse Plinius à Dioscoride dissentiet, si in hoc loco sequamur lectio nem Oribasij lib. xj. simplicium: qui habet ὁ νὰσὰ πᾶρ ὁμοιοῦ τῶ πρώτῳ, id est, non prorsus simile primo. Nam ex hac patere arbitror, non tantum priora lapathi genera inter se differre, quantum vulgata lectio innuere videtur.

Lampſana. CAP. CIX.

Lampſana sylvestre olus est. Plus alit, quam Rumex, & stomacho utilius. Cuius folia, caulesq; coquuntur in cibo.

Blitum. CAP. CX.

Blitum estur oleris modo, alio utile est: nullius in medicina vsus.

Malua. CAP. CXI.

MAlua sativa esui longè aptior sylvestri. Sto macho aduersatur: aluum iuuat, sed multò magis caules: interaneis, & vesica utilis. Cruda folia cum salis exiguo manducata, agilopat ex melle sanant: verùm cum cicatricem trahere cœperint, ea demum citra salem vtendum est. Contra aculeatos apium, vesperarumq; ictus, illita efficax est: eadem cruda cum oleo trita peruncti non feriuntur: vlcera manantia in capite, furfuresq; cum vrina sanat. Sacris ignibus, & ambustis decocta folia tritaq; vtillissimè ex oleo imponuntur. Eius decoctum vuluas in sessione mollit: prodest eruptionibus vesicae, & intestinorum, vuluae sedisq; clystere infusum. Ius decoctae cum radice sua cōtra omnia venena auxiliatur, si cōtinuo bibentibus reuomantur, contra phalagiorum morsus remedio est: lac euocat. Semen in vino potum, adito loti sylvestris semine, vesica cruciatus lenit.

Atriplex. CAP. CXII.

Atriplicem aliqui chrysolacanem vocant. agnium olus est. Duo eius genera, sylvestre, & satuum. Coctum estur, vt olus: aluum mollit. Ranos discutit: siue crudi, siue cocti, m. illinatur. Semen cum aqua mulsu potum, regium morbum sanat.

Brassica. CAP. CXIII.

Brassica sativa aluo idonea est, si modo leni-

terferuefacta edatur. nam percocta aluum sistit, sed multo magis bis cocta, aut quæ in lixiuo coquitur: stomachũ autẽ malè habet. acrior est astiua. In Aegypto propter amaritudinẽ nõ estur. Cacutientibus, & tremulis esse prodest. Summo cibo sumpta crapulam discutit, & vini noxam restringit. Melior stomacho cyma, sed acrior, & ad ciendum vrinam validior, ea condita stomacho nimica est: aluũ conturbat. Crudus succus cum nitro, & iri deuoratus, aluum emollit: cum vino quoque epotus, viperarũ moribus auxiliatur: cum fieni graci farina, podagris, & articulorum vitijs illinitur: prodest & sordidis vlceribus, & vetustis illitis: caput purgat naribus infusus: menses extrahit, cum loliacea farina inditus. Folia per se illita, aut cũ polenta trita, conferũt inflamationibus, tumoribusq;: epinyctidas, ignẽ sacrũ, leprasq; sanat. carboniculos ex sale rumpunt: fluentes capillos retinent. Cocta addito melle aduersus depascentia vlcera, gangrenasq; valent. Lienosisq; ex acetocruda prosunt. Mansa, deuorato succo, retusam voiem instaurant. Decoctum eius potus, aluum, & menses ciet. Flos post conceptionem in pessa subditus, partũ abortu vitiat. Semen eius, praesertim quæ in Aegypto nascitur, potum tineas repellit. In antidota theriaca additur: faciei cutem, lentiginesq; expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci v. u.

sto excepti diuturni laterum dolores mitigant.

Brassica sylvestris. CAP. CXIII.

Sylvestris Brassica, maritimus præruptior; locis magna ex parte gignitur: sativa similis, sed candidior, hirsutiorque, amara. Cuius cyma in lixivio cocta, ori non insuavis. Folia illius vulnera conglutinant, & inflammationes, tumoresque discutunt.

Brassica marina. CAP. CXV.

Marina Brassica à sativa prorsus abhorret, quod folia ferat rotunda aristolochia longa, tenuia: singula à ramulis rubetibus exeunt, singulari ut hedera, pediculo. Albo succo prædita est, sed paucio, salso gustu, & aliquantum amaro, pingui concretu. Herba in totum stomacho inimica, acris: vehementissimè alium ciet in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carne.

Beta. CAP. CXVI.

Beta duorum generum est. E quibus nigra coquitur cum lenticula, ut ventrem sistat: quod magis radice eius præstatur. Candida albo vitilis est. Vtraque tamē propter nitrosum humorem, quem habet in se, noxij succi est. Unde succus earum, cum melle naribus inditus, caput purgat: aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radice, & foliorum, furfures lentesque deterget, permiones fotu mitigat. Crudis folijs vitiligines, nitro antea, perficillat, alopeciarum inanitates

scil

scilpello prius exasperatus: atque depascētia vl-
cera, illini prodest. Eruptionibus papularū, igni
sacro, ambustisq; cocta medetur.

Portulaca. CAP. CXVii.

Portulaca vis adstringit. Capitis doloribus,
inflammationibus oculorum, cateruq; cum
polenta imponitur: ardoribus stomachi, sacro
igni, vesicæ doloribus, auxilio est: cōmanducata
dentium stupores sedat: stomachi, & intestino-
rum astuationem, fluxionesq; mulcet: renes, &
vesicam adiuuat, etiam si erosionem sentiant:
veneris impetus excoluit. Succus epotus simili effe-
ctu prodest, in febribus valens. Contra teretes
ventris tineas, cruentem excreationem, dysente-
riam, hamorrhoidas, & profluvia sanguinis,
percocta efficax est: item contra sepius morsus.
Ocularibus medicamentis vtilissimè commisce-
tur: interaneis fluxione laborantibus, atq; vul-
narum erosionibus, infunditur: contra dolores,
quos astus excitauit, caput ex rosacedo, & oleo
fouetur: eruptiones papularū in capite, cum vi-
no emendat: vulneribus, quæ ad syderationem
spectant, ex polenta illinitur.

Asparagus. CAP. CXViii.

Corruda, siue syluestris asparagus, vulga-
ris est notitiæ. Huius cauliculi in cibo co-
cti ventrem emolliunt, urinam cient. Radicis
decoctum contra vrinæ difficultatem, regium
morbum, renū vitia, & coxendiciū cruciatus, in

potu proficit: cum vino autē, phalangiorū mor-
sibus auxiliatur. Si decocti succus super dento
contineatur. eius dolori medetur. Semen potum
ad eadem valet. Canes, vt aiūt, si decoctum bi-
bant, emoriūtur. Asparagum etiam nasci pro-
diderunt, arietis cornibus contusis, atque desof-
fis. quod quantum equidem sentio, planē à veri-
tate abhorret. † Altilis autē asparagus, mul-
eo Codice tis ramis fruticosa, folijs fœniculi, longis, nume-
hac ad syl rosiss: radice rotunda, grandi, spongiam habete.
nestrem Huius teneri cauliculi triti in vino albo, renum
quoq; a- dolores sedant. Assus autem, coctus uē, vrina
sparagū stillicidium, difficultatemq; ac dysenterias miti-
referun- gat. Radix cum vino, aut aceto cocta, luxatos
tur, nec artus mulcet. Decocta cū ficis, aut ciceribus, sum-
fit Altilis pta regiū morbū sanat: coxēdicis cruciatus, strā
mentio. guriāq; lenat. Alligata radix, aut haustu eius
decoctū, cōceptū adimit, & sterilitatem adfert.

ANNO TATIO.

† Licet in Græcis non planē cōstet, hic
altilis, vel satiuī asparagi mentionem fie-
ri: tamen non video, quomodo hæc ad syl-
uestrem quoque referri possint, vt aliqui
referenda censent. Cū enim hunc notū
esse antea dixisset Dioscorides, nō aliam,
vt solet, eius subiecisset descriptionem.
Quo fit, vt hæc potius ad satium referē-
da putemus, vel saltem mendum subelle
suspiciemur.

Plantago. CAP. CXIX.

Dvo Plantaginis genera. Mimor folia habet angustiora, minora, molliora, laxiora, & tenuiora: cauliculo anguloso, in terrā inclinato: floribus pallidis: semine summus caulibus emicante. Altera maior, latior, virentiorq; latis constans folijs, oleracei generis: cuius cauliculi altitudinē petit, angulosus, subruber, à medio ad verticem tenui semine, circumdatus: radicibus nititur teneris, hirsutis, candidis, digitum crassitudine aquantibus. Nascitur in lacunosis sepibus, & locis humidis. Multo vtilior magna est. Vim habet folia exiccatoriā, constringentē. Nec enim quare omnibus malignis vlceribus, et fluxioni opportunit, atque elephanticis, sordidisq; illita ter ad quā profunt, profluvia sanguinis, vlcera quae serpūt, bet olera epinyctidas, carbunculos, nomasq; cohibent: vterque vlcera, & inaequalia cicatrice obducūt, chironia sanāt: sinus conglutinant: morsibus canis, modū fambus igni, inflammationibus, panis, parotidibus, strumis, agilopijs: illita cum sale profunt. Plantagi Coctum cum a. eto & sale olus, dysentericis, cœnis refertur liacisq; sumptum subuenit. Datur & in locum possunt. beta cum lenticula coctum. & ad aquā intercutem, cui leucophlegmatia nomen est, datur & herba decocta post aridas epulas, sic vt media antecedat. comitialibus, & suspiriosis data proficit. Foliorū succus, colluta subinde oris vlcera, purgat: cū cimolia, aut cerusa igni sacro medetur.

tar: fistulis infusus prodest: lippitudinibus, & aurium doloribus idem succus instillatur. additur quoque in oculorum collyria. Gingiuis eruores suffusus, & sanguinis reiectionibus, potu confert: clystere dysentericis infunditur: contra tabem datur in potu: aduersus strangulationes vulua, in vellere subijcitur, etiā si vulua fluxione laboret. Semen ex vino potū alui fluxiones, & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix, & manducatu, & collutione, dentium dolores sedat: eadem cum folijs, vlceribus renū, & vesicæ in passio datur. Ferunt tres radices, cū tribus vini cyathis, & pari aqua modo, tertians auxiliari: & quatuor, quartans. Sunt qui radices gestamne, discutientes strumis vtantur.

Sium, seu lauer. CAP. CXX.

Sion in aquis inuenitur, frutice pingui, recto, folijs latius: olusatro similibus, sed minoribus, & odoratis. Quæ cruda, cocta q; esu, calculos rumpunt, atque excernunt: vrinas cient: menses, & partus extrahunt: dysentericis in cibo auxiliantur. De sio Cratenas tradit, herbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda maiora quàm mentha, nigra, & ad erucam accedentia.

Sisymbrium. CAP. CXXI.

Sisymbrium (aliq; serpyllum sylvestre vocat) in solo inculto nascitur, mentha hortensis simili

multitudine, odoratius, latiore folio. Inseritur
 coronis Calfaciendi vim habet. contra stillicidia
 vrinae; calculosq; semen ex vino bibitur: tormi-
 na, & singultus sedat. Folia in capitis dolore,
 fronti, aut temporibus illinuntur: item contra
 vesparum, apumq; ictus. Vomitiones potu colu-
 bet. Alterum sisymbrij genus, aliqui cardami-
 na, alij sion appellant. Ea herba riguis gaudet,
 & eisdem in locis, quibus sion, prouenit, quae ideo
 nonnullis cardamina nominatur, quod gustu
 cardamum, id est nasturtium representet. Folia
 primum rotunda prodeunt, adulta eruca modo
 finduntur. Id excaesat, vrinas mouet, crudum
 estur. Purgat lentigines, cutisq; vitia in facie,
 noctibus impositum, matutinisq; detractum.

Cathmum. CAP. CXXII.

Cathmum, seu, vt aliqui, Crithamon, fra-
 cticosa, & vndique foliosa herbula est, cubiti
 altitudinem ferè petens. Nasitur in maritimis, &
 petrosis: folijs pinguibus, numerosis, albicantibus
 veluti portulaca, latioribus, & longioribus, salso
 gustu: flores candidi sunt: & semen, ceu rosma-
 ni, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum
 rumpitur: habet intus tritici modo nucleum: ra-
 dices digiti crassitudine, tres, aut quatuor, gra-
 ti odoris, & iucundi. Radix, semen, & folia in-
 cocta vino, potu vrinae difficultati, et regio mor-
 bo auxiliantur: menses cient. Estur crudum, co-
 elumne in olere, seruaturn etiam in muria.

Coronopus. CAP. CXXIII.

• ἐγρωπί-
ρον. id est.
strata.

Coronopus oblonga herbula est, per ter-
ram strata, fissis folijs. Coquitur in ole-
re. Radicem habet tenuem, adstringentem, qua
in cibo celiacis facit. Prouenit in aggeribus, &
locis incultis, & secus vias.

Sonchus. CAP. CXXIIII.

• Vulgò
rostrū pō-
cinum.

Sonchi duo genera. Syluestrior quidā est, &
magis spinis horret. Alter teneritate qua-
dam mollescit, cibis expetitus. Caule costat an-
gulofo, † inani, interdū rubēte: folijs in ambiū
per interualla dissectis. Vtriusq; vis refrigerat,
modicè adstringit, vnde aestuāti stomacho, & in
flammationibus illiti prosunt. Succus eorū sto-
machi rosiones sorbitione mitigat: lac elicit. in
vellere appositus, sedis, ac vuluæ collectionibus
opitulatur. Tam herba, quā radix illita, vibra-
tis à scorpione ictibus subuenit. Alter sonchus
tenerior, arboris instar est, latis constans folijs:
caulem in remos exeuntem folia distinguū. sed
ad eadem pollet.

ANNOTATIO.

† Hæc dictio *νερός*, quæ vacuū, & inanem
significat, hic nō legitur in vulgatis Græ-
cis. Sed tamen eam habent vetusti codi-
ces, quibus etiam adstipulatur Oribasius.
Ergo non erit, vt aliqui putant, ex Plinio
duntaxat reposita.

dix efficit, si intincta succo acis, pilis admo-
 tur: contra vipersas in vino pota proficit. Succus
 decocta, in vino, aut per sese potus, aluum sistit.
 Aliud habetur chōdrilla genus, solū feris oblon-
 gum, circumrosum, humi sparsum: caulem succo
 madentē lacteo: radice tenui, rotūda, leui, vege-
 ta, flauiscente, succosa. Cuius & caulis, & folia
 concoquēdi vim habēt. Succus incōmodos palpe-
 brarū pilos refleclit. Nasitur in latis, & cultis.

Cucurbita. CAP. CXXVII.

Cucurbita esui apta. Cruda, trita illitu
 mores, & abscessus mitigat. Ramēta eius
 infantibus cōtra capitis ardorē, quā syriasi inuo-
 cant, in sinapite illuntur: oculorū inflāmatio-
 nes podagrasq; refrigerāt. Succus ē ramētis tussis
 per se, aut cum rosaceo insusus aurū doloribus
 auxiliatur: adustiones cutis in ardētī febre illitu
 adiuvat. Totius feruesacta, & expressa succus, cū
 melle exiguo, & nitro potus, aluū leniter resol-
 nit. Vinū in cucurbitā recētē excavatū, insusū,
 si mistū sub duo teneatur, potū aluū lauigabit.

Cucumer sativus. CAP. CXXVIII.

Sativus Cucumis alio, & stomacho perquā
 vtilis habetur: refrigerat, quæ corruptionem
 non sentit: vesicæ prodest: olfactu renocat, quos
 animus liquerit. Semen modicē urinam mouet:
 cū lacte, aut passo, vesicæ exulcerationibus sub-
 venit. Illita cum vino folia, morsus canum sa-
 nant: & epinyctidas, cum melle. Pemonis caro

in cibis, vrinam cit: inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra aduersionē infantium, quam syriasin vocant, sinicipiti imponuntur: frōti ad mota oculorum fluxiones auertunt. Succus cū semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, quae faciē repurgāt, & nitorem asserunt. Radix sicca, & ex hydromelutē pota, drachmæ pondere, vomitionem mouet. Siquisquam moderatē secundū cōnā vomere cupiat, geminis abolū sit contentus. Sanat quoque illita cum melle, vlcera concreta in modum faui, quæ ceria vocant.

Lactuca. CAP. CXXIX:

Lactuce satina, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho grata habentur, somnum conciliant, aluū emolliunt, lac euocant: verū decoctæ magis alunt. Stomachus illotas esse prodest. Epotum semē, assiduas libidinum imaginationes in somno compescit, & veneri refra-gatur. Ipse verò frequentiores in cibo, clarit. it i oculorum efficiunt: inflammationibus, & ignibus sacris opitulantur. Muria conduntur. Cū in caulem exierunt, vim quandam nanciscuntur succo, aut lactis syluestris lactuca similem.

Lactuca syluestris. CAP. CXXX.

Syluestris Lactuca satina similis est, sed longior caulis, & cādidiora folia, graciliora, & asperiora. Amaro gustu est, & viribus aliquā-
en papaveri similis: unde lacteū eius succu ali-

qui

qui meconio permiscuerūt. Aquam per aluum elicit, potus in aceto mulso succus ad duos obolos: argema, caliginemq; repurgat: contra adustiones efficaciter illinitur, cum lacte mulierum. in summa somnum allicit, doloris leuamentum prestat, menses trahit: cōtra scorpionū, & phalangiorū ictus bibitur. Semē nō aliter quā satiuā libidinū imaginatiōes in somno amolitur, at uenerē arceat. Succus ad eadē valet. sed viribus infirmior. Reponitur in fīchili nouo lac eius, antea, vt in alijs liquaminibus moris est, insolatū.

Gingidium. CAP. CXXXI.

Gingidium, aliqui lepidion. in Syria, & Cilicia plurimum nascitur. Herbula est syluestri pastinaca similis, tenuior, & amarior: radice parua, candidate, sub amara. Olus hoc crudū, coctū, conditū uel estur, magna stomachi utilitate: vrinam cit. Decoctum ex vino potum uel siccā prodest.

Scandix. CAP. CXXXII.

Scandix, syluestre olus est, amarum, subacre: quod crudum, coctū uel mādatur: stomacho, & ventri utile. Decoctum in potu, vesicae, renibus & iecinori confert.

Caucalis. CAP. CXXXIII.

Caucalis, quam alij syluestre daucum vocāt, cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhirsuto: folijs apio similibus, sceniculi modo per extrema multifidis, hispidisq;: candida in cacumi-

ne umbella, suauiter olente. Crudum, coctum velerum modo estur: urinam mouet.

ERUCA. CAP. CXXXIII.

CRUDA eruca venerē largiore cibo cōcitatur. Semen eius idem præstat, urinam cit. Concoctioni prodest, aluo perquam accommodata. Semine ad condimenta vtuntur: quod, vti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte, aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiānum syluestris eruca, maximè in Iberia, quæ occidentem spectat. Cuius semine pro sinapi incolæ vtuntur. Urinam vehementius pellit, & multò satina acrior.

OCIMUM. CAP. CXXXV.

OCIMUM vulgò cognitum, id copiosiore cibo oculorum aciem hebetat, aluum molit, spiritum mouet, urinam pellit, lac euocat, ægre tamen conficitur. Illitum cum pollina polente, aceto, & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est. Draconis marini, & scorpionis iclibus per se prodest: & cum vino Chio, oculorum doloribus. Succus visus caliginem abstergit: destillationes exciccatur. Semen potum conuenit atram bilem gignentibus, difficili urina, inflatisq; naribus haustum, subinde mouet sternutamenta, quod idem herba efficit. Sed oculos premi necessum, cum sternutamentum vrget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant: quandoquidem manducatum, & in sole positum vermicu-

los creat. Aphri autem adiiciunt, si feriantur à scorpione, qui occimum ederint, nullo conficliari dolore.

Orobanche.

C A P. CXXXVI.

Orobanche cauliculus est sesquipedalis, & interdū maior, subrubet, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, aut in luteum vergente: radice digiti crassitudine, & cū ariditate flaccescit caulis, fistulosa. Hanc inter quadā legumina nasci constat, & ea strangulare: unde orobanche sibi cognomentū vsurpauit. Estur, vt olus, cruda, & in patinis, asparagi modo, de cocta. Legumentis addita, concoctionem accelerare creditur.

Barbula hirci. C A P. CXXXVII.

Barbula hirci, quæ ab alijs come vocatur, breui est caule: folijs croci: radice longa, dulci: magno super caulem calyce: è cuius summo semē nigrum dependet, vnde nomen inditum est. Herba esui apta est.

Ornithogalum. C A P. CXXXVIII.

Ornithogalum cauliculus est tener, candidus, tenuis, sesquipedalis, aut quatuor in cacumine molibus adnatis: à quibus flores prodeunt foris herbaces, et cū hiantes se pandunt, lactei visuntur: inter quos dissectum, cachryos modo, capitulum emicat. Coquitur cum pane, vt melanthium. Radix bulbosa, cruda, & cocta manditur.

Tubera.

Tubera. CAP. CXXXIX.

Tubera rotunda radices sunt, sine caule sine folijs, flauescences: vere sodiuntur. Cruda, & cocta eduntur.

Smilax hortenſis. CAP. CXL.

Hortenſis Smilax frutex eſt, cuius ſemē à nonnullis lobia vocatur. Folia habet hederæ, molliora tamē: tenues caules, & capreolos vicinis fruticibus circumuolutos: qui tantū adoleſcunt, vt topiarias ſcenas repræſentare videantur: ſiliquas ſæni graci proſert, longiores, & torroſiores: in quibus ſemina renum ſimilia, ſed inæquali colore, recluduntur: quæ quadam ex parte fulueſcunt. Siliqua cocta, cum ſemine in oleribus aſparagi modo eſtur. Vrinā ciet, & tumultuoſa ſomnia facit.

Medica. CAP. CXLI.

Medica, cum recenter prodyt, folijs & caule trifolio pratenſi ſimilis eſt: procedens verò folia contrahit, caules edens trifolij, & ſiliquas corniculorū modo intortas, in quibus ſemen lentis magnitudine dependet. Id ſiccatur, iucundi ſaporis gratia, conditaneò ſali adm. ſcetur. Viride, quibus refrigeratione opus eſt, illius ſuffragatur. Herba tota pro gramine vtuntur, qui pecora alunt.

Aphaca. CAP. CXLII.

Aphaca ī arvis naſcitur, alior lēte, tenuib⁹ folijs: ſiliquas lētigula maiores fert, in qui

bus terna, quaternave semina nigra, lente minora, continentur. Quae adstringendi vim habent. quare torrefacta, stomachi, aluiq; fluxiones sistunt, si fresa lentis more decoquantur.

Porrum capitatum. CAP. CXLII.

CApitatum porrum inflationem facit, noxiū succum creat, tumultuosum somniū parit, urinā ciet, aluo accommodatur, extenuat, oculorum aciem hebetat, menses pellit: sed ladit exulceratam vesicam, renesq; cum ptisana verò coctum, esu pectoris vitia extrahit. Coma, eius in aqua maris, & aceto cocta, in defectionibus ad praeclosurenes vulvae & duritias, utilis habetur. Porrum bis aqua mutata coctum, tum frigida maceratum, dulcescit, & multò minus inflat. Semen acrius est, & quandam adstrictoriā vim habet. quare succus cum aceto, addito thure, aut manna, sanguinis profluvia sistit, maxime si uaribus erumpat. Venerem stimulat: contra omnia thoracis vitia, tabemque, pro delinctu efficax est: arteriam esu purgat: sed si assidue estur, visus obscuritatem inducit: stomacho aduersatur. Succus ex male potus, aut illitus, contra bestiarum morsus auxilio est. Ipsum quoq; cū aceto aut thuris polline, lacte aut rosaceo utilis auris doloribus, et sonitui instillatur. Varos tollunt folia illita cū rhoē, quae ad obsonia vertuntur: epinyctidi medentur: crustas ex sale illita rumpūt. Veteres sanguinis resectiones cohibent.

sema.

feminis drachmæ binæ, cum æquali baccarū myr-
ti pondere potæ.

Ampeloprasum. CAP. CXLIII.

Ampeloprasum stomacho magis, quā por-
rum aduersatur: plus autem excalfacit:
urinam, & menses vehementius ciet. Id contra
serpentium morsus esse conuenit.

Cæpa. CAP. CXLV.

Cæpa longa acrior est, quā rotūda, itē,
flaua quā candida, & sicca quā viri-
dis, & cruda quā viridis, & cruda quā co-
cta, aut sale condita. Omnes tamen mordent, fla-
tus gignunt, appetentiam inuitant, sitim mo-
uent, & extenuant, fastidium pariunt, & ex-
purgāt: aluo vtilis sunt. Ea detraclis purgamē-
tis in oleū coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosque
excretionum exitus referant, subditæ pro bala-
nis. Succus cum melle illitus, oculorum hebetu-
dinibus, argemis, nubeculis, & incipiētibus sus-
fusionibus auxiliatur: angina eodem perungū-
tur: suppressos menses pellit: caput purgat, na-
ribus infusus: canis morsibus cum aceto, ruta, &
melle illinitur: cum aceto autem perunctas in
sole vitilignes sanat: & cum pari stōdio, sca-
bras lippitudines sedat: varios cū sale reprimat:
contra calceamentorum attritus, cum gallina-
teo adipe vtilis est, citæ aluo prodest: in auribus
sonitum: ac gravitatem emendat: ad purulētas
aures, & eliciendā earundē aquā, valet: alope-

cia earum succo perfricantur, qui celerius quā alcyoniū pilos euocat. Largiore cibo cepa capitū dolores ciēt, coētaq; vehementius vrinā pellit: eos lethargios efficit, qui valetudinibus aduersis, ea et iam coēta, plus a quo vescantur. elixa, & cum passis vuis, & fico illita, tubercula concoquit, & celerrimè rumpit.

Allum.

CAP. CXLIII.

Allium quoddā satiuū, atque hortēse habetur. quod in Aegypto, singulari vt portum, capite constat, dulce, in purpureum vergis, parū: reliqua verò magna & candida, ex pluribus coagmentantur nucleis, quos aglitas, id est spicas, Graci nomināt. Aliud est syluestre, qđ ophioscorodō, id est anguinū, vocat. Vis aly acri est: excalfacit, mordet, excernit, aliu turbat, inflatiōes facit, stomachū exiccat, sitim gignit, flatum permouet, summā corporis cutē exulcerat: acie oculorum esu hebetat. Eosdē effectus prabet anguinū, qđ & elaphoboscorodō dicitur: latas ventris tineas in cibo sumptū abigit, vrinas detrahit: cōtra viperarū ictus, & priuatim hamorrhoi, prodest, ita vt nō aliud magis, sicū vino ingiter assumatur, aut tritū in eodē ebibatur: cōtra rabiosorum morsus, & illitu, & cibo valet. Magna & allio vtilitates cōtra aquarū mutationes: vocē clarificat: veterem tu sūm crudū, coēctūm velenit: potum autē cum origani decoctio, pediculos, & lendes enecat: cremati unguis illitus

suillus

suggillationibus cū melle, & alopecijis cū nardio vnguine, medetur: eruptiones papularū cum alo, & sale sonat, vitilignes, lichenas, lentigines, vlcera capitis manatia, lepras, & fursures, cum melle eximit: cum thure, & teda decoctum, dentium dolore leuat, si in ore cōtineatur: cōtra venenatos muris aranei morsus, cū ficulneis fīōdibus, & cumino illinitur Feruesacta coma ius, scaminum defestationibus additū, menses, & secundos partus extrahit. Allium eiusdem gratia suffitur. Factum ex eo, & nigra oliua intritū, quod myttoton vocant, esu cit vrinam, ora venarum patefacit, hydropicis vtile.

Scorodoprasum. CAP. CXLVII.

Scorodoprasum magnitudine porrū aequat, Squalitatum porri, & allij particeps. Vnde promiscuas sibi vires ex vtroque vēdicauit, effectus allij, & porri præbēs: inefficacius tamē. Coctū, porri modo, dulcescit, & in olerū vicē trasit.

Sinapi. CAP. CXLVIII.

Sinapi hortense, aliqui napi vocāt. Eligi debet adultum, valdē rufum, non magnopere sicum, sed quod fractum internè virescat, & re-luti quodā succo madeat, casum colore: siquidē recens id genus, tēpestiuū habetur. Ad calfaciēdum, extenuandū, extrahendū, efficax est. Ad eliciendam capitis pituitam manditur: contra pradueros tonsillarum tumores, ac veterem, callosamquē arteria scabritiem, succus ex aqua,

Et melle conuenienter gargariZatur: sternuta
 menta ciet, tritum, Et naribus admotum, comi
 tialibus quoq; auxiliatur: fœminas vulua stran
 gulatu oppressas exitat: letargicis, derafo capite
 illinitur. Cum fîcis admistum donec rubescat
 locus, Et ad coxendicum cruciatus impositum:
 ad lienes, Et omne genus dolores confert, cū per
 mutandæ valetudinis causa ex alto vitia extra
 henda sunt: alopecijis illitum medetur: faciē pur
 gat: sugillata cū melle, adipe, aut cerato rapit:
 fera impetigines, Et lepræ, eo cum aceto perug
 tur: contra februm circuitus aridum bibitur,
 aut potui, polenta modo inspargitur: extrahen
 tibus emplastris, scabiemq; extenuantibus: uti
 liter admisceri solet: tritum gravitati aurium,
 Et sonitui cum fîco impositum prodest. Succus
 ad hebetudines oculorum, Et genarum scabri
 rias magna vtilitate illinitur. Expressus recen
 ti semine succus in sole siccatur.

Nasturtium. CAP. CXLIX.

Nasturtium optimum constat esse Babylō
 nicum. Omnium semen est acre: excalsa
 cit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tineas
 excutit, lienem imminuit, partus exanimat,
 menses cit, venerem stimulat, sinapis, Et eruca si
 mile intelligitur: lepras, Et impetigines abster
 get. Illitum cum melle lienem extenuat, fauos
 expurgat, pulmonum vitia extrahit, sorbitio
 nibus incoctum: serpentium venenis potum resi
 stit.

fit, atque eas suffitu fugat, capillorum dafluvia
cohibet: carbunculos ad suppurationem perdu-
cit, & rumpit: coxendicibus cum polenta cōmo-
dè ex aceto illinitur: tumores, collectionesq; di-
scutit: emitit furūculos illitum cum muria. Her-
ba ad omnia eadē effectus, licet minor.

Thlaspi.

CAP. CL.

Thlaspi herbula est angustis folijs, digita-
li longitudine, in terrā versis, suppingui-
bus: binum dodrantum cauliculo, tenui, non si-
ne ad nascētibus rumis: fructu circa ipsum totū
ab extremo in latius se pandēte: semine nastur-
tij, incluso vasis in cacumine diuisis, † letericu-
la effigie, nisi quod infringitur: vnde nomē acce-
pit. flos albicat. Nasctur in semitis, & sepibus
fossisq;. Semen asperi gustus excalfaciens: bilem
vtrinq; extrahit; potum acetabuli mensura:
pdest ischiadicis infusum: sanguinē potu educit,
internas suppurationes rumpit: menses ciet, sed
partus enecat: Alterū thlaspi tradit Crateuas,
quod aliqui Persicon sinapi vocāt, latis folijs ra-
dicibus magnis vtile ischiadicorum infusioni.

*Διονος
Δός, id est
disci figu-
ra.*

ANNOTATIO.

† Hoc loco Ruellius legisse videtur *φασ-
κος*, quod verterit lenticulæ effigie: nec
temerè, quod Thlaspi semen illi pulchrè
respōdeat. Verū vulgati Græci codices
habent *Διονοειδής*, hoc est, disci figura.

Arabis, siue draba: CAP. CLI.

us

Draba

DRaba herba ad cubiti altitudinem assurgit: tenuesspargens ramos, & ex vtroque latere folia, ceu lapidij, sed meliora, & candidiora. In cacumine verò sambuci umbellam gerit, candidos flores habentem. Herba hac cum pista-
na coquitur: in Cappadocia maximè. Semē autem pro pipere obsonijs miscetur.

IRIO. CAP. CLII.

ERysimon, Latini Irionē vocāt, iuxta vrbes, Erudera, hortosq; nascitur: folijs eruca syluestris: cauliculis in lori modū lētis, & obsequiosis: floribus luteis: siliquis in cacumine gracilibus, ut fœno greco, corniculatis: semine nasciturq; exiguū vrentis gustus. Contra thoracis fluxiones efficacax est, & si purulenta extussumtur: regi morbo, & coxendicibus prodest: cōtra venena in delinctu cum melle datur. Illinitur ex aqua, aut melle vtiliter cecis carcinomatus, parotidibus, duritijs māmaram, & testium inflammationibus. In totū extenuat, & excalfacit. Mitius multo ad clysteres fiet, si aqua madescat, atq; torreatur vel linteo illigatū pinsita farina oblitū perasset.

PIPER. CAP. CLIII.

PIper in India nasci, breui arbore traditur: quæ inter initia, pralōgū fructū, veluti siliquā, promit, quod longū piper est: habet intus aliquid tenui milio simile, quod tandem in perfectum piper euadit. Id autem suis temporibus delihescens, pandensq; sese, racemos emittit, grana si

naferentes qualia videmus. Ea acerba candidū
 piper faciunt, aptum ocularibus remedijs, anti-
 dotis, & medicaminibus, quæ contra venenata
 parantur, theriaca vocant. Longū verò rehemē-
 tius mordet: & quoniā priusquā ematuref-
 cat, decerptum est, subamarū relinquitur, anti-
 dotis, & theriacis medicaminibus expetitū. Ni-
 grū verò, utpote quod tēpestina maturitate col-
 lectu sit, odoratū esse constat: candido suauius, &
 crius, & ori gratius, necnon ad condimenta
 vtilius, sed candidum, & adhuc in acerbū ver-
 gens, antè dictis infirmius est. Eligi oportet gra-
 uissimū, plenum, nigrū, sine multis rugis, recens,
 ac minimè surfurosu. Inueniuntur etiā in ge-
 nere nigri semina nutrimento defecta, cassa, ina-
 nia, minimiq; ponderis, quod vocant brasma.
 Vis omnium excalfacit, urinam ciet, concoquit,
 extrahit, discutit, absterget caliginem, quæ ocn-
 lis obuersatur. Piper febriū horroribus circuitu
 repetentibus, siue potu, siue illitu subuenit: serpē-
 tiū morsibus auxiliatur: partus extrahit: conce-
 ptum adimere creditur, statim à concubitu sup-
 positum: tussi, omnibusq; pectoris vitijs, siue ecle-
 mate, siue potu succurrit: āgina eo, & melle cō-
 nienter parguntur: potum cum recentibus
 lauri folijs, tormina discutit: cum vna pas-
 sa manducatum, pituitam à capite elicit: va-
 letudinem tuetur, dolores finit, appetentiam
 mouet, concoctionem adiuvat, ad intinctus esca-
 leu

lentorum additum: strumas cum pice discutit: vitilignes ex nitro emaculat. Fictili nouo, ut aiunt, motum torretur. Non est huius arboris radix ginger, ut aliqui existimauere, sicuti paulo post ostendemus. Nanq; piperis radix costo similis est, ora gustantium accendit, saluam ciēt. Hac lienem reprimat, cum aceto illita, aut pota: caput etiam purgat, manducata cum semine pedicularis herbae, quam staplidem agriam vocant.

Ginger. CAP. CLIII.

Ginger sui generis planta est, in Trogodytica Arabia magna ex parte nascens. Qua virente ad multa, perinde atque nos ruta, utuntur, & primis potibus, & edulys admiscunt. Huius radices, cyperi modo, paruae sunt, candidantes, & odoratae, atque piper sapore imitantur. Eligi debet, quae teredines non nouerit. A multis tamen ob id condiuntur, quod celeriter cariem sentiant: & fictilibus in Italia asportantur. Ginger cibo conueniens est, & cum condimento assumitur. Excalscacloriam vim, & excoquentem habet: aluum leniter emollit: stomacho utilis est: efficax aduersus ea, quae oculis caliginem offundunt. in antidota addi solet. In summa, piperis viribus respondet.

Hydropiper. CAP. CLX.

Hydripiper apud aquas nascitur, quae stagnant, aut pigro lapsu repunt. Cau-

lem edit geniculatum, solidum, multis alis concavum: folia menthae, maiora, molliora, candidioraq; gustu piperis, acri, citra tamen ullam odoris gratiam: fructum acrem, in surculis parvis, prope folia racematim coherentem. Folia cum semine illita tumores, veteresq; duritias discutiunt, sugillata delent: quae postquam inaruerunt, tussa pro pipere in obsonijs admiscuntur. Radix parva, nullius in medicina usus.

Ptarmica. CAP. CLVI.

Ptarmica exiguus frutex est, surculos habens paruos multos, & rotundos, abrotano non dissimiles: & circa eos folia olea, longa, multa: & in cacumine capitulum, uti anthemidis, parvum, rotundum. quod suo acri dolore sternutamentum excitat, unde nomen accepit. Folia cum floribus illita, sugillationes rapiunt. Flores sternutamenta efficacissime movent. nascitur in montibus, & petrosiss.

Radicula, seu lanaria herba.

CAP. CLVII.

Struthium herba vulgo nota: qua purgandis lanis utuntur, qui eas eluunt. Huius radix est acris, urinam ciet: prodest tussis, iocinerosis, orthopnoeae ex melle sumpta, cochlearis mensura, aluum solvit. Eadem cum panace, & caparis radice, calculos frangit, & cum urina exturbat: duritiam lienis assumit: menses imposita trahit: partus efficaciter enecat. Cuius polenta.

et autem, & aceto illita, lepras tollit: tubercula discutit, cum farina hordeacea, & vino decocta. Miscetur & malagmalis, & ocularibus collyrijs, claritatis causa. Sternutamenta mouet: per os purgat, trita cum melle, & naribus infusa.

Cyclaminus. CAP. CLVIII.

Cyclaminus folia habet hederae, purpurea varia, in quibus supra infraque albicant maculae: caule nudo, quaternos digitos aequante: floribus in eo purpureis, rosarum effigie: radice nigra, & aliquantum lata, ut rapum videri possit. Quae cum hydromelite pota, pituitam, quamque detrahit: menses potu, appositum ueniet. Tradunt, si pragnans radicem transgrediatur, abortum fieri, partum appensa auclerat: contra venena, praesertim leporis marini, ex vino bibitur: illita contra serpentium ictus remedio est: immista vino inebriat: regium morbum discutit, tribus drachmis pota, cum passo, aut diluto mulso. Sed oportet eum qui ebibit, multis vestibus contextum, loco calido, & a persiciationibus tuto recumbere, quo facilius exudet: ex illi autem sudores felles colore inueniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur, ad deicienda quoque alui extremamenta, in uere sedi subicitur: illito umbilico, & in uentre coxarum tenus, aluum emollit, & abortum efficit: suffusionibus, & retusa oculorum aciei, blutus cum melle succus prodest. me

medicamentis abortiū inferentibus admiscetur. Succus cum aceto illitus, prociduum sedem restituit. Exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat, eruptiones papularū reprimi: vulneribus ex aceto per se, aut cum melle medetur, lienē absumit, vitia cutis in facie, et alopecias emendat. Eius decocto luxata, podagras, & capitis vlcusculi, pernionesq; foveri congruū est: ipsaq; in oleo vetere seruesacta, illito oleo vlcera ad cicatricem perducit. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum Tyrrhenica cera momēto, vt strigmenti crassitudinē vnguentum contrahat, cū primis vtile pernionibus. Radix, scilla modo, concisa reponitur. Narant, ad amatoria assumi contusam, & in pastillos diuisam. Nascitur in vmbrosis, maximē sub arboribus.

Altera cyclaminus. CAP. CLIX.

Est & altera cyclaminus, quam cissanthemō aut cissophyllon vocant: folijs hederæ, sed minoribus: geniculatis caulibus, crassiq; circa vici-
nas arbores, capreolorū modo se voluētibus: flore cādido, odorato: acinis hederæ mollibus, lēti gustus, aliquantulū acris: radice supernacua. Nascitur in asperis. Huius acini, drachma vnus ponere potest, cū vini albi cyathis duobus quadraginta diebus, lienē p̄ vrinā, et aliu absumūt: ad orthopnœam bibitur: reliquias à partu purgat.

Dracm

Dracunculus maior. CAP. CLX.

Dracunculus maior in umbrosis circum
 septa, gignitur. Caulem habet rectum,
 leuem, duum cubitorum, baculi crassitu-
 dine, versicoloribus draconum maculis, purpu-
 reis tamen euinentibus: folia rumicis, sibi inui-
 cem implicita. Fructum summo caule facit, rate-
 mosum, coloris primum cineracei, mox per ma-
 turitatem in crocum, & purpuram vergentiu
 radicem pregrandem, rotundam, candidam, cor-
 tice tenui vestitam. Colligitur, dum maturescit
 & succus exprimitur, siccaturq; in umbra. Ra-
 dix quoque messibus effoditur, elotaq; particu-
 latim conciditur, & funiculo transfixa siccatur
 in umbra. Vis ei calfaciendi cum diluta vini po-
 tione. Crudam, coctamve cum melle delinxi pro-
 dest contra orthopnceas, rupta, conuulsa, tuſim,
 & destillationes. pota cum vino venerem stimu-
 lat: vlcera, quæ cacoethe vocantur, atque ap-
 pagedenica expurgat, præsertim cum vite alba.
 ex ea, & melle collyria ad fistulas, & partus tuo
 cãdos cõponũtur. ad vitiligines cũ melle, efficaci-
 ter illinitur: polypos, & carcinomata absomit.
 Succus ad oculorũ medicamẽta, itẽ cõtra nubecu-
 las, caliginẽ, albuginesq; effectũ p̃bet. Herba, ra-
 dicisq; odor teneros cõceptus abortu vitiat, itẽ si
 triginta grana eius in posca bibãtur. Sunt qui
 ius succũ cũ oleo, aurĩũ doloribus insũdere: quin
 etiã folia, utpote q̃ adstringãt, vuluerib. resicib.

Imposuere. & cocta in vino pernionibus. Qui folia manibus affricuerit, aut radicem eximerit, posse à vipera feriri inficiantur.

Dracunculus minor. CAP. CLXI.

DRacunculus minor folio constat hedera-
ceo, magno, candidis notis insigni: caule
recto, bicubitali, versicolore, maculis resperso
purpureis, ita vt anguem planè referat, baculi
crassitudine: fructus summo caule racematim
coheret, colore primum herbaceo, & cum ema-
turuit, croceo, gustu feruens, mordaxq; radice a-
liquantulum rotunda, bulbosa, aro non abssi-
mili, tenui obducta cortice. Nascitur in sepibus
vmbrosis, Seminis succus cum oleo instillatus, au-
rium dolorem mitigat: naribus etiam ex
lana impositus, polypum absunit: carcinomata
illitu sistit: triginta eius grana, si in posca bibā-
tur, abortus inferunt. Odorem aiunt, postea
quàm flaccidi flores emarcuerunt, conceptus ad-
huc teneros enecare. Radix excalfacit: orthopnoe-
is: ruptis, vulsis tussi, destillationibus auxilia-
tur: humores pectoris excreatu faciles reddit, siue
cocta, tostaq; cum melle, aut per sese edatur, siue
vrina eius ex melle delingatur. vrinam pellit,
venerem excitat, cum vino pota phagedanas vl-
cerum, & quæ cacoethe vocantur, trita cum
melle, & bryonia alba expurgat, & ad cicatri-
cem perducit: colliria ex ipsa ad fistulas, & eij-
ciendos partus fieri solent: qui radice suas ma-

nus perfricuerunt, à viperis feriri negatur: illita ex aceto vitilignes emaculat. Folia recentibus vulneribus linamentorum vice, conuenienter imponuntur: decocta in vino pernionibus appo-
suisse prodest. Caseus folijs inuolutus, à putredine defenditur. Succus radicis ad nubeculas, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cocta crudave, ad sanorum vsus, pro olere recipitur. In Gymneshs insulis, quæ Baleares vocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiuijs placentarum loco offerunt. Radix mēsis effoditur, lotaq; frustatim comiditur, & ligno traiecta, siccatur in vmbra, & ita reconditur.

Arum. CAP. CLXIII.

ARON apud Syros lupha vocitatum, folia emittit dracunculi, sed longiora, & paucioribus distincta maculis: caulem suppurpureū, dodranta'lem, pistilli specie, à quo croceum semen exit: radice dracunculi alba. quæ decocta estur, vt pote cum minus acris sit. Folia ad esum condiuntur, & arida per se decocta manduntur. Radix, semen, & folia dracunculi vires habet. Priuatim radix ex fimo bubulo podagris illinitur. & dracunculi more reponitur. In totum, ob mitiore eius acrimoniam, in cibū expetitur.

Arisarum. CAP. CLXIII.

ARISARUM exigua herbulæ est: cuius radix oleæ magnitudinem implet, longè maiori quàm aron acrimonia. Vnde illitu nomas sistit.

Fiunt

Fiunt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. Illitu radicis, genitale animalis cuiuscunque in perniciē agitur.

Hastula regia. CAP. CLXIIII.

HAstula regia vulgaris notitia est: folijs maioris porri: caule laui, ferente in cacumine florem, quem anthoricon appellant: radices subiacent, oblongae, rotundae, glandibus similes gustu acres. Quae excalfaciunt: vrinas, & menses epota ciunt: lateris doloribus, ruptis, cōuulsis, & tussibus, drachma pondere pota ex vino medentur. Ea verò vomitiones adiuuat, ludicri tali magnitudine cōmanducata: à serpente demorsis datur aptissimè, triū drachmarum pondere, verum folijs, floribus, & radice ex vino morsus illinire oportet: item vlcera sordida, & depascentia, māmārū quoque, et testiū inflammationes, tubercula, furūculosq; decoctis in face vini bulbis, recētibus tñflāmatioibz ex polēta auxilia tur. radice succus adiecto vetere vino dulci, myrrha, et croco decoquitur. fitq; perquā vtile oculis medicamētū: ad purulētas aures per se, et cū thure, melle, vino, et myrrha tritus, pdest: incōtrariā aurē infusus, dentiū dolorē mitigat. Cinis è radice illitus, alopecias ad pilū reducit, oleū in excarnatis radicibus igni decoctū, illitu exulceratis pmonibus, et ābustis igni, cōducit: et surditati instillatū in aurē auxiliatur. Candidā vitiliginē, linseo atēa perfrictā in sole illita radix emēdat.

Semen, floresq; in vino poti, scolopendra, & scorpionum venenis, mirum immodum resistunt: aluum purgant.

Bulbus esculentus.

CAP. CLXV.

Esculentus bulbus vulgò cognitus, à nobis sur. Stomacho, et alio utilis rufus, qui ex Aphrica desertur. Amarus verò. & scillinus, stomacho aptior est, et concoctione adiuuat. Bulbi omnes atrimoniam habent, excalfaciunt, venere stimulant, linguam, tonsillasq; exasperant multum alimenti præbent, carnes creant, inflationem pariunt. luxatis, fractis articulorum doloribus efficaciter illinuntur: spicula extrahunt: gangreas, & podagras ex melle, aut per sese hydropicorum tumores, & canum morsus cum melle: & piperis polline illiti cohibent: sudores compescunt: stomachi dolores mitigant: furfures, & ulcera, quæ in capite manant, cum tostio nitro abstergunt. sugillata, varosq; per se, aut ex oui luteo, & lentigines cum melle, vel aceto emendant: fractis auriculis, vnguibusq; ex polenta medentur. Idem calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: item cum cinere è manarum capitibus, impositi. Cremati verò, & cum alcyonio misti, vitia cutis in facie, atrasq; cicatrices, in sole illiti emaculant. faciunt adrupta, si cum aceto costli edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinentium, quoniam nervos tentat.

Bul

Bulbus vomitorius. CAP. CLXVI.

Bulbus, quem vomitorium vocant, folia habet lentiora multò, & longiora quàm bulbus esculentus: radicem similem, cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctum eius potum vesica malis medetur: vomitiones mouet.

Scilla. CAP. CLXVII.

Scilla vim acrem, atque feruentem habet. assatam ad multa vtiliorem esse constat. Polline ad crustam subactò, aut luto oblita, in clibanum conijcitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficienter intosta fuerit: quæ exempta, si non emoleseat, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius, fiunt: nam quæ ita non assatur, interaneis maximè noxia est. Torretur item in olla, indito operculo, quæ in furnum demittatur. Sumi etiã solet quòd maximè est medium, direptis viuòtenus tunicis, quod frustatim cõfectum coquitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinem, nec acrimoniam habeat: traiectaq; lino frusta siccantur in vmbra, ita vt ne vlla quidem parte se contingat. His scillæ seminibus ad oleũ vinum aut acetum scillinum vtimur. Ad rimas pedum, interna pars cruda scilla in oleo feruesacta, aut cum resina liquefacta, imponitur. decocta in aceto demorsis à vipera, cataplasma est. Ad singulas asse partes abiectis octonis tosti salis cochlear vñ, aut alterum damus ieiunii, ad

emolliendam aluum : in potu autem , & odoratis medicaminibus , & quibus urinam ciere volumus , hydropicisq; , & stomachicis , quibus in natat cibus , regio morbo , torminibus , in tussi vetere , suspiriosis , & ore reijciētibus , tres obolos in delinctu ex melle sumpsisse satis est . Coquitur cum melle , & estur eorundē gratia , maxime vt concoctionem adiuet : strigmenta per aluum extrahit . Cocta , & simili sumpta modo , eosdem præbet effectus : sed cauēdus scillæ vsus his , qui intestinū sentiūt vlcus . ad pensiles verrucas , & perniōnes , tosta efficaciter illinitur . Tritū semē , & in carica , aut melle deuoratū , aluum emollit , Scilla tota in limine ianua suspensa , mali medicamento noxam arcet .

Pancratiū . CAP. CLXVIII.

PAncratiū , quod aliqui scillam appellāt , radice est magni bulbi , subrufo colore , aut suppurpureo , gustu amaro , ac seruēte , folijs lilij , sed longioribus . Scillæ vires , & præparationē habet , eodēq; pōdere in morbis efficaciter assumitur : cui tamē mitior , quàm scillæ facultas inest . Radicis succus cum erui farina digeritur in pastillos , qui hydropicis , splenicisq; cum hydromelite , commodissime dantur .

Capparis . CAP. CLXIX.

CApparis auculeatus frutex est , qui in terra stratus magis in orbē euagatur . Spinas , ut rubus , habet in hami modū aduncas : folia mali

cotonea, rotunda: fructum olea similem, qui cum
dehiscens panditur, florem candidum promit:
quo excusso, nonnihil glandis oblongæ figura
inuenitur, quod apertum grana acinis punico-
rum similia ostendit, parua, rubicunda: radices
lignosas spargit, grandes, numerosasq;. Tenui
plerunq; solo, asperisq; locus, in insulis, & iuxta
rudera nascitur. Caulis, & fructus, cibi gra-
tia condiuntur. aluum turbat, stomacho aduer-
satur, sitim gignit: cocta tamen stomacho,
quàm cruda vtilior est. Fructus drachmis dua-
bus in vino potus, quadraginta diebus, lienem
absumit, & urinam, cruentumq; excrementum
emittit: bibitur vtilissimè in coxarum dolori-
bus, & nervorū resolutione, item ruptis, et con-
uulsis: menses ciet, caput purgat. Dentium dolo-
rem sedat semen ex aceto decoctum, colluto inde
ore. Aridus radices cortex ad eadem proficit: vl-
cera omnia vetera, & sordida, & quæ occallue-
runt, expurgat: lienosis cum farina hordei illini-
tur: dēte demorsa: dolori eius auxiliatur: cū ace-
to trita, vitilignes albas absterget. Radix, fo-
liaq; intrita, strumas, ac duritias discutiūt. Au-
riū vermiculos infusus succus enecat. Aphrica, et
praesertim Marmarica capparis, vehementer in-
flat. Apula vomitus facit. & quæ à Libyco, &
quæ Rubro mari, desertur, mirū in modū acris
est: siquidē in ore pustulas excitat, gingivasq; os-
setenus exest quare in cubis non ab re dānatur.

Lepidium. CAP. CLXX.

Lepidium, aliqui gingidium vocant, her-
bula vulgò nota. muria cum lacte serua-
tur. Vis foliorum acris, & exulcerans. quapro-
pter ischiadicis trita, presentissimum est auxi-
lium, si cum helenij radice, quarta parte hora,
illinatur: lienosis simili modo prodest: lepras
eximit. Radix appensa collo, dolore dentium
liberare existimatur.

Ranunculus. CAP. CLXXI.

Complura Ranunculi genera. Vis tamen o-
mnibus vna: acris, & vehementer exulce-
rans. Nam vnum coriandri folijs constat, latio-
ribus, subalbidis, pinguibus: flore luteo, inter-
dum purpureo: caule gracili, cubitum alto: radi-
ce alba, exigua, amaraq; multis capillamentis,
hellebori modo, fibrata. nascitur in limitibus
humidis. Alterum lanuginosius, longiori caule,
pluribus foliorum incisuris, plurimum in Sardinia
proueniens, quam acerrimum, quod sylvestre apium
appellat. Tertium minimum, odore graui, flore
aureo. Quartum huic simile, flore lacteo. Folia, flo-
res, & cauliculi recētes, illitu exulcerāt, & cru-
stas nō sine dolore gignūt. quare vngues scabros
extricāt, scabiē eximūt, stigmata delet: formicā-
tes verrucas, & pēsiles, alopeciasq; paulisper illi-
ta tollūt. Tepēte decocto permiones fouētur. Sicca
radix, tritaq; sternutamēta ciet, naribus admo-
ta: detinē dolore appēsc leuat, ipsos tamē frāgit.

Anemone. CAP. CLXXII.

DVo Anemones genera, vnũ syluestre, alterũ in cultu nascẽs. Cuius multa species: vna phœniceũ florẽ profert: altera cãdicatẽ, aut lacteum, aut purpureum. Harum folia coriandro similia, ceterũ scissa tenuius in terrã inclinãtur: caules lanuginosi, tenues, in quibus flores vt papaueris, & in medio capitula nigra, aut scerulea: radix oleæ magnitudine, aut amplius paulò grãdescit, ac veluti geniculis quibusdã cingitur. Syluestri amplitudo prorsus maior, latioraq; folia, & duriora: oblongius caput: flore puniceo: tenuibus, & multis radicum capillamentis. Acrior est, quæ nigra habet folia. Vis vtriusque acris. ea de causa succus naribus infusus purgat caput. Cõmanducata radix pituitã trahit. decocta in passo, & illita, medetur oculorũ inflammationibus: cicatrices eorundẽ, & hebetudines emēdat: sordida vlcera abstergit. Folia, & caules, si cum ptisana decocti edantur, copiã lactis præbent: menstrua ciunt, vellere apposita: illita quoque lepras eximũt. Sunt qui errore ducti argemonem nominari eupatorium putent: quoniam à syluestri Anemone, argemonem, & papauer, quod rhœada appellant (de quo inter papaueris genera referemus) propter colorũ cognationẽ in floribus distinguere non possunt. Verũ papauer, & argemone colore minus saturato spectantur, & vtraque tardius florèt.

Quinetiam argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit: rhæas verò candidiorem, & acrem. Insuper anemone, & rhæadi capitula sylvestris papaveris similia insunt, sed in anemone superne crassiusculum, in rhæade subangustius. Anemones genera succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. In arvis illa sæpius enascuntur.

Argemone. CAP. CLXXIII.

ARgemone in totū sylvestri papaveri similis est. Folia habet anemones, diuisa, florem puniceum: caput in cauliculo papaveris rhæadis, oblongius, & summis partibus latum: radicem rotundam: succum croci colore, acrem dimittit. Argema, & nubeculas expurgat. Folia illitu inflammationes compefcunt.

Anagallis. CAP. CLXXIIII.

DVo sunt anagallidis genera, quæ tantum flore distant. nam quæ caruelo flore est, sæmina dicitur: mas quæ phæniceo. Frutrices sunt parui, in terra iacentes: folijs in quadrangulo cauliculo pusillis, subrotundis, ad helxina folia accedentibus: semine rotundo. Vtraque mitigandi vim habet, inflammationem arcet, adactos corpori aculeos extrahit, nomas cohibet. Succus earum gargarizatus, capitis pituitam purgat: & naribus infusus, dolorem dentium lenit, si in aduersam narem injiciatur: argema cum melle Attico emendat: et usque oculorum aciei auxilia-

tur: contra viperarum morsus, iecinoris, & renum vitia, si ex vino bibatur prodest. Tradunt eam, quæ ceruleum edit florē, prociduum sedem reprimere: quæ uerò phœniceum, illitu euocare.

Hedera. CAP. CLXXV.

Hedera differentias multas in specie sortitur, summas autē genere tres. Nam quædam cādida est, altera nigra, tertia helix. Cādida fructum fert cādidum: nigra, nigrum, aut croci æmulum, quam vulgus Dionysiam vocat. Helix fructū non gignit, sed tenues habet viticulas, & folia parua, angulosa, & rubra. Hedera omnis acris est, & adstringēs, nervos tentat. Flos trium digitorū carptu, facit ad dysentericos, in vino bis die potus: ambustis cū cerato tritus illinitur. Recētia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorū, & corymborū succus, cū irino vnguento, melle, aut nitro, naribus infunditur: & cōtra veteres capitis dolores, caput eo cū aceto, et rosaceo perfundi vtile est, purulētis auribus, aut dolētibus, cū oleo medetur. Nigra hedera succus, aut epoti corymbi, corpus infirmāt, mentemq; turbāt largius sumpti. Acini quinque triti, calfactiq; in punici mali cortice cū rosaceo, si instillētur à contraria aure, dolorē dentium mitigāt. Denigrāt capillū illiti corybi. Folia in vino decocta, illinuntur omnium vlcerum generi, etiam si cacoēthe sint, vitia cutis in facie, & ambusta sanant, vti

antea

antea diximus, decocta. Mouent menses triti, & subditi corymbi: ijdem poti, post purgationes foeminarum, drachma pondere, concipiendi spem adimunt. Pediculus foliorum melle irrigatus, ac vulua inditus, menstrua, & partus extrahit. Instillatus succus putrida tedia narium, graueolentiâq; emendat, & sanitati restituit. Lachryma hederæ psilothrum est: illitu pediculos enecat. Succus radicum in aceto potus, contra phalangia prodest.

Chelidonium Maius. CAP. CLXXVI.

Chelidonium maius, caule est gracili, cubitali, aut altiore. agnatus foliosis: folijs ranunculii, mollioribus tamen, & colore cassijs: flore viola alba, secundum singula folia prodeunte. In eo succus croci, mordax, acris, & aliquantulum subamarus, grauiter olens. Radix supernè singularis, infernè in multa crocea capillamenta fibratur. Siliqua, ceu corniculati papaueris; tenuis, in meta figurâ longa: in qua semine papauere maius recluditur. Succus in aereo vase, cum melle prunis decoctus, oculis claritatē adfert. Folijs, caule, radice, succus exprimitur ineunte aestate, & siccatus in umbra digeritur in pastillos. Radix cum aniso, & vino albo pota, medetur regio morbo, et vlceribus quæ serpūt: imposita cum vino, aut maducata, dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi videtur vendicasse, quod aduentu hirundinum extiatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant

rant, hirundines matres excacatis pullis, admo-
ta herba, visum restituere.

Chelidonium minus.

CAP. CLXXVII.

Chelidonium minus, quod triticum sylue-
stre aliqui nuncuparunt, herbula pediculū
ab radice pendens, sine caule: folijs hederæ, mul-
tò rotūdioribus, & minoribus, teneris, & sup-
pinguibus. radices habet ex eodem callo complu-
res, pusillas, in granorum tritici modum acerna-
tim congestas: quarum tres, aut quatuor in lon-
gitudinem exeūt. Iuxta aquas, & lacus nasci-
tur. Vis ei acris, & anemones modo summā cu-
tē exulcerat. pforas, & scabros vngues eximit.
Succus radicibus expressus ad purgandū caput,
naribus infunditur. Decoctum eius cū melle gar-
garizatum, magnificè id præstat: & omnia pe-
loris vitia extrahit.

Othonna. CAP. CLXXVIII.

Othonnam aliqui maioris chelidonia suc-
cum esse aiunt: quidam glaucij: alij succum
floribus corniculati papaueris expressum. Alij
permistos ceruleæ anagallidis, hyoscyami, & pa-
paueris succos esse cōtendunt. Alij Troglodytica
cuiusdā herbe succū, quæ othonna vocatur: na-
sciq; eam in eo Arabia tractu, qui ad Aegyptiū
spectat. Othonna folijs erucæ, perforatis cribri
modo, & veluti à tineæ derosis, squalore obsi-
tis, paucis: flore croci, latifol. o: quare quidā ane-
mones

mones speciem esse putauerunt. Extractus succus oculorum medicamentis adijcitur, ubi expurgare est opus: mordet enim, & absterget omnem caliginem, quae oculis offunditur. Tradunt humorem quendam ex herba emanare, qui elotus, semotus calculis, in pastillos ad eadem digeritur. Aliqui tamen affirmant, lapidem esse Aegyptium, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, aereo colore, gustu cum feruore quodam, & adstrictione mordaci.

Auricula muris. CAP. CLXXIX.

Muris auricula, quam, myosotida vocant, herba est caulibus pluribus ab una radice, aliquatenus ab imo rubentibus, & coccineis: foliis angustis, oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus, per intervalla assidue geminatis, atque in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus: flosculo, ut anagallidis caeruleo: radis digitali aetate assitudine, multis capillamentis fibrata. Radix illa aegyptia sonat. Sunt qui alsinem, muris auriculam vocitant.

Glastum. CAP. CLXXX.

Sativum Glastum, quo insectores lanarum utuntur, folium habet plantagini simile, verum pinguius, nigriusque, cuius caulis dum cubitorum altitudinem excedit. Illius folia tumores omnes discutiant, cruenta vulnera glutinant, sanguinis profluvia sistunt: ignem sacrum, phagedanas, putrescentias ulcera, & quae serpunt, sanant. Sylvestre glastum sativo simile est, folia fert maiora, laetius

carens

cacem proxima: caules tenuiores, multifidos, quadamtenus rubentes: in quorum cacumine folliculi multi dependent, quandam linguarum effigiem referentes, in quibus semen: flore tenui, luteo. Eadem, quæ & supra dicta, præstat, potu, & illitu lienosis auxiliatur.

Telephium. CAP. CLXXXI.

Telephium herba portulacæ similis, et caula, & folijs: alas binas in singulis foliorum geniculis annectit: ramuli à radice seni, septeniue prodeunt, folijs referti caruleis, crassis, lentis, canosis: flore luteo, aut candido. Nascitur in cultis, & maximè inter vites tempore verno. Folia seni horis illita albam vitiliginem sanant, sed postea hordeacea farina illini debet. perun-ctam ex aceto etiam in sole vitiliginem tollunt: sed ubi inaruerunt, absterguntur.

FINIS.



P E D A C I I

DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE

Medica materia,

LIBER TERTIVS.



Vperioribus, charissime Aree, commētarijs, tradidimus de aromatibus, vnguētis, oleis, arboribus earum fructibus, & lachrymis: item de animalibus, cerealibus, oleraceis, & herbis acrimonia predictis. In hoc autem tertio radices, succos, semina, herbas, & quæ vernacula. & inter se cognata censentur, quaq; pluribus scatent remedijs, prosequemur.

Agaricum. CAP. I.

AGaricū radix fertur laſerpitiꝝ ſimilis, ſed facie ſumma ſolutior, & rariore, fungoſoq; tota cōtextu. Duo eius genera: ſœmina, quæ præfertur, reſtis intus venarum diſcurſibus conſtat: mas rotundus eſt, & vndique compæctior. Vtrique guſtus in initio dulcis, mox ex diſtri

distributione in amaritudinem transit. Gignitur in Sarmatica regiōe, quæ Agaria dicitur. Sūt qui radicem esse plantæ affirmant: alij vt fungos nasci in arborum caudicibus, quadam putredine. Gignitur in Galatia Asia, et Cilicia in cedris, sed friabile, & infirmum. Adstringendi, calfaciendiq; naturam habet. Efficax est contra tormina, cruditates, & rupta: prodest itidem cōtusis, & ab alto deuolutis. Datur duobus obolis in vino mulso febrim non sentientibus: febriculosis verò in aqua mulsa: arcatis quoq; suspiriosis, iocineris, renumq; vitio laborantibus, dysentericis. Item si vrina agrè reddatur, si vulua strangulatus vrgeat, si pallor membra decoloraret, drachma vna dari solet: si tabes infestat, ex p. 30. si lien negotium exhibet, ex aceto mulso: si dissolutio stomachi est, ita vt cibi tenax non sit, manditur, & sine vlla humoris sorbitione deuoratur: simili modo acida ruclātibus propinatur. sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum. Facit ad coxendicium, & articulorū dolores, & comitiales morbos, si cū aceto mulso, pari pondere assumatur: menses ciet: fœminis, quas inflatio vulua vexat, vtiliter aquali modo datur: horrores soluit, datum ante febriliū accessiones: aluum purgat, drachma vna, aut altera, si cum aqua mulsa bibatur: venenorum antidotum est denarij instar, cum diluta potione sumptum: si serpentes iclū vibrarūt, mor-

sumq; subfixerūt, tribus obolis ex vino potū, mī
rē auxiliatur. In summa, internis omnibus vi-
tīs cōuenit, pro viribus, & aetate datū, nunc ex
aqua, nunc ex vino: ijs ex aceto mulso, alijs
ex aqua mulsa.

Rhaponticum. CAP. II.

RHa, aliqui rheum, Latini rhaponticum
vocat, prouenit in ijs, quae supra Bospho-
rum sunt, regionibus ex quibus affertur. Ra-
dix nigra, centaurio magno similis, sed minor,
& rufior, fungosa, aliquantum lauis, sine odo-
re. Optimum habetur, quod teredines non sen-
sit, si gustatu cum remissa adstrictione lētescat,
manducatumq; colorem reddat pallidum, aut
ad crocum inclinantem. Id eptum facit ad in-
flationes, stomachi imbecillitatem, & omne ge-
nus dolores, ad conuulsa, rupta, lienosos, hepati-
cos, tormina, & renum, vesicae, & pectoris vitia,
aduersus intenta praecordia, & vulua mala, co-
xendicum dolores, sanguinis excreationes, su-
spira, singultus, dysenterias, & caeliacorum
affectus, contra febrium circuitus, & venenato-
rum morsus. Datur in singulis valetudinibus
eodem, quo agaricum pondere, & cum eisdē li-
quoribus: si febris careant in mulso: si aliter ex
aqua mulsa: si tabem experiuntur, ex passō, si
lien is exercet, in aceto mulso: si dissolutio est sto-
machi, id est cum cibi tenax non est, mādatur, &
sine sorbitione vlla deuoratur. Liuentia, liche-
nasq;

vasq; tollit, cū aceto illitū. Inflammationes omnes veteres ex aqua oblitum dissipat. Summa eius vis adstringens, cum aliquanto calore.

Gentiana.

CAP. III.

Graci

Gentiana inuētio prima assignatur. Gentiana Illyriorum regi, à quo cognomentum habuit. Folijs partim proximè radicē, iuglādi, plantaginive similibus, subrubris: partim à medio caule, & praesertim iuxta cacumen, paulū dissectis, caule cauo, & leui, digiti crassitudine, geniculato, & ex intervallis maioribus foliato, binū cubitorum altitudine. semine in calycibus lato, leui, glumoso, satis ad sphondilij semen accedente. radice longæ aristolochiae, longa, crassa, amara. Nasctur in sublimibus mōtium iugis, umbrosis locis, aquosisq;. Vis radicis excaesctoria, & adstringens: contra morsus serpentium, duabus drachmis. cum pipere, rupta, & vino pota auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deturbatis, ruptis, & conuulsis prodest: hepaticis, et stomachicis, pota cum aqua subuenit. Radix collirij modo subdita, partus eijcit: imposita, vt lycium, vulneraria est, & vlcerum cuniculatim depascentium medela. Succus praecipuè eodem effectu prodest: oculis inflammatione laborantibus illinitur: pro meconio collyrijs acribus immiscetur. Radix vitiliginem absterget. Succus extrahendi ratio haec est. Contusa radix quinque diebus aqua

maceratur: postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices: & ubi refrixit aqua, linteo excolatur: mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat, scilicet; reconditur.

Aristolochia. CAP. IIII.

Aristolochia nomen ex eo sibi adoptauit, quod existimetur optimè puerperis opitulari. Tria eius genera traduntur. Rotunda, quæ femina vocatur, folijs hederaceis, præstanti odore cum acrimonia, mollibus, subrotundis, multis ab una radice germinibus, prælongisq; palmitibus: floribus candidis, pilei similitudine, in quibus quodd rubrum est, grauitè olet. Longa mascula appellatur, nonnullis dactylitis: longiore quàm rotunda folio: tenuibus ramulis, dodrantalibus: flore purpureo, grauitè olète, qui marcescens in pyri similitudinem turbinatur. Radix rotunda in orbem conglobata, rapimodò: longa verò digiti crassitudinem: & dodrantis longitudinem implet, nonnunquam paulò maiorem. Ambæ colore intus buxæo, gustu amaro, & graui. Est etiãnum tertia longa, quæ clematitis vocatur, ramulos habens tennes, refertos folijs subrotundis, minori sæperuiuo similibus: flores ruæ: radices longiores, tennes, crasso cortice, odoratoq; vestitas, priuatim vnguentorum spissamentis conuenientes, Rotunda ceteris venenis resistit. Longa verò aduersus angues, & venena, drachma pōdere ex vino bibitur, & illinitur.

Rota.

Pota cum pipere, & myrrha menses, partus.
 & omnia vulvarum onera eijcit: eadem ef-
 ficat subdita in pefso. Rotunda ad eadem pollet:
 insuper fingultibus, suspurijs, horroribus, lienē
 comuulsis, laterum doloribus, pota cum aqua.
 singulariter auxiliatur. Aculeos, & spicula ex-
 trahit: ossium squamas illitu adimit: vlcera pu-
 trida exest, & sordida expurgat: caua cum iri,
 & melle explet: gingiuas, & dentes extergit.
 Clematidis ad eadem pollere creditum: viribus
 tamen inferior est.

Dulcis radix. CAP. V.

Dulcis radix plurima gignitur in Cappado-
 cia, et Pōto. Fruticosa est, ramis binū cubito
 rū altitudine assurgētibus: folijs lētisci, dēsis, pin-
 guibus, tactuq; gummosis: flore hyacinthi: fru-
 ctu pilularum platani magnitudinis, asperiore,
 qui siliquas lentium modo habet rufas, & par-
 uas: radicibus longis, vt gentianæ, coloris buxēi
 subacerbis, & dulcibus: quæ densantur in suc-
 cum, lycij exēplo. Is in arteria scabritia efficax
 habetur: verū oportet, vt linguae subditus eli-
 quescat: aestuanti stomacho, thoraci, ac iocinorē
 conuenit: sanat vesicæ scabiem, & renū dolores
 cum passo potus, idem eliquatus sitim sedat: vul-
 neribus illitus accommodatur: cōmanducatus sto-
 macho prodest. Recentis radicis decoctum ad ea-
 dem conuenit. Eiusdem farina pterigijs cōmo-
 diffimè inspargitur.

Centaurium magnum. CAP. VI.

Centaurium magnum folia habet in glandis, oblonga, viridi brassicarum colore, serrata in ambitu, caule, ceu runcicis, binū, aut ternum cubitorum, multis ab radice adnatis, in quibus capita, ceu papaverum, in rotunditate oblonga. Flos caruleus: semen nucis simile, ceu lanis floccis quibusdam inuolutū, Radix crassa, grauis, solida, tripedalis, succo praeagnas, cum adstrictione aliqua, & dulcedine acris, & rubescens. Amat solū pingue, & apricum, ac syluas, & colles. Copiosissima est in Lycea, & Peloponneso, in Arcadia. Helide, & Messenia, pluribusq; locis circa Pholoen, Lyciam, & Smyrnam. Radix conuenit ruptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, veteri tussi: sanguinem expuentibus, drachmis duabus trita datur, si febris sit, in aqua, ceteris in vino: item ad tormina, & vuluae dolores. Ramenta eius in colligry formam vuluae subdita, menses, atque partus extrahunt. Succus eadem praestat. Vulneribus prodest: nam recens tusa, aut arida antè madefacta, ea glutinat, & coniungit. Carnes coalescunt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succum exprimunt, quo pro lycio vtuntur.

Centaurium minus. CAP. VII.

Centaurium minus, limnesion aliqui vocant, cauere, quoniam rigua amet loca. Herba

origa

origano, aut hyperico similis: caule anguloso, palmum excedente: flore lychnidis, è puniceo in purpuram vergente: solijs ruta, pralongis, & paruis: fructu tritico simili: radice pusilla, leui, & superuacua, quæ gustanti amaritudinem adfert. Herba recens tusa suo illitu vulnera conglutinat: vetera vlcera purgat, & cicatrice obducit. Bilem, crassosq; humores per aluum exigit, si decocta deuoretur. Ius decocti ischia dicus cõuenientissimè insunditur: trahit enim sanguinè, & dolorè leuat. Succus oculorum mel dicamentis perquàm utilis, si quidem cum mele caliginem oculorum expugat. in vellere appositus, menses, & partus extrahit: epotus peculiariter nervorum vicijs succurrit. Succus extrahendi ratio. Legitur herba semine prægnans, & diebus quinque madesacta decoquitur, donec supermineat aqua: mox vbi refrigit, linteolo exprimitur, & eiecta herba, iterum decoquitur, vsque dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentem, grauidamq; consũdunt, atque succum fictili non picato exprimunt, & in sole, linea rude assiduè mouentes, in spissant. quodd si quid concretum faucibus vasis adherescat, deradunt, reliquoq; humori permiscunt, noctu diligenter operiunt, nanq; ros nocturnus liquores coalescere nõ sinit. Quæ autè siccis radicibus, aut herbis, liquamèta exprimuntur, decocta (vt in gētiana mētiōe retulimus) præ-

parantur. Sed quæ ex corticibus humidis, aut cōtusis herbis faciliuntur, in sole, vti antè dictum est, coguntur. Sic è thapsia, sic è mandragora, reliquisq; similibus succus: sic ex acerbis vuis melligo elicitur. Lycium tamen, & absynthium, hypocistis, & consimilia, decocta, eo, quo diximus modo, coguntur.

Chamæleon albus. CAP. VIII.

Chamæleon albus, ixia ideo aliquibus vocatur, quòd quibusdā in locis viscum circa radices eius inueniatur: quo pro mastiche vtuntur mulieres. Folia habet silybo, aut scolymo similia, asperiora, acutiora, nigroq; chamæleone validiora. Caulem non promit, verum ex medio spinas, echini marini, aut cinaræ modo, erigit. Flores purpureos, veluti papporum lanugines emittit: semen cnico simile: radicem in latius collibus crassam, in montosis verò graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graui odore, dulcem. Quæ pota acetabili mensura, latas interaneorum tineas pellit. bibitur autē in vino austero cum origani seruefacti succo. Hydropicis cōmodissimè dragma in vino datur: etenim eos extenuat. Contra difficultatē vrine decoctum propinatur. Hausta in vino, serpentium venenis resistit: occidit canes, & sues: mures item necat, subacta cum polenta, aut aqua, & oleo madesacta.

Chame

Chamæleon niger. CAP. IX.

Chamæleon niger folijs scolymo similis ef-
 fet, nisi minora, tenuioraq; ac rubro distin-
 cta viderentur. Caulem emittit dodrantalem,
 crassitudine digitali, subrubrum: & in umbel-
 la flores spinosos, tenues, hyacynthi æmulos, ver-
 sicolores: radice crassa, nigra, densa, interdū ex-
 esa, quæ dissecta flavescit, & commanducata
 mordet. Prouenit in campestribus, siccis, & cliu-
 sis tractibus, & maritimis. Radix trita, addito,
 attramenti sutorij exiguo, cedrino oleo, & axū-
 gia, scabiem abigit: eadem, cum sibi sulphur, &
 bitumen asciuit, & cocta in aceto illinitur, impe-
 tiginēs absterget. Decoctum collutione dentium
 dolorem mitigat. Cum pari pipere, & cera obli-
 ta radix, dolenti denti auxiliatur. Radice con-
 cisa, & in aceto decocta, dentes fouētur: eos quoq;
 frangit, si scriptorio stylo seruens admoneatur:
 vitia cutis in facie, vitiliginēsq; cum sulphure
 emēdat. erodentibus medicamentis admiscetur:
 phagedanas, tetraq; vlcera illitu sanat. Quare
 chamæleon vocetur, à varietate foliorum eue-
 nit: mutāt enim cum terra colorem: hic viridia,
 illic albicantia, alicubi cœrulea, nonnusquam
 rubra inueniuntur.

Crocodilium. CAP. X.

Crocodilion Chamæleontis nigri figuram ha-
 bet. Nasctur in syluosis, radice longa, le-
 ui, aliquātulum lata, odore, vt nasturtij, acuto.

Feruefacta in aqua, & pota radix, sanguinem copiosum per nares pellit. datur lenofis, eos euidenter adiuuans. Semen ei rotundum inest, duplex vti scutum: quod suapte vi urinam ciet.

Dipsaciū, siue labrum veneris. CAP. XI.

• Virga
pastoris
vulgò.

Dipsaciū aculeatarū generis est. Caulē habet altū, spinis horridū folijs lactuca, spinosis, binis, genicula singula cōplectētibus, pralōgis, seu quasdā bullas intus, et extra aculeatas, in dorsi medio habētibus, cōcano alarū sinu, in quo imber, aut ros asseruetur, vnde dipsaci, quasi sitiētis, nomē traxit. In cacumine canlis, singula surculis capitula insunt, oblonga, echinata spinis: q̄ are facta, cādida spectātur, dessecta q̄; medulla ten⁹, vermiculos ostēdūt. Sanat rimas sedū fistulas q̄; si tusa, et decocta in vino radix, vsq; dū sit crassitudo cere, immitatur. Medicamētū area pyxide recōdēdū. Aiūt fornicationibus, verrucis q̄; pēsilibus remedio esse. Vermiculi capitulorū in folliculo alligati collo, aut brachio appēsi produntur quartanis febribus remedio esse.

Spina alba. CAP. XII.

Spina alba nascitur in montibus, & syluosis. Folia fert albi chamaleonis, angustiora, cādiora, aliquantū hispida, & aculeata, caulem supra bina cubita altum, pollicari, aut ampliore crassitudine, albicantē, intus canum: in cacumine capitulū inest spinosum, echini marini amulum, sed minus, & oblongum: flores purpu-

rei in quibus semen, ceterum cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, coeliacis, stomachicis, et ijs, qui cruenta extussumt, efficax est: urinam cit: tumoribus illinitur. Decotto eius dentes in dolore colui prodest. Epotum semen convulsis infantibus & à serpente demorsis auxiliatur. Gestatum pro amuleto serpentes abigere traditur.

Spina arabica. CAP. XIII.

Arabicam spinam natura alba spina similem esse constat. Ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, ceterasq; fluxiones radix etiamnum valet. Provenit in asperis.

Carduus. CAP. XIII.

Carduus, Græci scolymon vocant, folia chameleonis habet, & alba spina, nigriora, & crassiora: caulem longum edit, foliosum, capite spinoso, radice nigra, et crassa. Quæ illita graue olentiam alarum, totiusq; corporis emendat: ite si decocta in vino bibatur, copiosam autem urinam fœtidamq; expellit, Herba cum recens tene rescit, in olera, asparagi modo, transit.

Poterium. CAP. XV.

Poterium, Iones neurada vocat, largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum. lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lœtis, tenuibus, tragacantha proximis: folijs parvis, rotundis: flore exiguo, candidi coloris: semine nullius vsus, sed gustu acuto, & odorato. Nasci-

tur in aquosis, & collibus. Radicas demittit binum, ternumve cubitorum, nervosas, & firmas: quæ proximè terram recisa, dant succum gummi similem. Tusa, præcisis nervis, & vulneribus glutinandis illinuntur. Decoctum quoque eius nervorum affectibus prodest.

Acanthium. CAP. XVI.

Acanthium alba spinæ simile, folijs aculeatis per extremitates, & lanugine araneosa obductis, ex qua collecta, & neta, vestes bombycinis similes texunt. Folia, vel radices ad remedia opisthotoni bibuntur.

Acanthus. CAP. XVII.

Acanthus, Romani pædorotam vocant, nascitur in hortis, petrosis, & riguis. Folia habet multò latucaceis latiora, & longiora, eruca diuisura, nigricantia, pingua, leuia: caulò binum cubitorum, digitali crassitudine, laevè, propè verticem ex intervallis circumdatum foliolis, cœnucamenta quadam oblonga referentibus, spinosis, è quibus flos prodit albus, semè oblongum, luteum, caput thyrsi specie: radicibus nititur longis, muscosis, rubris, & glutinosi. Quæ vstis igni, & luxatis artibus illita subveniunt: potæ urinæ ciunt, sed aluum cohibent: ruptis: cœnulsis, tabem sentiētibus, mirè profunt. Nascitur & sylvestris Acanthus, scolymo similis, aculeatus, breuior quàm sativus, et is qui in hortis provenit. Cuius radix ad eadem ad quæ superior efficax.

Anonis

Anonis siue ononis. CAP. XVIII.

ANonis, quā aliqui ononida. apellāt, ramos habet fruticosos, dodrātales, aut maiores, frequentibus geniculis cinctos canis alarū multis, capitibus rotundis: folijs lenticulæ, tenuibus, pusillis, ad ruta, aut pratensis loti folia accedentibus, sub hirsutis, odoratis, non iniucundè olentibus. Muria conditur, ante quā spinosa fiat, cibus gratissima. Rami acutioribus spinis, & veluti spiculis firmioribus horrent. Radicē mittit candidam. Quæ excalfacit, & extenuat. huius cortex ex vino potus vrinā ciet, calculos cōminuit, margines vlcērū erodit. Radix cū decoquitur in posca, dolorem dentiū collutione mitigat. Decoctum eius potu hamorrhoidas sanare creditur.

Leucacantha. CAP. XIX.

LEuacantha, prædita est radice cyperi, valida, & amara. Quæ manducata dolorem dentium sedat: veteri laterum dolori, atque ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex vino poto. Eadem ruptis, & conuulsis medetur. Radicis epotus succus eosdem præbet effectus.

Tragacantha. CAP. XX.

TRagacantha radix lata, & lignosa, summo cespite nititur: vnde surculos, humiles robustos, latissimè fūdit: in quibus minuta folia multa, nonnunquā tenuia exoriuntur: quæ sub se spinas albas, rectas, & firmas occulunt. Est etiam

tiāmmum tragacantha lacryma, quæ vulne-
rata radice manans, concreuit. Præstat pellucens
gracilis, lauis, sincera, & subdulcis. Cutis spiracu-
la, vt gummi, obstruit. Huius increbuit vsus ad
oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas
fauces, retusas voces, ceterasq; destillationes, cum
melle in delinctu: subdita quoque lingue lique-
scit. In passo madefacta, drachmæ pondere bibi-
tur contra renum dolorem, & vesicae rofiones,,
mixto cornu cerui vsto, & eloto, aut scissi ain-
minis momëto. Eryngium. CAP XXI.

ERyngion aculeatarum generis est. Cuius fo-
lia in principio, sale condita, in cibos recipiū-
tur. Lata autem sunt, & extremo ambitu aspe-
ra, gustu aromatica: sed vbi adoleuerunt, circa
complures caulium eminentias in spinas aculeā-
tur. in quorum summitatibus globosa capitula
durarum, acutissimarumq; spinarum ambitu
stellatim circumnallantur, quorū colos alias viri-
dis, alias albus, interdū cæruleus inuenitur. Ra-
dix oblonga, lata, foris nigra, internè cædida,
pollicis crassitudine, odorata. Nasctur in aspe-
ris, & campestribus. Vim habet calfactoriam.
Pota menses & vrinas pellit: tormina, inflatio-
nesq; discutit: contra iocinerum vitia, serpentiu
morsus, & hausta venena, cum vino prodest, bi-
bitur aduersus plurima, cum seminis pastinaca
drachma vna: appensa, illuāve, tubercula discen-
tere pūditur. Pota in hydromelite radix, opij ho

tonicis, & comitialibus medetur.

Aloë. CAP. XXII.

ALoes folium scillæ similitudinē habet crassum, pingue. modicè latū, rotundū: retrorsus pādū folia gerit curta, q̄ vtrinq; ex obliquo lōgioribus intervallis striātur, et in spinulas desinunt. Caulis emittitur non dissimilis antherico: flos albus: fructus hastulæ regie cognatus: graui tota est odore, & gustu amarissima: radix vna, ceu palo, in terram depacta. Plurima, præpinguisq; in India gignitur, ex aqua coctus succus adfertur. Nasctur etiam in Asia, & arabia in locis quibusdam maritimis: & insulis (vt in Andro) non valde succo extrahendo idonea, sed ad glutinanda vulnera saue quàm utilis, si detrita illinatur. Duo succi genera: quoddam arenosum, quod sedimentum purissimæ esse videtur: alterum ad iecinoris imaginē vergit. Eligendi debet, boni odoris, syncera, quæ nihil doli sensit, nitida, calculorū expers, rufi coloris, friabilis, ac iecinoris modo coacta, faciliè liquefcens, eximia amaritudinis. Improbatur nigra, et fractu cōtumax. Gūmi eam adulterant: quod deprehenditur gustu amaritudine, & valido odore: eoq; argumento. quòd digitis friata non ad minima vsque frustra resoluitur. Nec desunt, qui acaciā immisceant. Natura eius est spissare, exicare, somnum allicere, & corpora densare, aluum resolvere. Stomachum repurgat binum cochlearium
mensura

mensura, in aqua frigida, aut eligēda pota: sanguinis reiectiones sistit: regium morbum purgat tribus obolis ex aqua, aut drachmæ pondere in potu: deuorata cum resina aut cū aqua, vel melle cocto sumpta, aluum soluit: purgationis perfecta causa tribus drachmis sumitur, alijs purgatorijs medicaminibus admista, præstat, vt minus stomachum infestent: sicca glutinandis vulneribus inspargitur: vlcera ad cicatricem perducit, cohibetq; . Eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur, & disrupta puerorum præputia iungit: condylomata, rimasq; sedis ex passo sanat: hemorrhoidū abundantiam, et sanguinis eruptiones sistit: pterygia, ad cicatricem ducit luores, & insignita ex melle tollit. Priuatim scabras lippitudines, pruriginesq; angulorum permulcet: dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita, ex aceto & rosaceo: capillum fluentem continet cum vino: tonsillis, gingiuis, & omnibus oris vlceribus, cum melle & vino proficit, Oculorum medicamentis torretur in munda, & candenti testa, pennaq; subinde versatur, vt possit æqualiter torrerī. Lauatur vt quod sit arenosissimum, tanquam inutile subsidat, & leue, ac pinguisimum assumatur.

Abūnthium. CAP. XXIII.

Abūnthiū, aliqui bathy picrō, herba vulgè cognita. Præstantius in Ponto, & Cappadocia, in monte Tauro nascitur. Vim habet

cal.

talsfaciendi, & adstrindendi. Bilem expurgat,
 qua & stomacho, et ventri inhaesit: vrinam cit,
 & crapulam praesumptum arcet: ad inflationes
 ventris & stomachi dolores prodest, cum seseli, et
 nardo Gallico potū: fastidia discutit, & arqua-
 tos sanat madefacti dilutū, aut decocti ius, quo
 tidie tribus cyathis haustum: menses cit potum,
 aut tum melle appositum. Contra fungorū strā-
 gulationes conuenienter, ex aceto bibitur: aduer-
 satur ixia venenis cum vino: itē cicuta, & mu-
 ris aranei morsibus, & draconi marino. Anginae
 eo cum melle, & nitro perunguntur, et epinycti-
 des ex aqua. Ad sugillata, et oculoum caligines,
 ex melle illinitur: item auribus, si manat sanies,
 Dentium, auriumq; dolores decoctum vaporis
 suffitu compescit. Decoctum in passo dolentibus
 oculis oblinitur: item praecordijs, et iecinori, tritū
 cum cerato cyprino stomacho quoque longa va-
 letudine laboranti cum rosaceo: cum ficis autem
 aceto, & loliace farina, aqua inter cutem, lie-
 nosisq; subuenit. Vinum ex eo fit, quod absinthii
 te vocant, praesertim in Propontide, & Thracia
 quo ad ante dicta vtūtur, cum febris carent: alio-
 quin in aestate propinant, & acceptam huic vi-
 no incolumitatem referunt. Im sparsum arcis ab-
 sinthium, vestes ab erodentium iniuria vindi-
 cat: eculices ex oleo perūctum abigit, & a corpo-
 re arcet: atramentum librarium diluto eius tem-
 peratum literas à murium erosionē tuetur. Exi

stimatur liquamentum eosdem prestare effectus
attamen potionibus improbatur, quoniam sto-
machum malè habet, & capitis ciet dolorem,
Sunt qui costâ amurcâ, liquamentū adulterât.

Absinthium marinū. CAP. XXIII.

• Abroto-
num ma-
rè intelli-
ge.

Absinthium marinum, quod aliqui Seriphium
vocât, copiosissimum in Tauro môte, iux-
ta Cappadociâ, & in Taphorisi Aegypti gigni-
tur: quo Isiaci pro oliuæ ramo vtuntur. Herba
est tenuis, abrotoni parui similitudine, referta
minutulis seminibus, sub amara, stomacho inimi-
ca. Ea grauer olet, & cū quadâ calfactione ad-
stringit. Per sese, aut cū oryza cocta, interaneo-
rum animalia, teretesq; tineas, adiecto melio-
enecat, aluum lauigat: cum edulio autem, vel lê-
ticula decocta, eadem prestare potest. Pecora ma-
ximè pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus
absinthio assignatur, quo Gallia alpibus finiti-
ma fiatet. Id patrio nomine Santonicum vocât,
regionis, in qua nascitur, cognomento, absinthio
non dissimile: verum subamarum est, non adeò
seminis fecundū. Eadem qua seriphium potest.

Abrotonum. CAP. XXV.

Abrotonum duorum est generum. Fœmina
quadam arboris specie fructicans, candicat,
circum ramulos folijs, seriphi modo, minutim in-
cisis: floribus referta est, comantibus in summo,
fulgore auri, corymbis. quod per æstatem pro-
dijt. suauiter olet, cum grauitate quadâ, &

amaro gustu. Id genus Siculū esse constat. Alterum mas vocatur, sarmentosum, gracilibus ramulis vti absinthium. Plurimū in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atque in Syria Hierapoli. Vtriusq; semen crudum tritum, & seruesactum ex aqua, in potu auxiliatur orthopnoicis, convulsis, ruptis, coxendicibus, vrinae angustijs: mensibus suppressis, aut remorantibus. In vino potum exitialium venenorum antidatum est: horroribus ex oleo illinitur. Serpentes & substratu, & nidore fugat: contra iclus eorum cum vino potum prodest, privatim efficax contra scorpionum, & phalangiorum venena prodest. Oculorum inflammationibus commodē illinitur cum cotoneo cocto, aut pane tritum cum farina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit. Irini compositionibus admiscetur.

Hyssopum. CAP. XXVI.

HYSSOPŪ, herba nulli nō cognita, duū generū est, montanū, et hortensē. Optimū est ciliciū. Vim habet extenuandi, et calfaciendi. decoctū cū ficis, aqua, melle et ruta, potūq; peripneumonicis, diuturna tussi, suspiriosis, destillationibus, et orthopnoicis auxiliatur: tineas enecat: Idem facit, si cū melle delingat. crassū humorē p̄ aluū extrahit, decoctū ex aceto mulso epotū. Ad subducendū aluū cū ficis viridib. detritis mādatur vehemētius, addita iri, cardamomo, aut iriōe, deijcit: calorem corpore fouet. Ieni. & aqua inter cuteum cum

fico nitroq; inflammationibus quoque ex vino illinitur: cum feruente aqua impositum, sugilla tadiscutit. cū decocto ficorū optimè āginis gargarizatur. Decoctum cum aceto dentium dolorem in collutione sedat: inflationes auricularum vaporis suffitu discutit.

Stœchas. CAP. XXVII.

Stœchas iuxta Galliam in insulis eiusdem nominis è regione Massilia gignitur: vnde cognomentum accepit. Herba tenuibus furculis, coma thymi, longiore folio, subamara gustu, & aliquantū acris. Cuius decoctum, hyssopi modo, ad pectoris vitia efficax est. Antidotis vtiliter miscetur. Viscera omnia, & vniuersum animantis habitum extenuat, confirmat, & ab obstructionibus & farctu liberat.

Origanum. CAP. XXVIII.

Organum Heracleoticum, quod & cunilam vocant, folium habet hyssopo non dissimile: umbellam autem non in rotæ speciem orbiculatam, sed veluti multifidam, semine in summis virgis haud quaquam denso. Excalscit: unde decoctum cum vino potum demorsis à serpente conuenit, qui autem cicutam, aut meconion hauserunt, hīs ex passo: si verò gypsum, aut ephemeron, ex aceto mulso propinatur, ruptis, conuulsis hydropicis cum fico esui datur. Aridum acetabuli mensura potum in aqua mulsa, atros humores per aluum extrahit: menses ciet, et tu-

si cum melle linctum medetur, Ad pruriginem, psoras, regiumq; morbum, decocti ius in balneis prodest, Succus virentis, consillas, ruam, & oris ulcera sanat, & per nares ex oleo irino infusum trahit: aurium dolores cum lacte mulcet. Conficitur ex eo, & cepis, & rhoe, quo ad obsonia vtuntur, vomitorium medicamentum, his omnibus in cupreo vase per dies bis videnos insolatis, dum canicula sydus flagrat. Herba autem substratu serpentes fugantur. Qua onitis appellatur, candidiore est folio, & hyssopo similior. Semen veluti coniunctos corymbos habet, Vis ei organi Heracleotici: sed multò inefficacior. Sylvestre origanum, aliqui, panaces. Heraction, alij cunilam vocant, ex quibus est Nicander. Colophonius. Folijs est origani: ramulis tenuibus dodrantem altis: in quibus umbella anethi insunt: flores candidi: radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussis à serpente, folia, & flores ex vino poti auxiliantur.

Tragoriganum. CAP. XXIX.

Tragoriganum tenuis frutex est, sylvestri serpyllo, aut origano similis, folio & ramulis. Quibusdam in locis latius, virentiusq; inuenitur, & latioribus folijs, satis glutinosum. Alterum exilibus surculis, ac tenuibus folijs, quod aliqui prasium vocauerunt. Optimum est Cilicium, & cretense, & Smyrneum, & in Chyo, Cooq; prouenient. Omnia excalfaciunt,

vrinam timent, alio accommodantur. Decocto pro
 to bilem deijciunt: lienosis ex aceto bibere pro-
 dest: contra pota iuxta venena in vino bibuntur:
 menses trahunt: peripneumonici, tuſſientibus,
 ex melle in eclemagte dantur. Grata, ac mitis eo-
 rum potio eſt: quare cibum ſtudentibus, &
 ſtomacho aida ruſtanti, imbecilloq; prabetur.
 item ſi à maritima iactatione nauſea, & eſtus
 præcordiorum excitetur. Tumores verò cum po-
 lenta illita diſcutiunt.

Pulegium CAP. XXX.

PVlegiū herba vulgaris notitia. Extenuat,
 calfacit, decoquit: potum menſtrua, ſecun-
 das, ac partus eijcit. Pulmonis vitia ex melle,
 & aloë potum extrahit, & conuulſis auxilia-
 tur, nauſeas, ſtomachiq; eroſiones ex poſca per-
 mulcet. atram bilem per aluum exigit. Bibitur
 in vino vtiliſſimè contra ſerpentium morſus: de-
 ſectos animo recreat, cum aceto naribus obiectū
 gingiuas areſacti cinere corroborat. Illitum cū
 polenta inflammationes omnes ſedat: podagris
 per ſe ſubuenit, impoſitum vſque dum rubefcat
 locus: cum cerato varos extinguit. lienosis cū ſa-
 le vtiliter illinitur. Decoctū eius ab'utas pruri-
 gines mitigat: conuerſas vuluas corrigit: contra
 inflationes, duritiasq; vulue in deſeſiones con-
 uenienter adijcitur. Vocant aliqui blechona,
 quoniam dum floret guſtatum à pecoribus, ba-
 latum concitat.

Dictamnium. CAP. XXXI.

Græcus

Dictamnium, aliquibus sylvestre pulegium vocatur. Cretensis herba est, acris, lauis, pulegio similis, sed maioribus folijs, quæ tomento quodam, spissâque lanugine pubescunt. Florem nullum, aut semen profert. Præstat omnia, quæ sativum pulegium, sed efficacius multò: nam non potũ modo, sed appositũ quoque, aut suffitũ, defunctos partus eicit. Prodrũt in Creta capras sagittis percussas, huius herbe pastu eas excutere. Purgãdi vim habet succus illitus, aut cũ polenta tritus. Herba impactos pedibus, reliquòve corpori aculeos, illitu refigit. ad lienis dolorem efficax habetur: siquidẽ ipsum imminuit. Metunt æstate, et autũno. Radix eius gustu calfacit: partus accelerat. Succus cũ vino potus, contra serpentũ morsus præsidio est. Tanta herbe facultas est, vt olfacta abigat bestias, quæ venenato ictu sæviant, appēsãq; contactu exanimet. Vulneribus ferro illatis, & venenatis morfibz infusus succus, præsentaneo est remedio, si etiã ab instillatione statim in potu assumatur.

Pseudodictamnium. CAP. XXXII.

Quod Pseudodictamnium vocant, multis in terris nascitur, antè dicto simile: sed minus, quàm illud acre. Eosdem effectus præbet, sed inefficacius multò. Dictamnũ alterũ.

CAP. XXXIII.

Desertur à Creta alterum dictamni ge-

nus, folijs sisymbrij, ramis maioribus in quibus flores sylvestris origani, nigri, molles. Odor foliorum inter sisymbrium, & saluiam, incundissimus. Efficax ad eadem, sed minus nares ferit. Miscetur emplastris, & medicaminibus, quæ aduersus serpentium iniurias confinguntur, theriaca vocant.

Saluia. CAP. XXXIII.

Salvia, siue eleliphacon, frutex est ramosus, longus, virgas habens quadrangulas, & canas: folia mali cotonei effigie, sed longiora, asperiora, crassiora, & quæ sensim attritæ quasi vestitiū scabritiem referant, hirsuta, subalbida, perquā iucundo odore, sed graui: semen summis in caulibus sylvestri hormino simile gerit. In asperis nascitur. Menses cit, & vrinas decoctum foliorū, ramorumq; potum, et partus extrahit, & pastinaca marina ictibus auxiliatur, Capillos denigrat, vulnerū sanguinē cohibet, tetra vlcera purgat. Testium pruritus sedant rami foliæque, si eorum decocto cum vino foueantur.

Mentha. CAP. XXXV.

Mentha cognita herba est. Calfaciendi, adstringendi, atque exiccandi vim habet. Si sit sanguinē, poto ex aceto succo: tineas in ventre teretes enecat: venerem stimulat. Singultus, vomitiones, cholerasq; sedant terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti capitis
dole

dolores mulcet: mammæ si tendantur, aut lacte
turgeant, compescit: cum sale canum moribus il
linitur: aurium doloribus cum aqua mulsa sub
uenit: vuluæ ante coitum admota cōceptioni re
sistit: linguæ scabritiem confricta lenigat. Lac
coire, densariq; in caseum non patitur, si folia po
tionibus lactis immergantur. In summa sto
macho utilis est, & in condimentis peculiarem
gratiam habet. Syluestris mentha, Latini men
thastrum vocant, hirsutius est folio, et prorsus
maiore, quàm sisymbrij, grauiori odore. quare
minus ad sanorum vsus expetitur.

Calamintha. CAP. XXXVI.

EX calaminthæ generibus quadam monti
bus familiaris, folia ocimi habēs, incana: sur
culos. & caules angulosos, purpureū florē. Al
terapulegio similis est, sed maior, quàm syluestre
pulegiū ideo appellarūt, quòd odore ipsum amu
letur. nepetam Latini vocitant. Tertia mētha
stro cognata est, folijs oblōgioribus, caule & ra
mis maioribus, quàm superiora, sed viribus in
efficacior. Omnium folia gustu impensè feruētia,
& acria: radix superuacua. Nascitur in campe
stribus, asperis, & aquosis. Potu, aut illitu de
morsis à serpente opitulatur. Decoctū potu men
ses, & vrinas expellit: ruptis, conuulsis, orthop
neæ, torminibus, choleris, horroribusq; auxilia
tur: regium morbum expurgat. Præsumpta in
vino venenis resistit: tineas, ceterasq; interanco

rum animalia cum sale, & melle pota, enecat: nec secus cocta, orudare, si teratur. Elephanticos esitata adiuvat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in vellere subijciantur, menses extrahunt, et partus enecant: accensa, aut substrata, serpentes fugant: nigris cicatricibus candelam reddunt, in vino cocta, & illita: suggillata tollunt. Calamintha ischiadicis imponitur, ut ex alto humores euocet, summam cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus.

Thymum. CAP. XXXVII.

THymum ab omnibus cognoscitur, surculosus frutex, exilibus folijs, multis, et angustis circumdatus: capitulis in cacumine, flore purpureo refertis. Gracili solo, et petroso provenit. Vim habet hanc, ut cum sale, et aceto potum, pituitam per alvum detrahat. Decoctum eius prodest orthopnoicis, & anhelatoribus: tineas ventris exigit: menses, partus, & secundas pellit: urinas ciet. Cum melle in eclegmate faciles facit excerati omnes: recetum tumores discutit, cum aceto illitum: coctum sanguinem dissolvit. verrucas thymi colorem reddentes, pensilesque tollit. Ischiadicum cum vino, et posseta impositum subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest. Perquam utile pro sodimeto, dumtaxat ad usus eorum, qui recte valent.

Satureia. CAP. XXXVIII.

Satureia trivialis notitia est. Gignitur in asperis locis, & tenui solo, thymo similis, minor tamen, & tenerior: desert spicam florum plenam,

nam, coloris herbarei. Eadem potest, quæ thymum, si modo cōsimil: sumptitur. Aptus sanis vsus. Est etiānum quadam fatiua, syluestri prorsus minor, quæ propter mitiorem acrimoniam commodius in cibos recepta est.

Serpyllum. CAP. XXXIX.

Serpyllum duorum generū est. Hortense odore sampsuchum imitatur, atque in coronas addi solet cui à serpendo nomē inditum est: quoniam si qua eius particula terram attingat, inibi radices demittet. Folia, & ramulos origani habet, sed candidiores in macerijis multò procerius assurgit. Sylvestre, xygis appellatum, non serpit, sed in altitudinem increscit, ramulos edēs tenues, surculosos, folijs refertos longioribus, quàm ruta, & durioribus, augustis. Flores iuncundè olent, gustanti acres. Radicis nullus vsus. Nascitur in petris, fatiuo efficacius, atque magis exalfaciens, et ad medendi vsū aptius. Menses trahit, & vrinam potu ciet: torminibus, ruptis, vulsis, & iecinoris inflammationibus auxiliatur: et aduersus serpentes potu, illitūve prodest. capitis dolores mulcet coctum, adiecto roseo, & madefactū in aceto: maximè verò phreniticis, et lethargicis cōuenit. Cruentos vomitus sedat succus, drachmis quatuor ex aceto potus.

Sampsuchum. CAP. XL.

Sampsuchum in Cypro, & Cyxiceno laudatissimum. Secundum sibi locum vendica-

uit Aegyptium. Amaracum gens Sicula, & Cyxica appellat. Herba est ramosa, per terram repens: folijs eius calamintha, quæ tenui folio constat, hirsutis, & rotundis, suauissimum odorem spirat: ideo coronis inseritur. Vis eius exalfaciens Succus decocti potus, conuenit incipientibus hydropicis, & ijs quos vrina difficultas, aut tormina extruciant. Illita ex melle arida folia, subgillata tollunt: menses subdita in pectore trahunt: contra scorpionis ictum ex aceto, & sale illinuntur: luxatis, tumoribusq; cerato excepta, imponuntur: aduersus oculorum inflammationes, cum polline polenta, illini prodest. Acopis malagmaticisq; calfaciendi gratia commiscetur.

Melilotus, siue Sertula campana.

CAP. XLI.

Sertula Campana laudatissima in Attica, & Cyxica, & Chalcedone nata: cuius color vicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nola, colore in luteum languescente, odore infirmo. Vim habet adstrictoriam. Inflammationem omnem emollit, praesertim quæ in oculis, vulua, sede, aut testibus erumpat, si ex passo cocta illinatur: interdum autem addito oui luteo assato, aut fœni græci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis papaueris, intybore Recetes meliceridas per se cum aqua, & vlcera manantia in capite illita cum creta Chia, vino, aut galla sanat: stomachi dolores, & cruda, & cocta

cocta cū aliquo ex antè dictis lenat: doloribus au-
riū mitigādis cruda ex passō instillatur: in aceto,
aut rosaceo madefacta, capitis dolorem lenit.

Marum. CAP. XLII.

MArū herba cognita vulgò, surculosa, flore
origani, folijs multò candidioribus, flore
odoratiore. Vim habet sisymbrio consimilem:
substringit enim, & modicè calfacit. Qua de
causa illitu serpentia vlcera sistit, & in calidas
illitiones additur. Iuxta Magnesiam, & Tral-
leis copiosissima gignitur.

Acinos. CAP. XLIII.

ACinos, aut aconos à Græcis dicitur, tenui,
siccoq; ramulo herba, ocimò similis, odorata
sed hirsutior: qua coronæ faciuntur. à non-
nullis olitoribus colitur. Menses, & aluum potè
sistit. Illiea panos, ignemq; sacrum sanat.

Baccharis. CAP. XLIII.

BAccharis herba fruticosa, quæ in coronas ad evolvē id
dicitur, cuius folia aspera sunt, media violæ, est, odora-
& verbasci magnitudine: caulis angulosus, cu-
biti altitudinem petens, aliquantulum asper,
non sine appendicibus adnatis: flore purpureo,
subalbicante, odorato: radicibus veratro nigro
similibus, quibus odor inest cinnamomo proxi-
mus. Asperū, squalidumq; solum amat. Radix
in aqua decocta ruptis, vulsis, ex alto praci-
pitis, spiradi difficultati, salutaris: itē diuturnæ
russi, & vrina difficili: menses pellit: cōtra serpen-

tium morsus vtilissimè datur in vino. Recens
radix apposita partum extrahit. Puerperis eius
decoctū in desensionibus prodest. Indiū pasmata
vtiliter inseritur iucundi odoris gratia. Folia,
vtpote quæ adstringant, capitis doloribus illitu
profunt: oculorum inflammationibus, mammu
tumētibus à partu, agilopÿs incipientibus, igni
busq; sacris auxiliantur. Odor somnum gignit.

Ruta. CAP. XLV.

Ruta montana, sylvestruq; sativa, & hor
tensi acrior est, & in cibis damnata: sati
ua verò, quæ sub ficu arbore enascitur, magis in
cibos admittitur. Vtraque vrit, calfacit, exulke
rat, urinam ciet, mēstrua pellit, aluū sistit potu,
sibove. Lethalium medicamētorum antidotum
est, si semen ex vino acetabuli mēsurā bibatur.
Folia per se praesumpta, aut cum nucibus iuglā
dibus, aridiq; ficis, inefficaces venenorum vires
reddunt: contra serpentes simili modo sumere
conuenit. Genituram cibo potuve extinguit:
cum anetho sicco decocta, tormina sedat. Facit
ad pectoris, laterumq; dolores, difficultatem spi
randi, tussēs, pulmonis inflammationem, coxen
dicum, articulorumq; cruciatus, & horrores fe
brium circuitu repetentes, pota, vt antè dictum
est. Item ad inflationes calli, vuluæ, rectiq; in
testini cum oleo decocta, & infusa. Facminas
vuluæ strangulatu liberat, si à genitali sedete
rio cum melle subiiciatur. Feras facta ex oleo,
& pota,

Et pota, ventris tineas excutit: articularijs doloribus ex melle, aqua inter cutem cum ficis illinitur: eisdem in potu auxiliatur: decocta in vino ad dimidias partes, Et oblita. Cruda, conditaq; cibo, visus aciem excitat: dolores oculorum illita cum polenta lenit: doloribus capitis cum rosaceo, et aceto illita, auxiliatur: profluentem naribus sanguinem sistitrita, Et indita. Testium inflammationibus cum laureis folijs imposita, et eruptionibus papularum cum myrto, Et cerato prodest: cum pipere autem, vino, Et nitro affricta, alba vitiligni medetur: cum eisdem illita fornicationes tollit, Et verrucas, quae thymi florem representant. contra impetigines cum alumine, Et melle vtilissimè imponitur. Succus in mali punici calyce calsactus, aurium dolori efficaciter infunditur. Idem oculis, qui hebetudinem sensere, cum feniculi succo, ac melle mundellus, opitulatur. Ignem sacrum, vlcera quae serpunt, aut in capite manant, cum aceto: rosaceo, et cerussa illitus persanat. mansa alliorum, ceparumq; acrimoniam domat. Montana si copiosius estur, interficit. Dum florem promit, Et ad murias colligitur, cutem inflat, Et rubore quodam inficit, cum pruritu ac vehemēti inflammatione. oportet itaque eam vinctus antea manibus, Et facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pullis inspersum, feles arcere. Adhuc eam, quae in Macedonia circa Haliacmon amnem prodeat, comedentes interinero

terimere. Montosus autē is locus, viperis scatet. Semē eius potū contra intestina vitia efficax est. In antidota cōmodē additur. Cōtra incontinentiam vrinae tostū semē septenis diebus potui datur. Radix huius montanū moly vocatur. Syluestris ruta satinae similis est. Prodest comitialibus, et coxēdicū doloribus: mēstrua mouet, partus enecat. Acrior est viribus, quā hortēsis et validior. Syluestris, utpote noxia, cibis abducatur.

Ruta syluestris. CAP. XLVI.

Vocant etiānum syluestrem Rutā, quod in Cappadocia, & Galatia Asia finitima moly dicitur. Frutex est, qui ab vna radice multos emittit cauliculos: folys multo, quam aliterius ruta longioribus, tenerioribusq; , odore graui, flore cādido: capitulis in cacumine paulō maioribus, quā satinae ruta, quae tribus maxime partibus cōstant: in quibus triangulū semē, subrusum, gustu amarum recluditur, cuius est vsus. Semē autūno maturescit, quod cum melle, vino, croco, & sceniculi succo, ac gallinaceo selle, teritur contra retusam oculorū aciem. Sunt qui eam harmalā vocent, Syri besasan: qui Cappadociam incolunt, moly, quoniam quādam cum moly seruet similitudinem: radice nigra, flore candido. In collibus, & lato solo prouenit.

Moly. CAP. XLVII.

Moly folia habet graminis, latiora, humi sparsa: florem albae viola similem, sed minore,

norem, magnitudine viola purpurea amulū, la-
 etei coloris: caulem candidum, quaternū cubito-
 rum: in cuius cacumine inest aliquid, quod allij
 speciem referat. Radix parua, bulbosa, qua mi-
 rum in modū valet ad vulua apertiones, si tri-
 ta cum irina vnguento, in pefso subijciatur.

Panaces eracleum. CAP. XLVIII.

PAnaces nonnullis Heracleū dicitur: ex quo
 popopanax colligi solet. Plurimum in Bæo-
 tia, & in Phocide Arcadiæ nascitur: ibiq; compē-
 dij, et quæstus qui ex eo liquore facitatur, gra-
 tia, studiosè colitur. Folijs est asperis, in terra ia-
 centibus, herbacei coloris, multū ad ficulnea ac-
 cedentibus, in ambitu quinquepartitò diuisis:
 caule, vt ferula, altissimo, qui lanugine quadā
 incanescit, folijs etiam minutoribus obsitis: mu-
 scarijs, ceu anethi, in cacumine: flore luteo, & se-
 mme odorato, feruenteq;. Radices habet multas
 ab origine vna, candidas, graueolentes, crassā
 corticis, & subamari gustus. Nascitur in Cyrene
 Libyæ, & Macedonia. Excipitur succus inuisa
 radice, recentī cauliū pullulatu. Ea candidum
 succum emittit, qui siccatus in summa cute cro-
 ceū colorem contrahit. Effluentē autem succum
 excipiūt, folijs ex cauato solo stratis, qua sica-
 ta tollūtur. Similis modo caule mēsisibus inciso,
 profluentē succum eximunt. Meliores ex radici-
 bus, labæ, rigentas, distentaq;, sicca, qua cariē
 non sentiant, aromatica, feruentes gustu. Fru-

*Elus ex media ferula cibo idone⁹ est: sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur, quàm amarissimus, internè albus, aut subfulvus, foris ad croci colorem inclinans, lavis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquescent, graui odore. Niger improbatur, ac mollis. Adulteratur ammoniaco, aut cera. Sed syn-
 ceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluatur, & lactescat. Excalfacit, mollit, extenuat: horroribus februm, circuitibusq; , vulsis, ruptis, laterum dolori, torminibus, stillicidio vrina conuenit. Contra vesicae scabiem ex aqua mulsa, aut vino bibitur: menses trahit, foetum emecat. Inflationes, quae vuluam malè habent, duritiasq; , ax melle dilutus, discutit: ischiadicis illinitur. acopis, & capitis medicaminibus admiscetur: carbunculos rupit, podagricis, cum vna passa illitus subuenit: dolore dentium liberat, canis inditus: oculorum aciem illitus excitat. Ex eo, & pice optimum fit emplastrum contra bestiarum morsus, quae in rabiem efferantur. Radix in ramenta consussa, vuluae admota, partus extrahit: ad vetera vlcera efficax est. nudata ossa corpore operit, si trita cū melle illinatur. Semē cum absynthio sumptum menses pellit: cum aristolochia, prodest aduersus animalia, quae venenum ei aculantur: & cōtra vuluae strangulatus in vino bibitur.*

Panaces asclepium. CAP. XLIX.

PAnaces Ascepij caulē à solo emittit, tenuē, cubitalem, geniculatum: circa quē folia funduntur fœniculo similia, maiora tamen, & hirsutiora, odorata: in cucumine umbella, vbi flores emicant aurei, acris gustus, et odorati, radix parua est, & tenuis. Auxiliarem vim habent flores, et semina, contra vlcera, phagedanas, & tubercula, si trita cum melle imponantur, aduersus serpentes ex vino bibuntur, & cū oleo illinuntur. Aliqui panaces sylvestre origanū vocant, alij cunilā, de qua in origani mētionē diximus.

Panaces chironium. CAP. L.

PAnaces Chironium in Pelio mōte maximē provenit. folium eius amaraco simile: flos aureus: radix parua, quæ non altē demittitur, gustu acris. Pota radix serpentiū veneno resistit. Illita coma: eadē præstat. Ligusticū. CAP. LI.

Ligusticū, qđ alij panaceā, alij panaces vocant, plurimū in Liguria nascitur, in mōte Apennino alpibus cōtermino: vnde nomē traxit, Panaces incolæ nō ab re appellāt, quonā et radice, & caule Heracleotico panaci simile sit & viribuseisdem pradiū. Gignitur in altissimis, asperisq; montibus, ac vmbrosis, maximē iuxta fluentia. Cauliculum fert anethi, geniculatum, tenuem, & in circuitu folia fertula Campana, molliora, odorata, prope verticem gratiliora, & longē magis diuisa: in cucumi-

ne muscariu n, in quo semen dependet nigrum, solidum, & oblongum, fœniculo proximū, gustanti acce, & aroma olens: radix candida, Heracleotici panacis similis, odorata. Radicis, seminisq; vis exalfactoria, concoquens. Prodest ad intestinos dolores, tumores, concoctiones: item ad inflationes, præsertim quibus stomachus turgeat: & contra serpentium ictus: vrinas, & menses potu trahit. Eisdem præstat effectus apposita radix. Semen cum radice oxyporis, & medicamentis decoquentibus admiscetur. ori perquam utile: quare pro pipere vtuntur eo indigenæ ad obsonia. Adulteratur semine quodam simili: quod facile gustu discernitur: amarum enim est. Alij semen fœniculi, aut seselis admiscentes, ligusticum dolo vitiant.

Pastinaca.. CAP. LII.

Pastinaca sylvestris folia gingidij habet, latiora, subamara: caulem rectum, scabrum: umbellam similem anethi: in aqua flores insunt candidi, & in medio purpurei quiddam, ferme croceum. radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta manditur. Semen potum, vel impositum, mēstrua mouet. Iis conuenit in portione, quos vrina difficultas torquet, aut lateralis dolor excruciat, aut si aqua cutem subiit: serpentium morsibus, ictibusq; prodest. præsumē

tes id, nulla afficit iniuria à serpētibus traduntur: conceptus adiuvat. Radix urinam pellit, venerem stimulat, partus apposita eijcit. Folia tria, & cum melle imposita, phagedanas vlcerū purgant. Sativa ad eadem polle, inefficacior tamen, & cibo aptior.

Seseli. CAP. LIII.

Seseli Massiliense folia fœniculi habet crassiora: caulem vegetiorē: umbellam anethi, in qua semen oblongum, angulosum, degustātū, statim acre: radix longa est, iucondi odoris. Semen, & radix excalfaciendi vim habent. Potu stranguria, & orthopnœæ medentur: suffocationibus mulierum, comitialibusq; profunt, menses, & partus trahunt: ad omnia interna mala polent: tussim veterem sanant. Semen cum vino potum, concoquit, & tormina discutit: epialis febribus vtile. contra perfriktiones in itineribus, cum pipere, & vino bibitur. Capris, ceterisq; pecudibus datur in potu, quò facilius suos factus enitantur. Aethiopicum seseli, folia habet hederae minora, & ad periclymeni modum oblonga. frutex nigricat, palmetibus in bina cubita extēsis: ramis sesquipedalibus: capitulo anethi: seminē in tritici morē dēso, nigro amaro, Massilient si odorazione, & acriore, multum suavi. Peloponnense folia habet cicuta, latiora, & crassiora.

ra: caulem supra Massiliensis magnitudinem, serulaceum: & latam in cacumine umbellam, in qua semen latius, odoratum, & carnosius pendet. Eisdem viribus preditum est. Nasitur in asperis, riguis, & collibus. inuenitur etiānum in insulis.

Craticum seseli. CAP. LIII.

TOrdylum, quod aliqui Craticum seseli vocant, iuxta Ciliciam in Amano monte nascitur, herbula furculosa. semine duplici rotundo, scultulorum effigie, odorato, subacri. Contra vrinae difficultatem bibitur: potu cit menses. Succo seminis, caulisq; virentis, ternis obolis expresso decem diebus hausto, renes sanantur. Efficax est radix ad ciendas pectoris excreationes, in delinctu cum melle.

Sison. CAP. LV.

Sison exiguum semen est, in Syria natum, aspio simile, oblongum, nigrum, feruentis naturae. Contra lienis vitia bibitur: vrinae difficultatem potu emēdat, remoratos menses citat. Eo in condimentis, cū cucurbita, & aceto indigena vtuntur. In cacumine granula multa gerit.

Anisum. CAP. LVI.

Anisum in summa excaesat, exicat. oris halitum iucundiores facit, doloris leuamentum praestat. Vrinae ciet, discutiendi vim habet, hydropicis potum sitim extinguit. Animalium venis aduersatur: valet ad inflationes, alui, & alba

alba ſceminarum profluuia ſiſtit: lac ad mamas elicit: venerē ſtimulat, dolores capitis leuat, ſuſſitum naribus. cum roſaceo tritū, inſtillatumq; fractis auribus medetur. Melius ſemper recens, plenum, non ſurfuſum, odore præſtans. Inter prima laudatum eſt Creticum, proximo loco Aegyptium.

Carum. CAP. LVII.

CArum, ſemen eſt vulgaris notitiæ. Excalfacit: vrinam concitat, ſtomacho vtile, os commendat, concoctionem adiuuat. Vtiliter miſcetur antidotiſ, & oxyporiſ, aniſi vicē præbet. Radix cocta, paſtinatæ modo, manditur.

Anethum. CAP. LVIII.

ARidi Anethi coma, ſeminisq; decoctum, potu lac euocat, inflationes, & tormina ſedat: aluum, vomitionesq; ſiſtit: vrinas ciet, ſingultus lenit, oculorum aciem hebetat, genituræ reſtingnit, aſſiduè potum. Decoctum eius ſceminis vuluæ malo oportunis, ad deſeſſiones vtile. Condylomata illitus ſeminis cremati cinis ſollit.

Cuminum ſatiuum. CAP. LIX.

CVminum ſatiuum ori gratum eſt, ſed multò magis Aethiopicum, quod Hippocrates regium appellauit. Secundum locū tenet Aegyptiū: reliqua ſequuntur. Prouenit in Galatia, in Aſia, Cilicia. et Teretia, et pleriſq; alijs tractibus. Excalfacit, adſtringit, exiccat. ad tormina,

inflationesq; conuenit, coctum, & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. orthopnoicis datur in posca: demorsis à serpente, in vino. testium collectionibus auxiliatur, impositum cum vua passa, aut lolij farina, ceratove: mensium abundantia inhihet. Contritum autè in aceto, & naribus obiectum, sanguinis profluvia sistit. Colorem bibentium, aut perunctorum mutat in pallorem.

Cuminum syluestre. CAP. LX.

Syluestre Cuminum, plurimum, efficaciusq; in Lycia, & Galatia Asia, atque Carthagine Hispania ginitur: frutice paruo, dodranta li caule actenui: quaternis, aut quinis folijs, tenuibus: veluti serratis, & gingidijs diuisura. In cacumine capitula quina, aut sena habet, mollia, rotunda: in quibus est semē acerosum, gustu satiuo acriore. nascitur in collibus. Bibitur semē ex aqua, aduersus tormina, inflationesq; : item contra venenatas bestias ex vino. Singultus ex aceto sedat: stomacho vtile, quē humor vexat. Sugillata tollit, si manducatum cum melle, & vua passa illinatur: testium inflāmationibus, adiectis eiusdem, illitum medetur. Est & aliud syluestris Cumini genus, satiuo nō dissimile, quod à singulis floribus elata promit cornicula, in quibus semen est melanthio simile. Quod potū omnium serpentium moribus presidio est. Calculosis, & ijs, qui vrinae stillicidio vexantur, aut concre-

tum

tum sanguinem cū lotio reddūt, auxiliatur. sed apud semen feruerfactum postea bibendum est.

Ammi. CAP. LXI.

Ammi Aethiopicum cuminū appellāt. Plerūque hoc natura diuersum esse ab illo existimant. Vulgò notū est, semē exile, multò minus cumino, organū respiciēs. Eligendū est purū, minimè fursurosū. Vis ei excelsa factoria, seruēs & exiccans. Facit ad tormina, vrina difficultatem, serpentīū ictus, cū vino potū: mēstrua ciet. Miscetur derodētibus cantharidū medicamētis, qua ecdoria vocāt, vt inde exortis, vrina difficultatibus resistat. Sugillata cū melle tolūt, colicū potū, aut illitu mutat in pallorē. Suffitū tum vna passa, aut resina, vuluas purgat.

Coriandrum. CAP. LXII.

Coriandrū, aut corianum vulgaris est notitia: vim refrigeratoriā habēs. Quare illitū cū pane, aut polēta, ignibus sacris, & vlceribus quae serpūt, medetur. Epinyctidas cū melle, vel vna passa, testium inflammationes, carbūculosq; sanat, cum faba fresca, strumas, & tubercula discutit. Tineas interaneorū expellit semen, cum passō modicē potum, & geniturā adauget: largius tamen sumptum, mentem nō sine periculo mouet. quare continuo, & copiosiore vsu abstinendum. Succus cum cerussa, spumāve argenti, necnon aceto, & rosaceo illitus, ardentes summācutis inflammationes emendat.

Hieracium. CAP. LXIII.

Hieracium magnum caulē emittit asperū, subrubrum, spinosum, cauum: folia ex interuallis rariūsculē diuisa, similia soncho per ambitum: luteos flores, in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modicē substringēdi: vnde illitū, stomacho aestuanti, inflammationibusq; predest. Succus erosionem stomachi sorbitione mitigat. Herba cum radice illita, vibratis à scorpione ictibus auxiliatur. Hieracium paruum, folia ex interuallis habet, diuisa in ambitu: cauliculos teneros: virentes: in quibus lutei flores orbem circinantes, emicant. Vim suam ad eadem, ad qua superior impendit.

Apium. CAP. LXIIII.

Hortensis Apij herba ad eadem, ad qua coriandrum cōuenit. Inflammationibus oculorum cum pane, aut polēta illinitur: aestuantem stomachum mulcet: mammarum duritiā ex lacte cōcreto contractam, reprimat. Vrinam ciet, siue crudum, siue coctum edatur. Decoctum eius, radicisq; potum, venenorum noxa resistit, cum vomitiones excitet, aluum cohibet. Semē vehementius vrinam pellit: contra serpentium venena, aut epotam argenti spumam auxiliatur: inflationes discutit. Admijcetur medicamentis, quae dolorum leuamenta praestant, theriacis quoque, ac tussis remedijs. Eleoselinum in humidis nascitur satino grandius, & ad eadem efficax.

Oreoselinum caule est dodr.ātem alto, ab radice tenuit excurrente: per cuius ambitum rami, & capitula cicutæ, multo tamen tenuiora: semine cumini oblōgo, acri, & odorato, tenui. Nasctur in petrosis, & montibus. Vrinam ciet, semine, ac radice in vino potis: mēses trahit. antidotis, nec non medicamentis vrinā cientibus, & excalescentijs, inseritur. Nec hallucinari nos oportet, existimātes *oreoselinū* esse, quod in saxis provenit: aliud enim est *petroselinum*. *Petroselinum* in macedonia provenit, in præruptis locis, semine ammi, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam cit, ac menstrua: contra stomachi, & colic inflationes, & tormina prodest. Laterum, renum, & vesicæ doloribus, in potu subuenit. Admiscetur antidotis vrinā cietibus. *Hipposelinū* Latini *clusatru* appellāt, aliqui *smyrnion*, quāvis aliud sit, quod propriè *smyrnion* dicitur, ut paulò post referemus. Est autē maius, & satius apio candidius: caule alto, cauo, molli. habente veluti lineas, folijs latioribus, in puniceum vergentibus: coma roris marini, florum plena: dependentibus in cacumine corymbis ante quā destorescat. Ea semine turget nigro, oblongo, acri, solido, aromatico. Radix dimittitur tenuis, odorata, candida, quæ os commendat. In umbrosis, & palustribus enascitur. oleorum generis, ut apium Radix cruda, coctāve estur. Folia cum caulibus, decocta maduntur, & per se aut cum pisci

piscibus preparantur, crudaq; muria condiuntur. Vim hanc habet, ut poto semine ex mulso vino menses ciet: argentes calfacit potu, aut illitu: vrinae stillicidio auxiliantur, Radix eosdem praestat effectus.

Smyrniū. CAP. LXV.

SMyrnion, quod in Cicilia petroselinum vocant, plurimum in Amano monte gignitur. Caulem habet apij, & stollones multos: folia latiora suppinguia, ad terram infracta, robusta, odore medicato, cum quadam acrimonia iucunda, colore in luteum languescente: capitibus caulium orbiculatis, ut anethi: semine brassicae, rotundo, nigro, acri myrrha sapore, ita ut alterius loco cedat. Radix quoque odorata, gustu acri, fauces mordet, succosa, mollis. Coriex eius foris niger, intus viridis, aut subalbidus. Nasquitur in saxosis, & collibus, atque squalidis, & limitibus terrenis. Vis radice, herbae, & seminis ex calfacere. Folij muria maceratis ad obsonia vtuntur, alium sistunt. Radicem contra serpentium ictus bibere conuenit: tusses, & orthopnoeas mitigat: vrinae difficultati medetur. Illita recentes tumores, collectiones, duritiasq; discutit: vulnera ad cicatricem perducit, partus abortu vitiat, si feruifacila subiiciatur. Semen lenis, renum, & vesicae vitij prodest: menses, & secundas pellit. commodè datur ischiadicis in vino: inflationes stomachi lenit: sudores ciet, & ruelus.

Pecu

Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.

Elaphoboscum. CAP. LXVI.

Elaphobosco fœniculaceus caulis est, aut romarinino similis, geniculatus: folijs duum digitorum latitudine, vt therebinthi, prælogis, aliquantũ asperis circumfractis. Ad nata multa habet: ferentia umbellas anethi similes & semina eiusdẽ florem subluteũ: radice ternum digitorum longitudinis, & crassitudinis vnus, candida, dulci, esui apta. Caulis tener pro olerè manditur. Contra serpentium ictibus, datur semẽ in vino. Fama autem est hoc pubulo cernas serpentium moribus resistere.

Fœniculum. CAP. LXVII.

Fœniculum, si herba edatur, aut semẽ cũ pti-sana bibatur, mamas lacte replet. Coma decoctum in renũ doloribus subditũ proficit, quippe quod urinã excitet. contra serpentium ictus in vino conuenienter bibitur: menses ciet. in febribus nausẽ. & stomachi feruorem ex aqua frigida potũ sedat. Contritæ radices, & cũ melle illitæ, moribus canũ medentur. Succus caule et folijs exprimitur, & in sole siccatus, in medicamẽta adyctur, quæ ad exiccandã oculorũ aciem cõmodè tẽperantur. Extrahitur succus ad eadem valens, etiã semine viridi, ramulisq; & radicibus prima germinatione incisiss. In Iberia, quæ ad occidentẽ spectat, succũ reddit gũmi similem.

Caulē mediū, dum herba floret, rustici demetūt, igniq; admonent, quò facilius vi caloris exudās gummi remittat: quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum.

Fœniculum erraticum.

CAP LXVIII.

Est & sylvestre fœniculum, magnum: fert autē semen cāchry à simile. Cuius radix iucundè olet, potaq; strāguria medetur: menses imposita ciet. Vētre m sistit, radice, aut semine potō: contra serpentium morsus auxiliatur, calculos comminuit, regium morbum expurgat. Lactis abundantia facit, decoctum foliorum haustum: fœminas à partu purgat. Traditur aliud hippomarathri genus longo, exili, & angusto folio semine coriandri, rotundo, acri, odorato. Excalcificandi naturā habet, et virilibus fœniculo respondet, sed ad omnia infirmius.

Daucum. CAP. LXIX.

DAUCŪ aliqui dauciū vocāt. Creticū folijs fœniculo simile, minoribus, et tenuioribus: caule dodrantali, umbella coriandri, flore albo: semine acri, cādido, hirsuto, suavisissimi odoris in mandēdo. Radix digitali crassitudine, & dodrantis longitudine adolescit. In saxosis nascitur & locis sole illustratis. Aliud eius genus, sylvestre apto simile, acre odoratum, aroma olens, ferventis gustus, probatissimū Creticū. Tertiū assignatur genus folijs coriandri, floribus albis, capite,

&

& semine anethi, muscario pastinacæ: semine ob longo, ceu cumini acri. Omnium semen excalfacit. potum urinam, et menses, et partus extrahit: torminibus liberat: veterem tussim mitigat. phalagio rum morsibus potum in vino, auxiliatur: tumores illitu discutit. seminis duntaxat in alijs generibus inualuit vsus: in Cretico etiam radice, quæ maximè contra venenatorum iniuriam in vino bibitur. Delphinium. CAP LXX.

Delphinium surculos emittit a radice una sesquipedales, aut maiores: à quibus folia exeunt parua, tenuia, diuisa, praelonga, quæ delphinorum effigiem representant: unde tractum nomen est. Flos violæ albæ non dissimilis, purpureus: & semen in siliquis, milio proximum quo non aliud vtilius bibi potest, ab scorpione percussis. Aiunt enim obiecta herba scorpiones resolui, atque ignavos torpescere: semota verò ea. sese recolligere. Prouenit in asperis, & apricis. Alterum est delphinium, quod Romani buccinum vocant, superiori simile, sed folijs, & ramis longè gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus. Pyrethrum. CVP. LXXI.

Pyrethrum Romani saluarem vocant. Folia, caulēque emittit, ut daucum sylvestre, et fœniculum: umbellamque anethi, circinathæ rotunditatis. Radix longa est, pollus crassitudine gustu feruidissimo. Pituitam elicit: ideo in dolore ventrum, decocta in aceto, colluto inde ore auxiliatur:

tur: māsā pituitam extrahit. Sudores ciet, perū
 Et o oleo corpore: diuturnis horroribus efficax
 contra perfrictiones membrorum, resolutionesq;
 eximiè conducit.

Rosmarinum. CAP. LXXII.

DVo Rosmarini genera. Vñ secundū, frū
 giferumq; cuius semen cachrys vocatur.
 Folia fœniculi habet, crassiora, latiora, inro-
 ta speciem, & humi sparsa, iucundè olentia: cau-
 lē cubiti altitudine, aut maiorē, multis concavū
 alis: in cacumine umbeliā, in qua semen copiosū,
 candidum, sphondylion simile, rotundum, angulo-
 sam, acre, resinaceum, quod in mandendo lin-
 guam exurit. radix tibi redolet, candida, pra-
 grandis. Est & alterum omninò consimile, se-
 men ferens latum, nigrum,, vti sphondylion, o-
 doratum, minimè exurens: radice foris nigra, in-
 tus si frangatur alba. Verū id quod sterile di-
 citur illorum planè similitudinē refert: sed neq;
 caulem, neque florem, neque semen prodit. Na-
 scitur in saxosis & asperis. Trita omnium her-
 ba communiter hæmorrhoidū profusiva sistit: se-
 dis inflammationes, & condylomata mitigat:
 concoquit strumas, & abscessus, qui ad matura-
 tionem agrè perducuntur. Sicca radices cum mel-
 le vlcera purgant: torminibus medentur cum vi-
 no pota, & contra serpentium morsus conue-
 niunt: menses et vrinam ciet: veteres tumores
 illi discutiūt. Tam radices, quam herba succus
 adieci

adieſto melle, illitus oculorum aciem exacuit. Potum ſemen ad eadem pollet: ſi comitiale malum ſentiatur, aut vetus peſtoris vitium, auxilio eſt. regio morbo laborantibus cum vino, & pipere datur: ſudores mouet, cum oleo perunctū: ruptis, & conuulſis, prodeſt. podagra, cū loliacea farina, & aceto tritum, illinitur: purgat vitiliginēs, addito aceto quā acerrimo. Semine in potionibus vtendum, eius quidē quod cachryn non ferat: quippe illud ſua acrimonia arteriam exaſperat. Roſmarinum cum erica naſci, folijs lactuca ſylueſtris amara aſterioribus, candidioribusq; radice breui, Theophraſtus author eſt: potuq; idipſum alterutra parte purgare. Cachrys vim habet excalfaciendi, & vehementer exiccandi. Quare abſtergentibus medicamentis inferitur. contra oculorum fluxiones capite illinitur, ita vt tertio die ſoluatur.

Rosmarinum coronarium.

CAP. LXXIII.

Rosmarinum, quo coronarij vtuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, denſa, longa, exilia, ſubter incana, ſuperne virētia, grauter odorata. Excalfactoria vi præditum eſt. Regium ſanat morbum, ſi decoctum in aqua, ante exercitationes bibatur: & vbi laborans exercitationi ſe crediderit, in balnea deſcendat, & merum potet. Acopis gleucinoq; ruguento admifceri ſolet.

Spbon

Sphondylium. CAP. LXIII.

Sphondyliū folia quadantenus platani, & Spanaci habet: caules fœniculaceos, cubitali altitudine: aut amplius assurgentes, in quorum cacumine semen duplex, seseli simile, sed latius, candidius, & magis paleaceum, grauis odoris: flores eius albi, aut pallentes: radice raphani, cãdida. Nascitur in palustribus, & aquosis. Potũ semen pituitam per aluum extrahit. medetur iocineris vitijs. regio morbo, comitialibus, orthopnoicis, vulsarum strangulationi: veterinosos suffitu reuocat. Cum oleo commodè infunditur capitibus phreniticorum, & lethargicorum, itẽ capitis doloribus: cum ruta illitum, serpentia ulcera cohibet. Datur radix contra regium morbum, & iocineris vitia: circumrassa eadem, & iniecta callos fistullarum derodit. Recentis floris succus exulceratis auribus, purulentisq; accommodatur. qui ceterorum succorum more exprimi dein recondi solet.

Ferula. CAP. LXV.

EViridi Ferula medula pota utilis est ad cruentas excretaiones, cœliacosq;: contra viperarum morsus in vino datur: erumpentem naribus sanguinem in dita sistit. Semen potum torminosi auxiliatur: sudores ciet, vncto ex oleo corpore. Caules si edantur capitis dolores faciunt, muria condiuntur. Ferula itaque caule profert ternum sæpe cubitorum: folia fœniculi, longe

longèaſſeriora, & latiora. qua ab imo caule vulnerata ſagapenum efficitur.

Peucedanum. CAP. LXXVI.

PEucedanum caulem emittit tenuem, gracilentũ, ſceniculo ſimilẽ: comã habet ſtatim ab terra copioſã, ſpiſſamq;: flore luteo: radice nigra, crassa, graui odore: ſuccoſa. gignitur in motibus opacis. Tenera radix cultello cõciditur profluẽs q;: è plaga ſuccus vmbra mandatur in ſole ſiquidem conſeſtim enaneſcit. Colligitur capite prius, & naribus roſaceo perſuſis, ne capitis dolor premat, & vertigo ſentiat. Affatione radix inutilis fit. Tam lac, quàm ſuccus radice, & caulibus extrahi ſolet, ſicuti è mandragora: verũ ineffuacior ſucco lacryma habetur, & velocius ex pirat: Interdũ etiã concreta inuenitur lacryma, thuris ſimilitudine, caulibus, radicibusq;: ad herens. Praſertur ſuccus è Sardinia, & Samothrace, colore ruſo, odore graui, feruẽs guſtu. Ex oleo, & roſaceo illitũ Peucedanũ prodeſt lethargicis, phreneticis, vertiginofis, comitialibus, & longis capitis doloribus, reſolutis, iſchiadicis, conuulſis. Omnibus, in vniuerſũ, vitijs nernorũ, ex oleo, & aceto illitũ, prodeſt. Eius olfactu reſpirant vulue ſtrãgulatus, & veternoſi reuocantur. Incenſũ ſerpẽtes abigit. Auriũ doloribus cõueniẽter ex roſaceo inſtillat, cauernis dentiũ inditũ mitigat dolore contra tuſſim efficaciffimè ex quo aſſumitur: ſuſpirijs, torminibus, & inflatio

nibus subuenit. Ventrē leniter emollit, lienē absumit, difficiles partus mirē adiuvat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renā distentiones potū, vuluā aperit. Radix ad eadē utilis est, sed inefficacior: eius decoctū bibitur. Farina eius, sordida vlcera purgat, & vetera cicatrice obducit: squamas ostium extrahit. Incerata, & calfacientia malagmata additur. Radix eligi debet recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris amygdalis, aut ruta, aut pane calido, aut anetho resoluitur.

Gith, seu melantium.

CAP. LXXVIII.

Gith exilibus surculis fruticat, sæpe binos drantes excedens folijs, vt senecionis minutis, sed multò tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo, ceu papaueris, oblongo, intercurrentibus intus membranis: quibus semen includitur nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspargitur, capitis doloribus illitū frōti, subuenit. discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex irino, et infusum naribus: tollit lepras, lentiginēs, duritias, tumoresq; vetustos, cum aceto illitum: circumscarificatos clauos excutit, cū vete re vrina impositum. Dentium doloribus, cum aceto, & teda decoctum, & collutum prodest. teretes ventris tineas expellit, peruncto ex aqua vmbilico, destillatione laborantes adiuvat, tritū in linteo, & orfactum. Vrinā & mēstrua
ciet

ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit: difficultatem spirandi cum vino potum, leuat: phalangiorum morsibus ex aqua, drachma pondere, haustum auxiliatur. Incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare.

Laserpitium. CAP. LXXVIII.

Laserpitium in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur: caule ferulaceo, quem masepetum vocant: folijs apio similibus: lato semine. Radix excalfacit, in cibis agrè concoquitur, vesicae noxia. Sugillatis illita cum oleo, et strumis, ac tuberculis cum cerato, medetur: ischiadicis conuenit cum irino, aut cyprino cerato: excrescentibus circa sedem tollendis illinitur, cum putamine mali punici, et aceto decocta. Venenis pota resistit: os commendat, cibis, aut sali permista. Laser è radice, atque caule sacrificatis colligitur. Praefertur autem rusum, translucens, myrrhae emulum: non porraceum, odore valens, suauis gustu, quod dilutum facile albescit. Cyrenaicum si quis degustauerit, humorem toto corpore ciet: blandissimo odore, adeo ut ne os quidem gustanti nisi paululum spiret. Medicum. & Syriacum minus viribus valent, & magis virosum reddunt odorem. Laser omne antequam siccescat, adulectur sagapeno, aut faba lomento. quod maleficium deprehenditur gustu, odore, visu, & dilutione. Caulem aliqui silphion, radicem magdalin, & folia masepeton vocant. Efficacissimum laser.

*laser, mox folia, postremò caulis. Acrem vim habet, inflationes facit: perunctas cum aceto, pipere, & vino alopecias sanat. oculorū aciem exauget: & incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat, cauernis dentiū in dolore inditur, aut cum thure in linteo circumligatur, aut cum hyssopo, & ficis coctis in posca, os collinitur. ijs prodest, quos bestia in rabiem efferata momorderit vulneribus immisū. Valet aduersus venena telorū, & animalia omnia, quæ virus eiaculantur, potum aut illitū: scorpionum plagis oleo dilutū circumlinitur. gāgranis præcoeratis immittitur: & cum ruta, nitro, & melle, vel per se carbunculis. Clauos, callosq; prius circumrasos vellet: cerato, aut aridorum ficuum carne præmolitum. Recentes lichenas ex aceto sanat: & ex crescentia in carne, polyposq; si aliquot diebus cum atramento sutorio. aut arugino illinatur. extuberantia cum forfice extrahit. Veteribus faucium scabritijs opitulatur: grauem, subitoq; irrauescentem vocem dilutum aqua, sorbitione confestim expedit: ruam illitum cum melle reprimat: anginis ex aqua mulsa vtilissimè gargari-
 zatur vescentes latiore colore mangonizati: russi commodè in sortili ouo datur, & pleoritis in sorbitionibus: in fellis suffusione, & aqua inter cutem, cum aridis ficis. Horrores discutit cum vino, pipere, et thure potum. nervorum contractionibus, opisthotonicisq; datur oboli
 pon*

pondere deuorandum, hærentes gule hirudines, gargarizatum cum aceto decutit. Ad lac intus coagulatum bibitur: comitialibus ex aceto mulso proficit: menses ciet, cum pipere, & myrrha potum: cæliacos adiuvat, in acino vna sumptum: cum lixiuio autem potui datum, repente conuulsis, ruptisq; prodest. ad potiones resoluitur amygdalis amaris, aut ruta, aut calido pane. Foliorum succo eadē præstantur, sed multò inefficacius. Cum aceto mulso manditur, ad expediendam arteriam, maximè cum vox retinēditur. Eo cum lactucis vtuntur, exitq; in vicem eruce. Fertur, & altera magudaris in Libia nasci, radix laserpitio similis, sed minus crassa, acris, & fungosa, ex qua non profluit succus. Eiusdem cum laserpitio facultatis.

Sagapenum. CAP. LXXIX.

Sagapenum ferulacea herba succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, et intus albo, nescio quid inter laser, & galbanum redolens, gustu acris. Prodest laterum, & pectoris doloribus, tussibus vetustis, conuulsis, & ruptis, crassam pulmonis pituitā expurgat. Detur comitialibus, opisthotonicis, lienosis: item contra neruorum resolutionem, perfrictione, & febrium circuitus in potu. In vnguenta probè admittitur. menses pellit, sed factum exanimat, cum hydromelite potum. Prodest ex vino haustum, serpentium icibus.

olfactum ex aceto vulnarum strangulatus excitat: oculorum cicatrices, offusam caliginem, heretudines, suffusionesq; detergit. Resoluitur ut laser, ruta, aqua, & amaris amygdalis aut melle, aut calido pane.

Euphorbium. CAP. LXXX.

Euphorbium Libyca arbor est, ferula speciem habens, quae in Tmolo iuxta Mauritaniam inuenitur. Ea acerrimo succo turget. Cuius eximium feruorem expauescentes incolae, ouillos ventres elutos, arbori circumligant, & eminus caulem contis incidunt, confestimq; è plaga, perinde atque vase quodam, in vetriculos copiosus lactis humor effluit, praeter id quod humi sparsum, vulnus ciaculatur. Duo succi genera: vnum orobi magnitudine, sarcocolla modo emicat: alterum in vetriculis concrefcit, atque vitreum spectatur. Eligendum est translucens, & acre. Euphorbium adulteratur sarcocolla, & glutini mistione. Sed difficile quidem experimentum: quippe cum leui gustu, os accessum diu detineat, adeo ut quicquid ori obijciatur, planè euphorbiū resipiat. Eius inuētio tēpore Iubae regis Libyae cognita extitit. Succus illitu suffusiones discutit, potus tota die exurit: quare melli, collyrijsq; pro acrimoniae ratione admisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera potione haustus. squamas ostium eadem die eximit: verum eo videntes, necesse est linamentis, aut ce-

ratū

ratis communire corpus, quo ossa conuestiuntur. Aliqui memoria prodiderunt, percussos à serpente nihil molesti passuros, si incisa osse tenus capitis cute, intritus succus infundatur, vulnusq; postea consuatur.

Galbanum. CAP. LXXXI.

Galbanū succus est nascentis in Syria ferula, quod nonnulli metopium vocant. Maxime laudatur cartilaginosum, merum thuris effigiem præbēs, pingue, minime lignosum, retinēs nonnihil adiecti seminis, & ferula, graui odore, neque valde humidum, neque nimis aridum. Adulteratur faba fresa, resina, & ammoniaco. Galbanum excalfacit, vrit, extrahit, disintit: menses, ac partus trahit appositū, vel suffitū. lentigines aceto, & nitro perūctas tollit. Venoratur ad tuſsim veterem, difficultatē spirādī, si spiria, rupta, conuulsa. Aduersatur toxicis, potū cum vno, & myrrha: simili modo sumptū mortuos partus extrahit. Imponitur lateris doloribus, & furūculis: comitiales, & vulua strāgula tus: & vertiginosos olfactu suscitāt. Si vratur, fugat nidore serpentes, & perunclos feriri non patitur. Serpentes cū oleo, & sphōdylo circumpositum, necat: dentium dolorem oblitum, aut cauernis inditū, mitigat. vrinae difficili prodesse existimatur. Resoluitur ad potiones amaris amygdalis, aqua, aut ruta, aut calido pane. multa re: aliās meconio, are vsto, aut felle liqui-

do. Si purgare Galbanum voles, in feruentem aquam demittito. nãque cùm liquefactum fuerit, eius sordes fluitabunt: quas hoc modo faciliẽ separabis. Mundo linteo, raroq; alligatum in fœhili, aut creta pyxide ita pendeat, vt imum vasis ne tangat: opertioque vase in feruidam aquã demittito: sic enim syncerum, veluti per colũ eliquescet, & lignosum in linteo remanebit.

Ammoniacum. CAP. LXXXII.

Ammoniaceum ferula succus est, quam iuxta Cyrenen Aphrica gignit: cuius fruticẽ cum radice agasyllim vocant. Probaturn bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, dẽsum, syncerum, nulla sordẽ spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. Hoc genus thrausma, id est, friaturã appellant: quod verò terram, & calculos collegit, phyrãma. Gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succũ stillãte ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit: tubercula, duritiasq; discutit. potum aluum soluit, partus extrahit: lienem cõsumit, drachmæ pondere hauẽtum: articularum, coxendicumq; doloribus liberat. Auxilio est anhelatoribus, orthopnocis, comitialibus: item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum ptisana succo sorbeatur. Cruẽtam vrinam pellit, albugines oculorũ absterget, genarum scabritiam absomit: tritum autem cũ aceto, & impositum, iocineris, lienisq; duri

fluritas sedat. discutit tophos, qui in artubus
concalluerunt, cum melle, aut cum pice illitum.
Lassitudines, & coxendicum dolores eo perungi
utile est, cum nitro, & cyprino oleo, vice acopi.

Sarcocolla. CAP. LXXXIII.

Sarcocolla lacryma est arboris in Perside na-
scentis, pollini thuris similis, rufa, gustu ama-
ra. Vulnera glutinat, oculorum fluxiones inhi-
bet. emplastris inseritur. Adulteratur admix-
to gummi.

Glaucium. CAP. LXXXIII.

Glaucium succus est herbae, quae ad Hierapo-
lim Syria nascitur, folijs serè corniculati pa-
paueris, pinguioribus tamen, in terram sparsis,
odoris tetri, gustus amari, tota crocei succo ma-
det. Folia in olla fictili semisfrigidis clibanis cal-
faciunt indigena, vsque dum flaccescant: deinde
contusis succum exprimunt. Cuius est vsus ad
oculorum medicamenta, vtpotecum inter ini-
tia refrigeret.

Glutinum. CAP. LXXXV.

Glutinum, quod xylocollan, alij taurocollan
vocat, praestantissimum Rhodiaceum, quod
ex bubulis corijs, conficitur. Id candidum est, &
translucens. Nigrum verò minus probatur. Re-
solutum in aceto, impetigines, leprasq; cutis de-
let: ambustis igni ex aqua calida dilutum, illi-
tumq; pustulas erumpere non patitur. Vulneri-
bus prodest melle, aut aceto madefactum.

Pissi

Piscium glutinum. CAP. LXXXVI.

Piscium glutem, venter est piscis cetacei. Praestat candicans, natione Ponticum subaspermum, minimè scabrum, et quod celerrimè liquefit. Vtile emplastris capitis, & leprarum medicaminibus, & tetanotbris, quae cutem faciei erugant, & extendunt.

Viscum. CAP. LXXXVII.

Viscum optimum est recens, intus porraceum, extrà fuluū. quod asperi nihil, aut surfurosi conceperit. Fit acinis in quercu nascentibus, buxæo fruticis folio: Contusum acinum lauant, & postea in aqua decoquunt. Sunt qui commaducando ipsum efficiant. Gignitur quoque in malo, pyro, & plerisque alijs arboribus. quinetiā inuenitur in quorundā fruticū radicibus. Emollit, discutit, extrahit, parotidas, tubercula ceterasq; collectiones ad maturitatem perducit, cum resina & pari cera mixtum: epinyctidas in splenio sanat: vetera vlcera, abscessusq; quos cacoëthes vocāt, ex thure mollit. Lienem cum calce, gagate, aut Asio lapide coctum, & impositū absomit: cū sandaracha, aut auripigmento illitū, vngues extrahit. mixtum cum calce, & vini fece, suam vim intendit.

Aparine. CAP. LXXXVIII.

Aparine ramis multis, & paruis fruticat, asperis, quadrangulis, per intervalla orbiculato foliorum ambitu, vt in rubia: flos albus: semen

semen durum, rotundum concavum, album, vmbilici figura, asperitate vestium tenaci. Ea pastores coli vice vtuntur ad eximendos è lacte pilos. Seminis, caulium, ac foliorum succus, potu cōtra viperarum, phalangiorumq; morsus auxiliatur: infusu aurium dolori medetur. Herba cum oxungia trita, strumas discutit.

Alyssum. CAP. LXXXIX.

Alysson exiguus frutex est, vnicaulis, subasper, rotūdis folijs: fructu dupliciū scutorū effigie, in quo est semen quadātenus latum. In montibus, & asperis locis emicat. Eius decoctū singultus sine febris, potu discutit: idem efficit, si quis eam aut teneat, aut doretur. cū melle trita vitia cutis in facie, & lentigines emendat. Contusa in edulio rabiei canis mederi putatur. domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus, atque brutis fascini amuletū. Purpureo linteo circumligata, pecorum morbos abigit.

Asclepias. CAP. XC.

Asclepias, ramos emittit lōgos: folia hederæ, longa: radices numerosas, tenues, odoratas: floris virus graue: semen securidacæ. nascitur in montibus. Radices ex vino potæ torminibus auxiliantur, & contra serpentium ictus. Folia aduersus vuluæ, mammarumq; vlcera, quæ cacoëthe vocant, illinuntur.

Atractylis. CAP. XCI.

Atractylis, spina est cnico similis, folia multò longio

longiora ferens in summis virgis, magna parte nudæ, asperaq; , qua feminae profusis vtuntur. capitula in cacumine spinis horrent: flos luteus, quibusdam in locis purpureus inuenitur: radix tenuis, supernacua. Coma, semen, & folia cum pipere, & vino teruntur vtilissimè contra scorpionum iclus. Percussos tradunt, quandiu ea teneatur herba, nullum experiri dolorem, ipsumq; deposita statim recrudescere.

Polycnemum. CAP. XCII.

Polycnemon, frutex est surculosus, folijs organici caule, vt pulegij, geniculis multis intercepto, sine umbella, tenui tamen in cacumine corymbo, boni odoris, & acris. Vulneribus agglutinandis recens, aut aridum, cum aqua efficaciter illinitur: sed quinto die solui debet. ad vrine stillicida, ruptaq; cum vino bibitur.

Clynopodium. CAP. XCIII.

Clynopodion frutex est folijs serpyllo similis, surculosus, duum dodrantum altitudine. Nasitur in petrosis. Flores, marrubij modo, ex intervallis distincti speciem lecti pedum præbent. Bibitur herba, & succi eius decoctum, ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium iclus: menses, & partus pellit: & pensiles verrucas, quas acrochordonas vocant, eijcit, aliquot diebus potum. Alium sistit decoctum ad tertias, potumq; si febrim sentiunt, ex aqua, alioquin, ex viue.

Leontopetalum. CAP. XCIII.

Leontopetalon, caulem emittit dodrantalem, aut altiore, plurimis alijs concavum, te in cacumine semina parua duo, aut tria, in siliquis, diceris modo: flores anemone similes, punice coloris: folia brassica: sed papaveris diuisura: radicibus nigris, rapae similibus, strumosis. Nascitur in aruis, et segetibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus, ex vino pota: nec alia res celerius dolorem finit. miscetur ischiadicorum clysteribus.

Teucrium. CAP. XCV.

Teucrium, siue, vt alijs placet, teucrium, herba est virgae referens effigiem, trissaginis similitudine, tenuifolio, non multum à cinere alieno. Hac in Cilicia iuxta Gentiadem, Cissademq; vbertim prouenit. Recens cum posca, aut arida feruesacta ius potu lienem potenter absomit. Lienosis cum aceto, & ficis illinitur: item serpentium morsibus ex aceto solo sine ficis.

Trissago. CAP. XCVI.

Chamædrys Græcis, alijs chamædrops, Latinis trissago dicitur. Sunt qui eam teucrium appellauere, propter eam quam cum teucrio seruat similitudinem. Nascitur in petrosis, & asperis. Frutex est dodrantalis, folia habens exigua, amara, esigie & diuisura quercus, flore paruo, penè purpureo. Carpitur semine pgnans. Recens in aqua decocta, potu tuſibus, indurato
lien

lieni, vrinae difficultati, incipientibus hydropicis: auxiliatur: cit menses, partus extrahit: liem ex aceto pota consumit: aduersus serpentium venena ex vino, potu, illituq; efficacissima. Trita digeritur in pastillos, ad supradicta. purgat vetera vlcera, cum oleo illita, caliginem oculorum discutit. natura eius est calfacere.

Leucas. CAP. XC VII.

Lucas mōtana, latioribus quā urbana solijs, semine acriore, amariore, ori ingrato, efficacior tamen quā satua habetur. Vtraque ex vino contra animalium venena, praeipue marinorum, opitulatur.

Lychnis. CAP. XC VIII.

Lychnis coronaria, flore est albæ violæ similis, sed purpureo: quo carollæ factitatur. Contra scorpionum ictus semen in vino potum auxiliatur. Lychinis syluestris, omnia urbana similis. Bilem per aluum detrahīt, semine duabus drachmis poto, ictis à scorpione subuenit. Aiunt huius herbæ appositu scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi.

Lilium. CAP. XC IX.

Lilia coronamenti se dedunt, Liria à quibusdam vocata. E quibus vnguentum temperatur, quod aliqui lirinum, alij susinum appellant. neruos, & priuatim vuluæ duritias emolliens Folia herbæ illita, contra serpentium ictus auxiliatur, feruefacta ambustis proficiunt:

aceto

aceto cōdita vulneribus opitulantur. Succus ad-
iecto melle, aut aceto in areo vase coquitur cōue-
nienti medicamento vetustati vlcerū, & ad re-
centia vulnera. Inassata radix, & ex rosaceo
trita, igni ambusta sanat, vuluā emollit, men-
ses ciet, vlcera cicatrice obducit. Cum melle de-
trita nervis præcisis, luxatisq; medetur: vitiligi-
nes, fursures, & lepras emēdat: vlceraq; in capī
te manātia expurgat: abstergit faciem, & eru-
gat. teritur in acetocū hyoscyami folijs, et farina
tritici mulcendis testīū inflāmationibus. Semen
potū morsibus serpentīū aduersatur. Ignibus sa-
cris semē, & folia cū vino illinūtur. Tradūt &
purpurea esse lilia. In Syria autem, & Pisidia
Pamphilia efficacissima vnguentis nascuntur.

Ballote. C A P. C.

Balloten, nomine alio nigrum marrubiū vo-
cant. Caules edit quadrāgulos, nigros, sub-
hirsutos, compures ex vna radice: folijs maiori-
bus, quā marrubij, hispidis, per intervalla in
caule dispositis, subrotundis, †graneolētibus, a-
piastro proximis: vnde aliqui apiastrum eā vo-
cauerūt. candidi flores vniuersi verticillato am-
bitu caulem coronāt. Vis eius efficax aduersus
canis morsus, folijs ex sale illitis. Feruenti cinere
flaccescunt folia, vt condylomata reprimant:
purgant. & sordida vlcera cum melle.

† In Oribasij codice manu scripto hic in-
teriectum legitur verbum μέλανα, quod.

folia quoque Ballotæ nigra reddit. Nec temerè fortassis illud quis adijciendū putabit, quòd pulchrè alteri eius nomini cōueniat, quòdque ipsius meminerit Plinius libro xxvij. cap. viij. cū inqt. Ballote folijs est marrubij maiorib. & nigrioribus.

Apiastrum. CAP. CI.

Melissophilon, siue melittana, id est, apiastrum, id sibi nomen vsurpauit, quoniam apes ipsa herba delectantur. Cauliculi, & folia ballotæ, de qua paulò antè diximus, similia essent, nisi maiora, tenuioraq; nec ita hirsuta spectarentur: citreum malum olent. Folia cum uino pota, aut illita prosunt, contra ictus phalangiorum, scorpionumq; : item aduersus canis morsum. Decocto eorundem gratia, foueri prodest: desensionibus sceminarum ad ciuandos menses conuenit: dentes eodem in dolore colluntur. dysentericus infunditur. Fungorum strangulationibus folia, addito nitro, potu auxiliantur: torminibus, & orthopnoicis delinctu. Illita cum sale strumas discutunt, vlcera purgant: articulares dolores illita sedant.

Marrubium. CAP. CII.

Marrubium, frutex est ab radice ramosus. candicans, subhirsutus, quadrangulatis ramis: folium pollicem æquat, subrotundum

dum, hispidum, rugosum, gustu amaro: semen in caulibus, & ex internodiis: flores verticillato ambitu, asperi. Nascitur propter adificia, ruinas, & rudera. Huius folia sicca cum semine decocta in aqua, aut viridium succus datur cum melle suspensio, tussientibus, & ad tabitudinem redactis. Crassam è pectore pituitam cum sicca Iri eijcit, mulieribus à partu non purgatis datur, ut menstrua, & secundas extrahat: item in difficili partu, & his qui venena hauserunt, aut à serpentibus demorsi sunt, vesicam, renesque ledit. Folia cum melle illinuntur sordidis ulceribus purgandis: pterygia, nomaque sistunt. laterum dolores mitigant. Succus folijs contusis expressus, & sole coactus, ad eadem pollet: cum vino, & melle illitus oculorum claritatem adiuvat: naribus regium morbum expurgat. aurium doloribus conuenienter instillatur per se, aut cum rosaceo.

Stachys.

CAP. CIII.

Stachys, frutex est marrubio similis, sed longior, folia serēs numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi: & complures virgas ab vna radice exeuntes, marrubio cãdidiore. Nascitur in montibus, & asperis. Vinum habet exaltatoria, & acrem. Foliorum decoctum potu pellit menstrua, & secundas.

Phyllitis.

CAP. CIIII.

Phyllitis folia promit rumici similia;

longiora, & viridiora, sena, aut septena, reteta, quæ parte anteriore lauiâ cernuntur, à tergo autem pensiles quasi vermiculos tenues ostendunt. In vmbrosis, & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbo. Neque caulem, neque florē, neque semen profert. Folia in vino pota serpentium morsibus aduersantur. quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: & si dysenteria, aut resoluta aluus excercet, potui datur.

Phalangium.

CAP. CV.

Phalangium, à quibusdā phalangites, ab alijs leucantatha vocatur. Ramuli sunt ei duo, aut tres, pluresve in diuersa tendentes: flos candidus, lilio similis, multas incisuras habēs: semine nigro, † lato, ad lenticulæ dimidiatæ figuram, multò tenuiore: radice parua, tenui, herbaei coloris, dum à terra eruitur. prouenit in collibus. Huius folia, semen, flos cum vino pota, auxiliantur contra scorpionum, phalangiorumque ictus: tormina quoque discutunt.

† Si quis Græca Dioscoridis exemplaria consulat, hic non πλατὺν, hoc est latū, sed παχὺν, quod est crassum, scriptū reperiet. Quod si præterea ea legat, quæ ex Plinio in commentario retulimus, deprehendet Ruellium in vertendo secutum fuisse Plinium, ex eoque vocē illam reddidisse.

Trifolium.

CAP. CVI.

Trifo

Trisoliū, Græci triphyllon, alij oxytriphyl-
lon, alij menyantes, alij asphaltion, vo-
cant. Frutex supra cubiti altitudinē attollitur,
virgas habens tenues, iunceas, & nigras, vnde
ramulares enascuntur appendiculæ, in quibus
terna singulis germinationibus exeūt folia, loto
arbori similia, ijs recenter enatis rutæ odor inest,
ubi autem adoleuerunt, bitumen olent. Florem
edit purpureū: semen quadantenus latum, sub-
hirsutum, ex altera extremitate exertum, an-
tēna modo corniculum gerens. Radix tenuis, lō-
ga, valida. Semen, & folia in aqua pota pleuri-
ticis, vrinæ difficultati, comitialibus, & ijs qui
aqua inter cutem principia sentiunt, fœminis
quoque vuluæ vit ijs oportunis, auxiliatur: mē-
ses ciunt. ternæ drachmæ è semine dari debent,
è folijs verò quaternæ. Cōtra serpentiiū iclus tri-
ta folia, & ex aceto mulso pota, prasidio sunt.
Tradunt aliqui, totius fructicis, radice, folio-
rumq; decoctum fœtu dolores eorum finire, quos
serpentes percusserint. qua autē aqua sanatus
quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui vl-
tus habuerit, perinde afficitur, vt à serpente de-
morsus. Quidam terna folia, aut semina in ter-
tianiis, cum vino potui dedere: & in quartaniis
quaternæ, vt quæ februm circuitus discuterent.
Radix antidotis inseritur.

D Polium. CAP. CVII.

Vo genera polij. Montanū, cui tenthrio

nomē est, & cuius est vsus, tenuis frutex est candidus, dodrantalis, semine refertus: capitulo in cacumine quadam corymborum speciem praeferente, paruo, cano hominis capillo simili, grauitate olente, non sine quadam suauitate. Alium fruticosius, non vsque adeo valens odore, & viribus infirmius. Potum feruesacti ius auxiliatur serpentium ictibus, hydropicis, morbo regio: & lientosis ex aceto: stomachum male habet caput doloribus afficit: aliu, & menses ciet. Substratum, suffitumve serpentes abigit: illum vulnera conglutinat.

Scordium.

CAP. CVIII.

Scordium in montibus, & palustribus, nascitur, folijs trissaginis, maioribus, non sic in ambitu diuisis, aliquantū cellia redolentibus, gustu amaris, & astringētibus: quadrangulis uulnibus: subrubro flore. Herba vim excoctoria habet: urinam cit. Cocta recens, aridave cum vino, aduersus venenatos serpentium morsus bibitur: ad stomachi quoque rofiones, dysenteriam, & urinae difficultatem, binis drachmis cum hydromelite: crassamen purulētum, pectore expulit. Facit arida farina ad veterem tussim, rupta, conuulsa: si cum nasturtio, melle, & resina misceatur in eclegmate. Inflammata modicè praecordia, cerato excepta, recreat: cū aceto acri, aut aqua, podagris cōuenienter illinitur: menses imposita mouet, vulnera conglutinat, vetera ulce-

ra purgat, & ex melle cicatricem perdu.it. Sic-
ca excrementias in carne cohibet. Succus ad eadē
vitia bibitur. Inter prima efficax Ponticū na-
tione, Creticūque.

Tussilago. CAP. CIX.

Tussilagin: folia sunt maiuscula: quā hede-^o Vulgo
ra, sex aut septem à radice, subalbida à ter-^o ungula
ra, supernè virentia, in plures angulos exeūtia. caballi-
Caulis palmum altus: flos luteus, vere prodit, na.
quo vnà cum caule confestim exuitur: inde vō-
nulli his vacare existimarunt. Radix tenuis est,
& supernacua nascitur in amarus & riguis,
Folia ex melle trita igni sacro, & omnibus in-
flammationibus illitu medentur. Arida suffitu,
ita vt sumus per infundibulū hianti ore rapia-
tur, hos sanāt, qui sicca tussi, atque orthopncea
insestantur: pectoris vomicas rumpūt. Eundem
effectum prabet suffita radix. decota in hydro-
melite, & pota, emortuos partus eijcit.

Artemisia. CAP. CX.

Artemisia magna ex parte in maritimis
nascitur, absinthij modo fruticosa, maio-
ribus, & pinguioribus folijs, ramisq;. Huius
quidem genera duo. Vnū latius, habitiusq;, so-
lijs, virgisq; latioribus. Alterum tenuius, flore
paruo, tenui, candido, graueolente, aestate floret.
Sūt qui in mediterraneis vnicaulis nomine ap-
pellent tenuē herbulā, simplici caule, et minuto,
aribus scatente tenuibus, flauo colore. hac in-

cundiores quàm præcedens efflat odorẽ. Vtraq;
excalfacit, extenuat. feruesacta conuenienter
in muliebres defessus adijciuntur, ad detrahen-
dos menses, partus, secundasq; item ad præclu-
siones vuluæ, & eiusdem inflamationes: calcu-
los comminuunt, remoratã vrinam cient, menses
pellunt pubi iilita. Succus vuluæ inditus ex myr-
rha eadem, quæ in seßio trahit. Coma tribus
drachmis eorundem educendorũ gratia bibitur.

Artemisia tenui folia. CAP. CXI.

Artemisia tenuifolia in sepibus, & cultis
iuxta aquarum ductus nascitur. Eius flo-
res, & folia contrita sampsuchi odorem reddũt.
Siquis stomacho laborans, herbã cũ amygdalino
oleo bene contundat in malagmatis lentore, &
stomacho imponat, sanitati restituetur. Qui
neruorum quoque dolore cruciatur, si succũ eius
cum oleo rosaceo miscens illinat, sanatur.

Ambrosia. CAP. CXII.

Ambrosia pusillus frutex est, ramosus, trium
parmorũ altitudine: folijs rupta, circa imũ
caulẽ exiguis: cauliculi s. minibus, perinde qua-
si racemulis grauidi, qui nunquam florem pa-
riunt, odore vinoso, suauis: radice tenui, sesquipe-
dali. Coronantur ea Capadoces. Vis eius reprime-
re, ac repellere, & illitu adstringere humores,
qui in aliquam partem incumbunt.

Botrys. CAP. CXIII.

BOtrys fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa: semen circa totos ramulos provenit: folia cichorio similia, tota suauem odorem spirat, quare vestimentis interponitur. Inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Pota orihopnceas mulcet. Hanc Cappadoces ambrosiam vocant, alij artemissiam.

Geranium. CAP. CXIIII.

Geranium folijs anemones, diuisuris longioribus: radice subrotunda, cum estur dulci. Quæ drachmæ pondere in vino puta vuluæ inflationes discutit. Geranium alterum, caulibus minutis, & pilosis, sesquipedalibus, folijs maluæ in summis alis sursum spectantia gruum capitula insunt, cum suis rostris, aut canini dentes. Nullius in medicina vsus.

Gnaphalium. CAP. CXV.

Gnaphalijs folijs albis, molibusq; aliqui pro tomento vtuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino austero ad dysenteriam.

Typha CAP. CXVI.

TYpha jolium edit cyperidis simile, caulem album leuem, aquabilem: florē in cacumine æbentem, densum, qui in pappos soluitur, quod pappum etiam aliqui nuntiant. Huius herbe flos succa lype et oro exceptus, ambustis medetur. Gignitur in palustribus, & aquis stagnantibus.

Circæa. CAP. CXVII.

Circæa, quæ & dirceam aliqui vocant, folijs est hortensis solani, agnatis crebris: flore nigro, pusillo, copioso: semine milij, nascente in quibusdā in veluti corniculis: dodrantalī radice, triplici ferme, aut quadruplici, cādida, odorata, excafaciente. Nascitur in apricis, saxis, & vêtis perflatis. Radicis tusa posido quatuor, in sextarijs tribus vini dulcis per diem, & noctem macerantur, potuq; triduo vulvas expurgant. Semē in sorbitionibus datum lacte mammas nutrium explet.

Oenanthe. CAP. CXVIII.

Oenanthe folia habet pastinaca: florem candidum: caulem crassum, palmi altitudine: seminat triplicis: radicem magnam, in multa rotunda capitula extuberantem. nascitur in petris. Huius semē, caulis, & folia cum mulso vino posita, secundas eijciunt. Radix ē vino vrine stillicidio conuenit.

Conyzzæ. CAP. CXIX.

* Vulgò **C**onycæ duo genera, quæ parua vocatur & pulicaria. Conyca minore præstātor est: maior verò frutice altior, & folijs latioribus, graui odore. Vtriusq; folia oliuæ similia, hirsuta, pingua. ī maiore caulis binū cubitorū altitudine attollit, in minore pedē aequat. flos fragilis, lutei coloris, qui in pappū abit. radices supracuæ. Suffitu substratuq; fuitex totus serpētes fugat, culices abigit et pulues necat

neat. Folia convenienter illiuntur serpentium plagis, & tuberculis, ac vulneribus. Flores & folia cum vino ad menses, partusq; eijciendos bibuntur: item contra vrinae stillitidie, & quatuor morbum, & tormina comitiales pota ex aceto adiuuant. Decoctum in d'seſſionibus medetur vuluæ malis. Impositus succus abortum facit. Herba ex oleo efficaciter horroribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat. Est & tertiū conyza genus, caule craſſiore, ac molliore: folijs medie inter maiorem, & minorem amplitudinis: minimè pinguis, multo tamen grauioris odoris, & mucundioris, sed inefficacior. Prouenit locis humentibus.

Hemerocallis. CAP. CXX.

Hemerocallis folium, & caulem habet lilij herbacei coloris vt porrum: flores in caule per singulos exortus, terni aut quaterni erumpunt, lilij diuisura, quoties dehiscere cœperunt, colore perquam palido: radix magna est, atque bulbosa. Quæ pota, aut cum melle, & lana in pessa apposita, aquam educit, & sanguinem. Folia trita mammarum inflammationes à partu contractas, oculorumq; collectiones mitigant. Radix, & folia igni ambustis vtillissimè illinuntur.

Leucoiū siue alba viola. CAP. CXXI.

Leucoiū vulgare est notitia. sed in floribus differentia quadam: nanque aut cerulei,
and

aut albi, aut purpurei, aut lutei, inueniuntur. Luteum verò præcipui in medicina vsus. Huius aridi flores seruati in desessationibus, valent contra vuluæ inflammationes, & menstrua expellunt: sanant oris vlcera, cum melle: cum cerato, rimas sedis. Semen duum drachmarum pondere ex vino potum, aut cum melle inditum, menses secundas, & partus extrahit. Radices cum aceto illitæ, lienem reprimunt, & podagricos iuuant.

Cratægonum. CAP. CXXII.

Cratægonum, siue, vt alijs placet, cratæon, folijs melampyro simile est, multis calamis ex vna radice emicantibus, multorumq; geniculorum: semine milij. Nasitur in opacis, & frutuosiss parte plurima: summopere acre. Traditum est à quibusdam, hoc si bibat ieiuno ore, ter die post menses purgatos, tribus obolis, in cyathis aqua duobus mulier, ante conceptum quadraginta diebus: & vir modo consimili, totidem diebus ante coitum hauriat, virilis sexus partum futurum.

Phyllon. CAP. CXXIII.

Phyllum, quod eleophyllum vocatur, in saxosis nascitur, duum generum est. Quod autem thelygonum appellant, prouenit musci modo, folio oleæ, sed colore magis herbaceo: caule tenui, breui: radice exili. florẽ albũ profert: semen papaueris, maiusculum. Sed arrhenogonum satera huic simile, solo fructu distat: habet enim

race

racemosum quiddam deflorentibus oleis non dissimile. Arrhenogonon potu, masculi sexus facere partus: vt, thelygonon fæminei, proditur. Horum Crateuas. author est. Sed huiusmodi historiâtenus mihi produxisse visum est.

Testiculus. CAP. CXXIII.

Testiculus, quem Græci cynosorchin vocât. folijs circa caulem, & ima eius parte in terra stratis, olea molli similibus, longioribus, angustioribus, leuibus: caule dodrantali: floribus purpureis: radice bulbosa, oblonga, oliua modo angusta, duplici ordine: superiore, quæ plenior est, inferiore, quæ melior, ac rugosior. Eduntur radices coctæ, vt bulbi. Ex quibus si maiorem edant viri, mares generari dicuntur: si minorem fœminæ alterû sexum. Addût, in Thessalia mollem mulieres in lacte caprino bibere, ad stimulandos coitus: aridam verò ad inhibendos. & alterum alterius potu resolui. Nasçitur in petrosis, & sabuletis.

Testiculus alter. CAP. CXXV.

Testiculus alter alio nomine serapias, Andrea autore vocatur: quoniam radix ad multa utilis sit. Folijs est porri, latioribus, oblongis, pinguibus, ex alarû sinu inflexis: caule palmeo: floribus penè purpureis: radice testiculus simili. Quæ illita tumores, discutit, vlcera purgat. & serpere eadem non patitur: abolet fistulas. & illitis inflammationes leuit. Aridæ radices.

nomas inhibent: sanāt q̄; putredines, & oris vlcera cacoethe: aluum sistunt è vino potæ. De hac eadem quæ de testiculo canis, produntur.

Satyrium. CAP. CXXVI.

Satyrium aliqui trifolium vocant, quoniam tria fert folia, ad terram infracta, rumici, aut lilio similia, minora tamen, ac rubra: caule cubitalem, nudum: florē lilij effigie, candidum: radicem bulbosam, mali magnitudine, fuluam, intus vt ouum candidam, gustanti dulcem, et ori nō ingratam. Quam in vino nigro austero bibere conuenit. contra opisthotonum. Utendum ea dum concumbendi incescit cupiditas, siquidē ea proniores ad venerem fieri affirmant.

Satyrium erythronium.

CAP. CXXVII.

Et alterum Satyrium erythroniū, siue erytrhaicon, id est rubrum, semine lini, maiore, duro, leui, splendente. quod fertur non secus atque scincus, libidinem excitare. Cortice radice gracili, rufo: intus autem album includitur, sapore dulci, non ingrato ori. In montosis, & apicis enascitur. Venerem, vt produnt, si omnino manu teneatur radix stimulat: eoq̄; magis, si hibatur in vino.

Horminum. CAP. CXXVIII.

Horminum satium herba est folijs marubio similis: caule semicubitali, quadrangulo, circa quem eminentiæ siliquis similes produnt

deunt, quæ ad radicem spectant, in quibus di-
uersum semen recluditur. Si quidam in syluestri
rotundum, fuscumq; inuenitur: in altero nigrū,
& oblongum, cuius est vsus. Ad vencrem stimu-
landam, cum vino bibi volunt. Purgat cū mel-
le argemas, albuginesq; illitum ex aqua tumo-
res discutit: eo etiam extrahuntur aculei ex cor-
pore. Idē effectus est illita herba. Syluestre magis
viribus pollet: quare vnguetis, præsertim gleuci
no permiscetur. Hedyfarū. CAP. CXXIX.

Hedyfaron, quod vnguentarij pelcinum, id
est, securidacem vocant, frutex est, folijs ci-
teris: semen rufum in siliquis fert, corniculorum
modo aduncis, quod ancipitē securim æmulator,
vnde nomen accepit: amarū gustu. Stomacho v-
tile in potu, Additur antidota. Cum melle ante
coitum subditum, concipicndi spem adimit. Na-
scitur in segetibus et hordeis.

Onosma. CAP. CXXX.

Onosma oblonga folia habet, ad similitu-
dinem anchusæ, longitudine quatuor di-
gitorum, & vnius latitudinis, mollia, in terra
iacētia sine caule, sine semine: sine flore. radice ni-
titur oblonga, tenui, infirma, rubescēte. gigni-
tur in asperis. Folia in vino pota, partus extra-
hant. Prægnans, si eam supergrediatur, abortiō
facere dicitur.

Nymphæa. CAP. CXXXI.

Nymphæa nascitur in paludibus et stagnanti-
bus

bus aquis, folijs fabæ Aegyptiæ, minoribus, & longioribus, alijs in summa aqua, alijs demersis, pluribus ex radice eadem prodeuntibus: flore lili simili, albo, & in medio crocos habente cum defloruerit, vt rotundū malum, aut papaueris caput, extuberat: nigro semine, denso, & lato, lenti gustus. Caulis ast lauis, niger, minimè crassus, Aegyptiæ fabæ cognatus: radix nigra, scabra, clauæ similis, quæ autumno secatur. Sicca cum vino pota cœliacis, dysentericisq; auxiliatur, & lienem absumit. Radix stomachi, ac vesicæ doloribus illinitur: vitiliginis ex aqua emendat: imposita cum pice, alopecis medetur. eadem contra veneris insomnia bibitur: siquidē ea prorsus adimit. pota assiduè aliquot diebus, genitalē infirmat. Idem semen potum efficit. Nympha nomen sibi vēdicasse videtur, quoniam aquosa, amet. Plurima inuenitur in Elide, in Auygro, Amne, & in Bœotia Aliarto.

Nymphaea altera. CAP. CXXXII.

Est et altera nymphaea, cuius flos biephara dicitur. folijs antedictæ: radice alba, scabra: flore luteo, nitente, rosæ simili. Huius semen, & radix contra seminarum profusua efficaciter, ex vino n. gre bibuntur. Nasitur in Iheffalia amne, Peneo.

Androsaces. CAP. CXXXIII.

Androsaces herba est amara, tenues spargēs iuncos, sine folijs, folliculos in capitulis. hai

habens, in quibus semen continetur. Gignitur in Syria maritimis. Ea drachmis duabus in vino pota, copiosam hydropicis urinam ciet. Idem effectus est semini pota, & herba decocto: podagris vtiliter illinitur.

Asplenium. CAP. CXXXIII.

Asplenium aliqui scolopendrium vocant, alij splenion, alij hemionium: folijs est multis, scolopendra animali similibus, ab radice vna prodeuntibus. Nasitur in parietibus, saxiſq; siliceis: & opacis: nec caulem, nec florem, nec semen habet. Folia polypodij modo diuiduntur, subter flauescencia hirsutaq; supernè viridia. Vim hæc habent folia in aceto feruesacta, vt per dies quadraginta pota lienem assumant: quibus etiam contritis lienem ex vino illini oportet. stranguaria, & regio morbo prodest. singultu sedat, calculos in vesica comminuit. Conceptum adimere creditur, per sese, aut cū muli liene appensa. Tradunt noctu, silente luna, huius rei gratia effodiendam. Hemionitis. CAP. CXXXV.

Hemionitis, quam aliqui splenion vocant, solum emittit dracunculi, lunatum: radicibus cohaeret multis tenuibus: nunquam flores, neque semen, neque caulem gignit. in petrosiſ nascitur, austero sapore. Ea ex aceto pota lienem absomit.

Anthyllis. CAP. CXXXVI.

Anthyllis duplex est, quadam enim lenti si
v mil

millima, folijs mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine: radice parua, tenui. Nasctur in salstis terris, & à sole illustratis, non in sulso gustu. Altera est folijs, ramulisq; aiuga similis, hirsutioribus tamē, breuioribus, & asperioribus: flore purpureo, odori admodū grauis: radice cichorij. Pota drachmis quatuor, vrinae difficultati, renibusq; plurimū prodest. Trita, vulua pituitas emolliunt, cum rosaceo, & lacie imposita, vulnribus medentur. Quae autē aiuga similitudinē refert, prater alia pota cum aceto mulso, comitiales sanat. Anthemis. CAP. CXXXVII.

ANthemidis genera tria, tantū flore distātia: rami dodrantes, fruticosi, alis multiscocauis: tenuibus foliolis, paruis, numerosis: rotundis capitulis: floribus in medio aureis, forinsecus orbiculato ambitu candidis, melinis, aut purpureis, magnitudine foliorū ruta. Nasctur in asperis, & iuxta semitas colligitur vere. Vm habet radices, flores & herba excalsaciendi, extenuandi: Potu, & infusiones, pellunt menstrua, partus, vrinam, calculosq; aduersus inflatantes, & ilei tormenta bibuntur: bilē suffusam expurgat: iocinerū vitia sanant. Ne octo earum vesica fomentur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est, quae florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est. Hanc proprie heranthemon vocant. Ea cui leucanthemo nomen est, item quae chrysanthemon dicitur, vehemen-

tius urinam ciunt. Aegilopijs illitæ medentur: commanducata vlcera eruptiones in ore sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo vtuntur, terunturq; in farinam, ad abigendos febrium circuitus. Flores, & folia recondi debent, & priuatiim tusa, in pastillos digeruntur: radix quoque siccare, dumq; ingruit necessitas, bina partes herbe dari, modò floris aut radice pars vna, modò còtrà floris partes due, & herbe vna, permuta tim duplicato pondere, aliernis diebus bibere autem oportet in vino mulso diluto

Parthenium. CAP. CXXXVIII.

PArthenium, aliqui amaracon vocant, folijs est coriandri, tenuibus: flore per ambitum albo, intus melino, odore subuiroso, sapore amaro. Siccatur, cum aceto mulso, aut sale potum, non secus atque epithymum, & bilem, & pituitam. detrahit: suspiciosus prodest, & melancholicis. Herba sine flore à calculosis & anhelatoribus magna vtilitate bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duritia vuluarum, & inflammationibus. Illinitur sacro igni & collectionibus cum flore.

Buphtthalmum. CAP. CXXXIX.

BVphthaltman, quidam cactham vocant, caules emittit tennes, mollesq;: folia fœniculi: luteum florem anthemide maiorem, oculi similitudine: vnde nomen traxit. Circa oppida nascitur, & in cæpestribus. Flores cū ceriato triti,

tumores, duritiasq; discutiunt. Aiunt epotam post exitum à balneis, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

PAEONIA. CAP. CXL.

PAeonia, siue glycyfide, Græcis aliquibus pentoboron dicitur: sunt qui Idæos datylos radicem pæoniam vocant. Caulis altitudine sesquipedis adolefcit, comitantibus multis stolonibus. Huius duo genera: mas, folia iuglandis habet, in fœmina ῥρό (myrnū) more diuiduntur. Summo caule, siliquas emittit amygdalis similes: in quibus cum dehiscunt, multa grana, exigua, rubra, acinis punicorum similia inueniuntur; et in medio nigra, purpurea quinque aut sex. Radix maris digitali crassitudine, et palmi lōgitudine gustu adstringens, alba. fœmina radicibus ceu glādes circiter septē aut octo inhaerent, vt in hastula regia. Fœminis à partu nō purgatis sicca radix datur: ciet menses amygdala magnitudine pota: ventris doloribus cum vino pota auxiliatur. valet contra regium morbum, & renū, ac vesicæ dolores. decocta in vino aluū sistit. Rubra grana rubentes menses sistunt, decē vel duo decim pota in vino austero, & nigo: stomachicis et erosionibus ea esse prodest: à pueris pota initia calculorum eximunt. Grana nigra auxiliatur suppressionibus nocturnis: vuluæ strangulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua mulsa, aut vino. Nasctur

in altissimis montibus, præruptis.

Lithospermum. CPP. CXLI.

Lithospermum à seminis duritia nomen accepit. Folijs est olea longioribus, & latioribus, mollioribus, iacent humi, quæ ab radice exiliunt: ramulis rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iunci, lignosis: in quorum cacumine bifidi exortus cauliculorum speciem exhibent: folijs longis inter quæ paruum semen, rotundum erui magnitudine, duritia lapidea. Nasitur in asperis, & editis locis, Vim hanc habet, vt semine cum vino albo poto calculos frangat, pellatq; urinam.

Phalaris. CAP. CXLII.

Phalaris cauliculos emittit Zea culmis similes, à minutis, ac nullius vsus radicibus, multos, duñ palmorū, geniculis cinctos, graciliores tamen, ac dulces: semen candidum, oblongum, milij magnitudine. Tunditur, & in aqua aut vino succus ad vesicæ cruciatus vtilissimè bibitur. Semen cochlearis mensura potum, ad eadem efficax est.

Rubia. CAP. CXLIII.

ERythorodanum radix rubra est, qua tingitur lana. Vna sponte provenit: altera fertur, vt in Thebana Gallie, & Rauēna Italia: in Caria inter oleas, vt in aruis, solo creditur. Hæc nō sine questu serunt: nāq; maximū ex ea sentiunt prouentum. Aspericaules, & quadrā-

guli, longi, a farina non dissimiles, robustiores,
 & multò prorsus maiores: folijs per intervalla
 circum articulos, stellatim decussatis. Semen eius
 rotundum, inter initia viride, mox rubrum, po-
 stea cum ematurrit, nigrum: radix tenuis, lon-
 ga, rubra. Vrinā ciet: qua de causa regio morbo
 opitulatur, pota cum aqua mulsā: item ischia-
 dicis, & resolutis. Crassam, copiosamq; vrinam
 pellit, nonnunquam & sanguinem: bibentes ta-
 men quotidie lauare oportet, & excremento-
 rum quæ redduntur differentiam spectare. Ad-
 uersus serpētium morsus ramulos cū solijs vino
 bibere prodest. Semen ex aceto potum, lienē absu-
 mit. Imposita radix trahit partus, menses, se-
 cūdasq; alba vitiligini illita ex aceto medetur.

Lonchitis. CAP. CXLIII.

Lonchitis folia habet porri, latiora, ruben-
 tia, plurima, ad radicem circumfracta, ve-
 luti in terram procumbentia, pauca in caule: in
 quo flores, ceu galericuli, hiantibus comicis per-
 sonis similes, nigri, & è rictu albam exerentes
 velut linguam, quæ ad labrum inferius spectet.
 Semen in uolucris clausum lanceæ simile, trian-
 gulum: vnde sibi cognomentum arrogauit. ra-
 dix dauci. Nasctur in sitientibus, & asperis.
 Radix ex vino pota vrinam ciet.

Lonchitis altera. CAP. CXLV.

Altera est Lōchitis, quam aliqui osperam
 lonchitin dicunt: folia scolopendrij emittit.

tit, sed asperiora, maioraq; , ac multò magis di-
uisa. Vulneribus mirum in modum prodest, in
eisq; inflammationes excitari non patitur.
Pota ex aceto lienem absumit.

Althæ. CAP. CXLV.

Althæ, quam alij Ibisum vocant, in syl- Vulgò Bif
uestrium maluarum genere est, cui folia vt malua.
cyclamino rotunda, lanugine canescunt: flore ro-
sateo: bicubitali caule: radice lenta, intus alba.
Althæa appellatur, quòd inter primas sit utilis,
& pluribus polleat remedijs. Decocta enim in
vino aut aqua mulsæ, & per se cum imponitur
tusa, efficax est contra vulnera: item ad stru-
mas, parotidas, abscessus, mammarum inflam-
mationes, fracta sedis, inflationes, nervorum ri-
gores: siquidem discutit, & excoquit, rumpit,
& ad cicatricem perducit. Cocta, vt dictum est,
adiecto suillo adipe, aut anserino, terebinthi-
næve, vt malagmatis lentor fiat, facit ad vulua
inflammationes, præclusionesq; , in pectu subdita.
Decoctum eodẽ fungitur munere: onera vulua,
reliquiasq; à partu extrahit. Decocta radice
succus ex vino potus, succurrit ruinae difficul-
tati, calculosorum cruditatibus, dysentericis,
ischiadici, tremulis, ruptis, dentiũ muliet dolo-
rem, cum aceto decocta, colluto inde ore. Viride se-
men siccumq; tritum, vitiliginis in sole cum ace-
to perunctas emendat. Eodẽ cum oleo & aceto
peruncti, à venenatis non feriuntur. valet con-

tra dysenteriam, et sanguinis reiectiones, aluiq;
profluuium. In posca, aut vino decoctum bibi-
tur, contra omnes vesparum, apum, similitumq;
aculeatos ictus. Folia cum olei momento, mor-
sibus, & igni ambustus illinuntur. Constat a-
quam, trita radice addita, sub diuo addensari.

Alcea. CAP. CXLV. II.

Alcea syluestrium maluarum generi assi-
gnatur. folia habet diuisa, verbenace pro-
xima: caules tres aut quatuor, cortice cannabi-
no vestitos: florem rosea, paruum: radices albas,
latas, quinque aut sex, cum plurimum cubita-
les. Quae cum vino, aut aqua pota, dysentericis,
ruptisq; medentur.

Cannabis. CAP. CXLV. III.

Cannabis satiuæ planta magni in vita vsus
ad robustissimos funes facitandos: folijs fra-
xini, graui, odore: caulibus proceris, inanibus: se-
mine rotundo. quod largiore cibo genituram ex-
tinguit. Succus ex ea recente conuenienter au-
rium doloribus instillatur. Syluestris cannabis
virgas fert althææ similes, minores, nigriores, et
asperiores, cubiti altitudinem equantes, folio
satiuæ, nigriore, & asperiore: flore lychnidis,
subrubro: semine, & radice althææ. Decocta ra-
dix, illitu inflammationes mulcet, tumores di-
scutit, tofos articulorum dissipat. Huius cortex
torquendis funibus accommodatus.

Anagyris. CAP. CXLIX.

A Nagyris frutex est arboris instar, perquā
 grauis odore: solijs viticis, virgūq; flore
 brassica: semen in corniculis nō breuib; gignit,
 subrotundum, firmum, versicolori facie simile
 renibus, quod durefcit vna maturefciente. Te-
 nera folia trita tumores illitu reprimunt: si par-
 tus hareat, & secundæ, mensesq; morentur,
 drachmæ pondere bibuntur in passo: sic & suspi-
 riosis dantur, & contra capitis dolores in vino.
 difficulter parientibus adalligantur, ita vt à
 partu statim auferantur. Radicis cortex conco-
 quendis, discutiendisq; adhibetur. Semen com-
 manducatum vomitiones vehementer ciet.

Cepæa. CAP. CL.

Cepæa portulacæ similis est, sed nigriora ha-
 bet folia, & radicē tenuem. Folia in vino
 pota vrinæ stillicidio, & vesicæ scabie laboranti-
 bus opitulantur. maximè id præstat, si cum de-
 cocto radicū asparagi eius, quem myacāthor,
 hoc est, corrudam vocant, bibatur.

Alisma. CAP. CLI.

Alisma, alij Damasonion appellant: folia ei
 plantaginis, nisi angustiora essent, † laci-
 niosa, conuexa q; in terram: caule simplici, tenui,
 cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, can-
 dido, pallefciente: radicibus tenuibus, vt veratri
 nigri, acribus, odoratis, modicè pinguib; aquo-
 sos amat tractus. Radix, si drachma vna, aut

altera bibatur, his conuenit, qui leporem ma-
sturnum deuorauerunt, aut à rubetis ranis demorsi
sunt, aut opium hauserunt: terminibus, atque
dysenteria, per se, aut cum pari modo seminis
dauci, potui datur. conuulsis, & contra vitia
vulue prodest. Herba sistit aluum, menstrua
pellit, tumores illita mitigat.

AN NOTATIO.

† Hæc vox non legitur in Græcis codi-
cibus, neque ab Oribasio refertur, neque
etiam à Marcello vertitur. Vnde planè
suspicer, quòd Ruellius ita verbū hoc ex
Plinio adiecit, vt reliqua etiam ex eodem
reddidit.

Onobrychis. CAP. CLII.

Onobrychis folia habet lētis, longiora paulò:
caulē dodrantalē: florē puniceū: radicē par-
uā nascitur in viginosis, et incultis. Herba sua-
pte vi, sitrita ilinatur, tubercula dissipat: cum
vino pota, stragurias sanat: illita ex oleo, sudo-
res mouet.

Hypericum. CAP. CLIII.

Nostra p-
forata.

Hypericum aliȝ androsamon, aliȝ corion, aliȝ
chamapityn appellant, quoniā semiē odore
resinā imitatur: surculaceo frutice, dodrant ali, ru-
bescentē folio rutæ: flore luteo, leucoio simili, qui
digitis attritus sanguineum succū remittit, qua
ex causa androsamon cognominatur: subhirsu-
ta siliqua, & in rotūdo oblonga, hordei magni
tudi

radine: semine intus nigro, resinosi odoris; gignitur in locis cultis, & asperis. Vrina est, mēstrua pellit appositum: tertianis, quartanisq; cum vino potum liberat. Semen quadraginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum semine illata, ambusta sanant.

Ascyrum. CAP. CLIII.

AScyron, siue ascyroides, hyperici genus est, magnitudine distans, fruticosius, maiores habens ramos, surculosiores, rubentesq;: folia tenuia: flores luteos. & fructum resinofum, hyperico non absimile: cuius attritu digiti ferè cruentantur, quæ de causa androsamon vocauere. Vfus seminis ad ischiadicos, potū in hydremelitis sextario: nam biliosa recrementa amplissimè detrahit, sed assidue dare oportet, donec sanitati restituantur. Vllinitur & ambustis efficaciter.

Androsæmon. CAP. CLV.

ANdrosamon ab hyperico, ascyroq; differt. quod fruticet ramulis surculosis, ac tenuibus: rubentibus virgis, & folijs ruitæ, triplo aut quadruplo maioribus, quæ trita vinoso succo manant. cōplures alas habet in cacumine, vtrinque expansas, pinnatasq;: circa quas flores puffilli, lutei: & in calyculis semen papaueris nigri, insigne lineis. Huius comæ tria resinofum odorem reddunt. Semen tritum drachmis duabus potum, biliosa alui excrementa pellit. ischiadicis maximè medetur: sed à purgatione aquam

exorbere oportet. Herba ambustis illita medetur, & sanguinem cohibet.

CORIS. CAP. CLVI.

CORIS, quod aliqui hypericon vocant, frutex est folio erica, rubro, pinguiore, ac minore, non altior dodrante, suavis, odoratus, acris. Potum semen menses trahit, & vrinas: cōtra phalangiorum morsus, ischiadicos, & opisthotonicos ex vino potum auxilio est: horroribus ex pipere, sed opisthotonicis ex oleo, aptissimè illinitur. Radix vino decocta potaq; defectis opē ferre creditur: sed laborantem inter potandum quàm optimè cooperiri licet: si quidem corpus totum desudabit, ex qua re pristinam agilitatem recuperabit.

AIUGA. CAP. CLVII.

AIUGA herba in terra repens, subcurua: folijs semperuini minoris, multò tenuioribus, hirsutis, & pinguioribus, circum ramos frequentibus, odore pinus: flore tenui, luteo, vel candido: radicibus cichorij. Folia septem diebus in vino pota regio morbo medentur: & quadraginta diebus ex hydromelite, ischiadicos sanant. Dantur peculiariter vrinae difficultatibus, iecinorū, & renū vitij: torminosi profunt. Ea apud Heracleam Ponticam, perinde atq; antidoto, contra aconitum vtuntur, bibentes decoctum. Ad antedicta illinitur, cum polenta iure decocti subacta. Trita in farinam, & cum fico in pilulis sumpta,

sumpta, aluum emollit: excepta melle, cum aris
squama, & resina deijcit: apposita ex melle,
vulnæ vitia extrahit: mammarum duritias di-
scutit, vulnera glutinat: vlcera quæ serpunt,
cum melle illita, cohibet. Alterum est genus
ainga, cubitalibus ramis, in anchoræ speciem in-
curuatis, pratenuibus: coma supradicta, flore
candido, semine nigro. hæc etiam pinum redolet.
Tertia mas nominatur, paruula, folijs exilibus,
albis, scabris: cæule aspero, cādido: luteus flosculus,
semine iuxta alas. respicit & hæc pinum. Hæ
duæ vim superioris obtinent, sed non vsquea-
dèò efficacem.

LIBRI TERTII
FINIS.



P E D A C I I

DIOSCORIDIS

ANAZARBEIDE

Medica materia.

LIBER QVARTVS.



Ribus antè libris, amātissi-
me Aree, tradidimus odora-
menta, olea, arbores, vngue-
ta, animalia, frumenta, ole-
ra, radices, succos, herbas, se-
minaq;. In hoc autem qua-
to differemus de radicibus, & eis, quæ restant,
herbis.

Betonica.

CAP. I.

CEstrom psychotrophon. vocitatur, quoniā
frigidis locis inueniatur. Latini Betonica
appellant. Herba est. caulem ferens tenuē, cubiti
altitudine, aut maiore, quadratum: folia. quer-
cus, mollia, longa, in ambitu diuisa, odorata,
prope radicē maiora. in summis caulibus semen,
veluti satureia, spicatum est. Decerpta huius fo-
lia siccantur, plurimos ad vsus. Radicibus niti-
tur, vt. veratri, tenuibus. quæ ex hydromelite
ap̄ patu, pituitosam vomitionem euocant. Folia
dara

dari debent ruptis, conuulsis, mulieribus vulua
 malo opportunus, & ad laxandos vteri strangu-
 latus, denarij pondere cum hydromelite: tres in
 vini sextario, drachma contra serpentium mor-
 fus ebibuntur. Herba magna vtilitate illatis à
 serpente vulneribus illinitur. aduersus etiã ve-
 nena drachma ex vino pota conuenit: praesum-
 pta ea, si venenum hauriatur, nihil nocebit. vri-
 nam ciet, aluum subducit. Medetur comitiali-
 bus, & insanus pota ex aqua: & iecinoris, lie-
 nisq; vitij drachma pondere in aceto mulso. cõ-
 coctionem adiuuat, si quis cum faba magnitu-
 dine secundum cœnã cum melle cocto deuorau-
 rit: modo consimili acida ruētantibus propina-
 tur. stomachicis eam manducare, & succum de-
 uorare proderit, si postea dilutum vinum sor-
 beatur. Datur sanguinem excreantibus, tribus
 obolis cum diluti vini cyatho: ischiadicis, renum,
 & vesica doloribus ex aqua: aqua inter cutem
 binis drachmis ex hydromelite, si febricitant: sin-
 aliter ex mulso. regio morbo laborantes recreat:
 mensis pellit drachma pondere cum vino pota.
 aluum purgant drachma quatuor pota in hy-
 dromelitis decem cyathis: facit cum melle ad ta-
 bem, & purulentam excreationem. Folia sicca,
 tritaq; fictili vase reconduntur.

Britanica. CAP. IT.

Britanica, aut Vetonica, folia habet sylue-
 stris lapathi, sed nigriora, et pilosiora, gustu
 adstring

adstringētia: radicem tenuem, & breuem: caulem paruum emittit. Folijs exprimitur succus qui igni aut sole cogitur. Vim habet adstringentem, priuatim depascentibus oris, & tonsillarum vlceribus accommodatam. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione est opus.

Lyfimachia. CAP. III.

LYfimachia, quam aliqui lytren appellāt, caules emittit cubitales, altioresve, fruticosos, tenues: prodeuntibus geniculatim folijs, tenuibus, salicis figura, gustu adstringentibus: flore rufo, aut aureo. gignitur in aquosis, & palustribus. Foliorum succus adstringente sua vi, sanguinis reiectionem supprimit: dysenterici potui datur, aut infunditur: mensiū abundantiam sistit, in pessa. sanguinis profluuiο subuenit, si nares ea herba obturētur: vulnerū cruore cohibet. Acerrimum nidorem suffita reddit: quae de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

Sanguinaria. CAP. IIII.

Nūc Centinodia.

Polygonū mas ramos habet teneros, & exiles, copiosos, geniculis cinctos, qui per terram, vt gramen repunt: folia rutae, sed molliora, longioraq;: semine sub omnibus folijs turgescente, vnde marem appellari volunt: flos ei candidus, aut puniceus. Vis epoti succi est, spissare, ac refrigerare. predest cruētæ excreationi, cholerae, alui fluxionibus, & vrinae stillicidio: nam vrinam apertè ciet. Cum vino potus, contra serpentium morsus

morsus auxiliatur: datur in febris per horam ante significationes. fœminarum pro fluxu imposito sistit. Idem succus aurium doloribus, iisdemq; parulenti instillatur. Facit eximie ad genitaliũ vlcera, cum vino adiecto melle decoctus. Stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, vlceribus quæ serpunt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recentibus vulneribus folia illinuntur. Sanguinaria fœmina frutificat vno caule, arundini tenera simili, densis geniculis, & in se tubarum modo sarctis: articulo in orbem cingunt apices, foliis piceæ similes: radicis nullis vsus nascitur in riguis. Huic quoque spissandi refrigerandiq; natura ad eadem valens, sed inefficacior.

Polygonatum. CAP. V.

Polygonatum nascitur in montibus, frutice cubito altiore, folijs lauri, latioribus, & leuioribus, sapore mali cotonei, aut punici, cum quadã adstrictione. Flores per singulos foliorum exortus promit, candidos, folijs numerosiores, incepta à radice supputatione. Radicem habet albam, mollem, longam, crebrò geniculatam, densam, grauiolentem, digitum crassitudine æquantem. Quæ vulneribus efficaciter illinitur, quin etiam maculas in facie debet.

Clematis. CAP. VI.

Clematis humi sorpit. lato, pinguiq; solo prouenit, viticulas spargens crassitudine
E iunci

iunci, exiguas: folio lauri figura, & colore, multò minora. Ea cum caulibus in vino pota alui pro fluxia, & dysenterias sedant: subdita in pefso cum lacte, & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus vulua medetur: dolores dentium cōmanducata finit. imposita serpentium morsibus iuamentū præstat. Fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota opitulari. Gignitur in terrenis.

Clematis altera. CAP. VII.

Est & altera Clematis, quæ viticulosum emittit ramulū, rubescentem, lentum: folium gustu admodū acre, ac exulcerās. repit per arbores, vt smilax. Semen tritum pituitam, bilemq; detrahit, in aqua aut hydromelite potum. Folia eius illita, lepras purgant. Cum lepidio conditur ad cibos.

Polemonia. CAP. VIII.

Polemonia, aliij philetariam, Cappadoces chliodynam in appellāt, ramus exilibus, vtrinque pinnatis: folijs paulò quā ruta maioribus, ac longioribus, calaminthe, aut sanguinariae, proximis: quibus in summis velut corimbi dependent, nigro semine: radice cubitali, albicante, radiculæ simili. nascitur in mōtosis, et asperis. Bitur in vino radix contra serpentes, & dysenteriam: & ex aqua aduersus vrina difficultatem, & coxendicum cruciatu. datur ex aceto drachmæ pondere lienosis. Eadem scorpionis plagæ alligatur. Tradunt eum, qui radicem gustauerit

nerit, à scorpione non feriri: eumq; si ictus sit, nihil molesti passurum. Dentium dolorem mensa mitigat.

Symphytum. CAP. IX.

Symphytō petraeon nascitur in petris, ramis et
 Snuibus, paruis, origano similibus: capitulis,
 † folijs thymi: lignosum totū, odoratum, gu-
 stu dulce, saluam ciens: longa radice, subrufa, di-
 gitali crassitudine. Decoctum in aqua mulsa
 & potum, pulmonis vitia, purgat: sanguinem
 reijcientibus, & renum malis ex aqua datur:
 ad dysenteriam, rubraq; foeminarum profluvia
 in vino decoctum: ad conuulsa verò & rupta,
 ex aceto mulso bibitur. Quin & commanduca-
 tū sitim sedat, faucibus asperis subuenit vulnera
 recentia, enterocleasq; cōglutinat, & illitu co-
 hibet. Carnes autem cum symphyto decoctae coa-
 lescent. Est & alterum symphyton, quod aliqui
 peclon vocant, id caulem emittit bicubitalem,
 aut maiorem, crasum, leuem, angulosum, ut
 sonchi inanem: circa quem breui interuacante
 spacio, folia exeunt angusta, buglosso proxima,
 oblonga, hirsuta: caule secundum angulos quos-
 dam striato: folijs tenuibus, ex alarum sine pro-
 deuntibus: in quibus flores lutei. & circa cau-
 lem velut verbasci semina emicāt. Tam caulis,
 quā folia aspera lanugine horrent, taēluq; pru-
 ritū cōcitant. Radices demittuntur foris nigrae,
 intus candidae, viscosae. quarū est vsus. Tritae, &

pota cruentis excreationibus, ruptisq; proficiunt recentia vulnera illita conglutinant, carnes quoque si concoquantur, cogunt addite. Inflammationibus praesertim sedis cum senecionis folijs vtiliter illinuntur.

A N N O T A T I O.

† Ne quis cōmoueat, nos quòd hic folia adiecim⁹ p̄ter Ruellij, & Marcelli interpretationem. Idem ea ratione fecimus, quoniam in Aldino codice hoc loco $\phi\upsilon\lambda\lambda\alpha$, hoc est, folia habetur. Tum verò quia folia thymi pulchrè illi herba quadrat, quam verum Symphytum petraeum censemus.

Holoſtium. CAP. X.

Holoſtium quadratilis herba est pusilla, tribus quatuorve digitis supereminens extra terrā: folijs viticulisq; coronopo, aut graminis proximis, gustu adstringētibus: radice alba, pratenui vsque in capillamēti specię, lōgitudine quatuor digitorū. nascitur in collibus terrenis. Vſus eius adrupta in vino pota: nā & carnes coguntur decoctionibus addita.

Stoebe. CAP. XI.

Stoebe vulgaris est notitia. Cuius semen, & folia stringunt, quapropter decoctum dysentericis infunditur: auribus quoque purulētis instillatur. Illita folia oculis ab ic̄tu cruentis prouident, & erumpentis sanguinis impetus cohibēt.

Climenum. CAP. XII.

Clymenum caulem fert fabæ, quadratū: folia plantaginis: folliculis supra caulem sese inflexis, ut in poliporum cirris. Probatissimū est ē montibus. E' frutice toto cum radice succus exprimitur qui ad sanguinis reiectiones, in potu efficax est: cæliacos, rubraq; fœminarū profluuia refrigerando infranat: sanguinē naribus erūptem supprimit. Trita folia, aut siliquæ recētibus vulneribus impositæ, ea ad cicatricē perducunt.

Periclymenum. CAP. XIII.

Periclymenon simplex fruticat, ex interual-
lis parua folia habens, ipsum amplectantia,
subcandida, hederacea: inter folia surculi exeūt,
in quibus bacca hederæ similes: flos fabæ, candi-
dus, aliquantū rotundus, & quasi in folium
procumbens: semen durū, & quod difficilē euel-
latur: radice rotunda, crassa. Nascitur in aruū
ac sepibus, conuoluens se adminiculis propter as-
sidentibus. semē eius postquā ematuruit col-
lectum, & in vmbra siccatum, si drachmæ pon-
dere detur in vino, quadragenis diebus, lienem
absomit, lassitudinem discutit: sed vrinam ciet,
statim à sexto die cruentam. orthopnœa, &
singultui prodest: partum accelerat. Folia sunt
eisdem viribus prædita: quæ tricenis septenis
diebus epota, sterilitatem facere prodūtur: perū.
Elis ex oleo, febrium algores abigunt.

Tribulus.

CAP. XIII.

Tribuli genus vnum terestre, folijs ad effigie portulacæ, tenuioribus: viticulis in terra stratis: spinis secundum folia rigidis, præduris. iuxta amnes, & rudera nascitur. Est et alterum genus, aquis familiare, quod in fluminibus natum comæ exerit, aculeos condens: folijs latis, & pediculo longo: caule parte summa, quam ima crassior: æd sunt ei & capillamenta quadam spicacea semen durum, ab altera non abhorrens. Vterque refrigerantis, & inspissantis est nature: ideo inflammationes omnes cataplasmate adiuvat. vlcera in ore erumpentia, putredines, gingivæ, tonsillasque persanat. Succus ex his colligitur ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuvamentum affert. Drachma terrestris tribuli pota, illitave, ictos à vipera recreat: contra venena cum vino aptissime bibitur. decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strimona annem habitant, virenti tribulo equos saginant: & è dulci semine & esculento panem, quo vescuntur, faciunt.

Saxifraga.

CAP. XV.

Sarxiphagon aliqui sarxiphragon, alij empetron, Romani saxifragam vocant. frutex est surculosus, in petris, & asperis locis nascens, epithymo similis. Coctus in vino, mox potus, febricitantibus opitulatur: stranguriæ prodest, singulatum sedat, calculos vesicæ frangit, & urinam ciet.

Limo

Limonium. CAP. XVI.

Limonion folia habet beta, tenuiora, & longiora, decem. saepe plura: caulem tenuem, re-
ctum, lilio aequalem, seminibus rubris scatentē
quae gustata adstringunt. Semen tritum, &
ex vino acetabuli mensura potum, dysentericis,
coeliacisq; prodest: rubra sceminarum profluvia
sistit. Nascitur in pratis, & palustribus.

Lagopus. CAP. XVII.

Lagopus herba sistit aluum in vino pota:
tut in febris, ex aqua. Eadē inguini alliga-
tur in inflammatione. Nascitur in segetibus.

Medium. CAP. XVIII.

Medion in saxis, & opacis nascitur. folia ha-
bet iridis: caulem tricubitalem, & in eo flo-
rem gradem, purpureum, rotundū: semine cnici,
minuto: radicem dodrantalem, crassitudine ba-
culi, gustu acerbo. Quae trita in farinam, & ex
melle decocta rubros menses sceminarum sistit,
eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen in vino
potum, menstrua pellit.

Epimedium. CAP. XIX.

Epimedium, caulis est non magnus, hederae fo-
liis, denis atque duodenis neque florem, ne-
que fructum ferens, radice tenui nigra, graui
odore, gustu satuo. nascitur in humidis. Folia
cum oleo trita, imposito catasplamate, mammae
increfcere nō sinunt. Radix conceptum adimit,
Folia trita quinis drachmis, post menstruas

purgationes, quinque diebus in vino pota, praestant mulieribus, ne concipiant.

Gladiolus. CAP. XX.

XIphion, alij phasganon, alij macharonio, Romani gladiolum vocant. nomē inde accepit, quod folium gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus, & angustius videretur, et gladij modo mucronatū, nervosumq;. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinem digesti, inter se distant: rotundo semine: radicibus geminis, vna parvorum bulborū modo, super alteram insidente, quarū inferior gracilis est, superna vberior. nascitur in arvis. Superior cum thure illita, admisto vino, spicula & aculeos è corpore extrahit: panos cum lolij farina, & hydromelite discutit: qua de re huiusmodi emplastris inferi solet. mēses imposita trahit. Superiori radice ex vino pota, venerem stimulari, & inferiore sumpta sterile scere tradunt. Superiorem quoque vtiliter infantium enterocelis, cum aqua potui dari præcipiunt.

Sparganium. CAP. XXI.

SParganion, aliqui xiphidion vocāt. folia habet gladioli, sed arctiora, & in terram magis procumbentia: in summo caule veluti pilula prominent, in quibus semen. Contra serpentis venena, radix cum vino datur.

Xyris. CAP. XXII.

XYris folia habet iridis latiora, & in cacuminē

tumine mucronata: quorum medio caulis erumpit, satus crassus, cubitalis, ex quo siliqua triangularis dependens, in quibus purpureus flos, in medio puniceus: semē in folliculis, simile, fabis rotundū, rubrū, acre: radix longa, geniculata, rufa. Contra capitis vulnera, fractaq; efficax est: aculeos, & spicula omnia, citra molestiā extrahit, adiecta floris aris tertia parte, & radicis centaurij, ac mellis quinta: tumoribus, & collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad conuulsa, rupta, coxendicum dolores, strangurias, & alui profluvia. Semen tribus obolis potum, vrinam vehementius impellit: & cum aceto, lienem absumit.

Anchusa. CAP. XXIII.

ANchusa, quæ alio nomine calyx, aut onoclea appellatur, folia habet lactuca, in acumem fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoque ouersum humi sparsa, spinis horrida: radici crassitudo digitalis, quæ æstate provenit, & manus inficit sanguineo colore. lato solo nascitur. Radix astringit: ad ambusta, & vetera vlcera, ex oleo & cera efficax est: igni sacro cū polenta medetur: lepris, & vtiginibus illinitur ex aceto: partus extrahit, vulua indita. Eius decoctum renum vitij, lieni, & bile suffusus datur: et si febris sit, ex aqua mulsa. Sistūt aluum folia in vino pota. Radice pigmentarij vtuntur ad vnguentorum spissamenta. Est &

altera, quam aliqui alcibiadion, aut onochiles
appellarunt. Hæc à priore distat, quòd minora
habeat folia, sed simili modo aspera: ramulos exi-
les, in quibus flos purpureus in puniceum ver-
gens cōspicitur: radices habet rubras, pralōgas,
quæ mesibus sanguineum succum fundunt. in
sabulosis nascitur. Vis ei, folijsq; inest, quæ con-
tra virus cū reliquorum serpentium, tum ma-
ximè viperarum auxilietur, siue sibo siue potu,
siue alligatu: nam si quis quam mandens, in ser-
pentis os inspuat, eum necabit. Est & alia huic
haud dissimilis, semine puniceo, minore. Cuius se-
men manducatum, si in serpentis fauces inspuat-
ur, eam interficiet. Radix acetabuli mensu-
ra cum hyssopo, & nasturtio pota, latus ventris
tineas excutit.

Lycopsis. CAP. XXIII.

Lycopsis, quæ & anchusa à nonnullis voca-
tur, folijs est laetiuca, longioribus, asperiori-
bus, latioribusq; crassius, ad radicis caput recidē-
tibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis,
multis, cubitalibus: flore in ijs paruo, purpurascē-
te: radice rubra, & adstringente nascitur in cā-
pestribus. Cum oleo radix illita, vulneribus me-
detur: & cum farina hordeacea, ignibus sacris:
sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

Echium. CAP. XXV.

Echion folia habet pralonga, aspera, ali-
quantū tenuia, anchusa proxima, mino-

ra tamen subrubra, & pingui, spinulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: missos: minutaq; vtroque latere folia expensa, pinataq; nigra, in summo caule proportionem minor: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti viperarum similia insunt: radix nigricat, digito tenuior. Quae non percussis modò à serpentibus ex vino prodest: sed eos qui anteaq; biberint, feriri non patitur. Folia, & semen idem praestant munus. Lumborum dolores sedat: in vino, aut sorbitione sumpta, lac extrahit.

Ocimastrum. CAP. XXVI.

O Cimoides, Latini ocimastrum vocant, folia fert ocimi, & ramos dodrantaes, hirsutos: siliquas hyoscyamo similes, semine, ut gith nigro praegnant. Vim habet semen in vino potum, quae viperarum, caterarumq; serpentium morsibus medeatur. Datur ischiadicis: cum melle, vino, myrrha, & pipere. Radice nititur tenui, & supernacua.

Erinus. CAP. XXVII.

Erinus nascitur apud fontes, & fluuios, folijs ocimi, sed minoribus, parte superna dimissis: surculis quinis, senisve, dodrantalibus: flore candido, semine nigro, et acerbo: folia, & caules lacteo succo turgent. Semen drachmis duabus in quatuor mellis cyathis oblitum, oculorum fluxiones colibet. Succus cum sulphure, & nitro instillatus, aurium dolores sedat.

Gramen. CAP. XXVIII.

GRamen geniculatis serpit ramulis, à quibus radices spargit dulces, articulis præcinctas: folia acuminata, dura, & vt arūdinis parua lata, eaq; iumēta, & boues pascunt. Trita radix illitu vulnera conglutinat. Decoctum eius in potu, torminibus medetur, & vrinae difficultatibus: calculosa etiam vesicæ excrementa comminuit. Est & arundinaceum gramen, priore multò maius, quod iumēta necare traditur, præsertim in Babylone, idq; iuxta vias nascitur. Quod in Parnaso mōte gignitur, dēsius fruticat: folijs hederaceis: flore odorato, cādido: semine paruo, nō inutiles: radicibus quinis, aut senis, digitali crassitudine, cādidis, mollibus: & admodū dulcibus. Succus si in vino cū melle pari, & myrrha dimidio decoquatur, adijcianturq; piperis, & thuris tertiæ portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum: id in ærea pyxide reconditur. Decoctum radicis idem, quod herba, præstat. Semen vehementius vrinam impellit: alui, vomitionesq; sistit. Natum in Cilicia gramen, quod incolæ Cinnam appellant, boues inflammat, si eo virenti sæpe pascantur.

Sideritis. CAP. XXIX.

Sideritin aliqui heracleam vocant. folia habet marrubij, sed longiora, satis ad frondem quercus, aut saluie accedentia, minora

ratamē, et aspera, caules edit quadratos, dodrātem altos, aut etiam maiores, non iniucundi gustus, aliquantumq; substringētis: in quibus per interstitia orbiculatæ vertebrae, vt in marrubio spectantur: & semen in eis nigrum. nascitur in petrosis. Illita folia, suapte vi vulnera sine inflāmationis periculo iungunt.

Sideritis altera. CAP. XXX.

Altera sideritis binūm cubitorum ramulis, exilibus: folio filicis, numerofo, vtrinque per oras diuifo, pediculo longo, prodeuntibus è summo alarum finu furculis longis, tenuibus: capitulo in cacumine orbiculato, aspero: in quo semen continetur, quā betæ rotundius aliquantò, ac durius. Huius vis, foliorumq; ad vulnera precipua est.

Sideritis tertia. CAP. XXXI.

Sideritis in aliam esse tradūt, quam Crateuas Heracleam vocat, in macerijs, & vineis nascentem: folijs, ab vna radice multis, cortandro similibus, circa cauliculos dodrantes, laues, teneros, subcandidos, atque subrubicundos: flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & lento. Huius ea vis est, vt quamuis recenti vulnere imposita, sanguinem supprimat.

Achillea. CAP. XXXII.

Achillea, quibusdam Achillea sideritis, dodrantes: aut maiores gerit scapos, fusorum effigie, minutis folijs circundatos, ex obliquo

quo crebras incisuras habētibus, coriandri similitudine, sub fuluo colore, lentis, odore multo, nō insuauis, verū medicato: umbella in cacumine rotunda: floribus candidis, purpureis, & aurū emulantibus prouenit: lato solo. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur: erumpentem sanguinē inhibet, & cruenta vuluæ profluvia in vellere. Decocto quoque insident scēmina fluxionē vuluæ laborātes. ad dysenterias bibitur.

Rubus. CAP. XXXIII.

Rubus notitiæ vulgaris. Vim habet siccandi, & adstringendi: capillum tingit. Ramorum decoctum, potu aluum sistit, & scēminarum profluvia, præsteris morsui accommodatissimum. Gingiuas firman, & oris vitij medentur folia commanducata: cohibent vlcera quæ serpunt: vlceribus in capite manantibus, oculisq; procidentibus, remedio sunt: condylomatū, & hamorrhoidibus folia illinuntur. cardiacis, et stomachi doloribus, trita conuenienter imponuntur. Caules cum folijs tunduntur, exprimiturq; succus, mox sole cogitur, singulari remedio contra omnia, quæ modo dicta sunt. Mori in rubo nascentis quā optimè maturi succus ad oris medicamenta conuenit. Sistitur aluus præ maturi cibo, nec non flore in vino poto.

Rub

Rubus idæus. CAP. XXXIII.

Idæus Rubus appellatus est, quoniam copiosus in Ida prouenit. Est autem longè tene-rior priore, ac minoribus spinis horrens: quanquam & sine spinis inueniatur. Insuper eadem præstat, quæ supradictus. Cæterum flos cum melle oculorum collectionibus illinitur. ignem sacrum extinguit, stomachicisq; ex aqua bibendus datur.

Helxine. CAP. XXXV.

Helxine cognomento cissampelos, folijs est hederæ, minoribus ramulis exilibus, quibus complectitur quodcumque contigerit adminiculum. Nascitur in sepibus, vinetis, & segetibus. Foliorum succus potu deiecit aluum.

Elatine. CAP. XXXVI.

Elatine folia habet helxinae similia, minora et rotundiora, pilosa: tenuibus, & dodrantalibus ramulis, quinis, senisve, à radice foliosis, gustu adstringentibus, nascitur in segetibus, et cultis. Oculorum fluxionibus, & inflammationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis, & impositis. Eadem cocta, solbitionis usu dysenteriam sistit.

Eupatorium. CAP. XXXVII.

Eupatorium fruticosa herba est, vnicum effrens caulem, lignosum, nigricantem, re-ctum, tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum
amplio

ampliores: folijs per intervalla quinquefolijs, aut cannabis potius similibus, quinquepartito, aut amplius diuisis, nigricantibus, & ipsis per ambitum ferratis: semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum spectans, quod siccatum vestibis inhaeret. Contrita huius folia, & cum suillo adipe imposita, vlceribus, quae agrè cicatricem trahunt, medetur. Herba aut semen in vino potum, dysenteria, iecinoris vitijs et serpenti ictibus liberat. Nec desunt, qui aberrantes argemonē hanc appellarint, cum tamē longē alia sit, uti exposuimus. **Quinquefolium.** CAP. XXXVIII.

Quinquefolium ramulos fert festucarum similitudine, tennes, dodrantes, in quibus semen: folia menthae, quina singulis pediculis, raro plura, in ambitu serrata: florem excandido pallescentem, auri emulum. Nasctur in riguis, & aquarijs ductibus. Subrubram habet radicem, oblongam, veratro nigro crassiorē, plurimis pollet remedijs. Ius radice decocta ad tertias, si in ore cōtineatur, dentium dolores sedat: putrida oris vlcera, collutiōe sistit: arteriae scabritias, gargarizatu leuigat: cōtra alui pfluuia, & dysenterias auxiliatur: itē articulorū, coxēdiciq; cruciatib⁹ potum. Cocta in aceto, et illita, serpētia vlcera cohibet: strumas, tumores, duritias, abscessus, & collectiones discutit: ignes sacros, reducias, condylomata, psorasq; sanat. Tenera radice succus, contra iecinoris pulmonumq;

vitia prodest: item aduersum venena. Cum hydromelite autem, vel diluto vino, & piperis exiguo, bibuntur folia contra febrium circuitus: in quartana quidem, quaternum ramulorum folia, in tertiana verò ternum: in quotidiana, vnius. Ea quoque folia tricenis pota diebus, comitialibus prosunt. Foliorum succus tribus cyathis aliquod dies potus, celerrimè regio morbo medetur. Illita cum melle & sale, tã vulneribus, quã fistulis remedio sunt: enterocelicis auxilium præstant. Quinquefolium sanguinis profluvia & potu, & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & incantamenta inciditur.

Phoenix. CAP. XXXIX.

Phenix folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora: spicam lolio similem: calamos digitorum senum, radici aduolutos: septenas octonasve spicas. In aruis, tectisq; recenter illitis nascitur. Harum virium compos, vt in vino austero pota alui profluuium, & emanantem vulua sanguinem sistat, vrinae impetus infrenet. Sunt qui ad alligatam in puniceo vellere, & suspensam, sanguinem suppressere prodant.

Idæa radix. CAP. XL.

Idæa radici folia sunt ea, quæ rusco: adheret ijs veluti exigui capræoli, è quibus flos. Radix spissandi naturam habet, his conueniens, quibus adstrictione opus est. Pota citam aluum, mensesq; & omnem abundantiam sanguinis sistit.

Rhodia radis. CAP. XLI.

Gignitur rhodia Radix in Macedonia, costo similis, lenior, inaequalis: qua contrita rosas redolet. Vtilissima capitis doloribus, si madefacta fronti, & temporibus cum rosacei mento imponatur.

Equisetum. CAP. XLII.

Equisetum in riguis, & scrobibus nascitur cauliculi predeunt inanes, geniculati, in se sarcti, rubescentes, leniter scabri; & iuncta circa eos folia, crebra exilia. In sublimē atollitur, vicinos arborū caudices, scādēs obuolutūq; dependet, comis multis, nigris, vt equorū cauda: radix lignosa, dura. Vis herba spissare: quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit: prodest: dysentericis in vino potus: urinam cit. Sanguinolenta vulnera glutinantur, tritu folijs, & illitis. Radix cum sua herba tussim, orthopnoeam, ruptaq; adiuvat. Folijs in aqua potis dissectiones visca, & intestinorum, enterocelaq; in vnum coalescere, cogiq; feruntur. Alterum equisetum caulis est rectus, cubito maior, inanis: comis per intervalla breuioribus, candidioribus, & mollioribus. Id cum aceto tritum, vulneribus remedio est, eademq; fungitur facultate.

Coccum infectarium. CAP. XLIII.

Cocum, quo infectores vtuntur, fructus est sereno sus, parvus, cui grana ceu lentes adhaerent.

herent, quæ electa congeruntur. Optimū gignitur in Galatia, & Armenia: deinde Asia, & Cæcilia: vltimum ex omnibus Hispanicum. Vis huic spissandi: vulneribus, nervisq; præcisis conueniēter ex aceto tritū illinitur. Nascitur quoq; in Cæcilia è quercubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & coccum vocitant.

Tragium. CAP. XLIIII.

TRagium nascitur in Creta tantū in insula, lentisco semine, folio, & ramis simile, singulis tamen minoribus: succus ei lacteus. gummi non dissimilis. Semen, folia, lacrymaq; illius spicula è corpore eijciunt: omnia quoque corporum pacta, euocant: pota stranguriæ medentur, calculos vesicæ frāgunt, menses trahunt, modus in sumptione est, drachma vna. Fama est syluestres capras sagittis confossas, eius herbe pabulo spicula excutere.

Tragium alterum. CAP. XLV.

Est & alterum Tragium, quod tragoceros. aliqui vocant: folia scolopendrii habet, & radicem sylvestris raphani, tenuem, candidam. Quam crudam vel coctam esse dysentericis prodest. Folia autumnō, hirci virus olent: exinde sibi tragi nomen adoptauit. Provenit in montibus, & præcipitijs.

Tragum. CAP. XLVI.

Est etiam herba tragos, quam aliqui

scorpion, aut draganon vocant: maximè in maritimis nascens, palmum alta, aut amplior, fruticosa, humilis, oblonga, sine folijs: pusillis circa ramos acinis, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum acini decem ex vino poti, celiacis, & sceminis fruxione vulua laborantibus, auxiliantur. Tunduntur à plerisque; & in pastillos digesti asservantur: quibus vtuntur, cum opus est.

Iuncus. CAP. XLVII.

Iunci duo genera: vnum lauis nominati: alterum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera, vnum sterile: reliquum fert semen nigrum, rotundum, & crassiore constat calamo, carnosioreq;. Tertius est iuncus, qui vocatur oleschænos, prioribus carnosior, asperiorq;: is similem supradicto fructum in cacumine parit. Semē vtriusq; tostum, ex diluto vino potum, sistit aluum, & rubra scaminaria profluvia: urinam cit, capitisq; dolores facit. Quæ proxima sunt radici folia tenera, conuenienter illinuntur aduersus phalangiorum morsus. Aethiopici iunci semine somnus allicitur: sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

Lichen. CAP. XLVIII.

Lichen, qui saxis est familiaris, aliquibus bryon appellatur, asperginosis petris adhaeret, vt muscus. Is illitus sanguinis profluvia sistit

stet, inflammationes arcet, impetigini medetur.
Iuuat regio morbo correctos, cum melle illitus, o-
ris, & linguae defluxiones inhibet.

Paronychia. CAP. XLIX.

Paronychia exiguus frutex, in petris nascens,
peplo similis, minor longitudine, maioribus
folijs. Illita paronychijs, atq; sanis remedio est.

Chrysocome. CAP. L.

Chrysocome palmi altitudine fruticat: coma,
specie corymborum, hyssopo simili: radice hir-
suta, veratri nigri modo, tenui. cyperum aqua-
te: gustu non iniucundo, ex dulci austero, in petro-
sis, opacisq; nascitur. Radix excalfacit, & ad-
stringit: his conueniens, quos iecur, aut pulmonis
inflammatio male habet. contra purgationes vul-
ue, decocta cum hydromelite assumitur.

Chrysogonum. CAP. LI.

Chrysogonum dense fruticat, quernis fo-
lijs, flore coronarij verbasci: radix vt ra-
pum extuberat, intus ruberrima foris nigra.
Que trita cum aceto: atque imposita, muris a-
ranei morsibus auxiliatur.

Helichrisum. CAP. LII.

Helicryson, quidam chrysanthemon, non
nulli & id amaranton vocant, quo deo-
rum simulacra coronant. Ramulum habet can-
didum, virentem, rectum, firmum: folia interce-
dentibus spatijs angusta, abrotono similia: co-

*mam aurea lucis, in orbem: umbella rotunda, vti
luti siccis corymbis dependentibus: radice tenui.
Nascitur in asperis, & torrentium alueis. Cōtra
serpentium ictus, coxendicum dolores: vrina
stillicidia, rupta q̃; coma è vino pota opitulatur:
ciet menses. Sanguinem concretum ventris ac ve
sica absumit, pota cum mulso: ieiunis, trium ob
lorum pondere, sistit destillationes, data in vino
albo diluto. vestibus inseritur, vt eas ab eroden
tium iniurijs tueatur.*

Chrysanthemum. CAP. LIII.

C*Hrysanthemon aut caltha, nonnullis buph
thalmos. herba est tenera, fruticosa, laues
pferēs, caules, et multifida folia: flores supra mo
dū splendētes, luteos, orbē oculi imitantes, vnde
buphthalmi nomen traxit. propter oppida na
scitur, cuius caules oleris vice manduntur. Flores
cum cerato triti, steatomata discutere produn
tur. Regio morbo correptis, colorem bonum bre
ui reddunt, si sequente longo balnei vsu, post e
xitum ebibantur.*

Ageratum. CAP. LIIII.

A*Geraton fruticosa herba est, palmari lōgi
tudine assurgēs, simplex; humilis, origano
maximè similis: umbellam gerit, in qua flos bul
lis aureis emicat, helichryso minor. Nomen ei
inditum est quoniam diutissimè flos in sua colo
ris specie conseruetur. Vis decocti feruens,
huius*

hulus vsta nidor vrinam cit, & vuluæ duritias emollit.

Verbenaca. CAP. LV.

Peristereon, siue verbenaca, nascitur in aquis. Nomen ex eo duxisse videtur, quod colūba circa hanc perquam libenter versari soleat. Dodrantis altitudine, & interdū amplius adoleſcit. Folia è caule produnt incisa, & subalbida. ea singulari ramo, radiceq; sola, constare sæpius inuenitur. Folia cum fuxilla adipe recenti, aut rosaceo impōſita, vuluarū dolores finire putantur: ignem sacrum illita ex aceto reprimunt: putrida vlcera cohibent: vulnera glutinant, veteraq; ex melle ad cicatricem perducunt.

Sacra herba. CAP. LVI.

Sacra herba, quæ & peristereon nominatur, ramulos emittit cubitales, aut maiusculos, angulosos, in quibus ex interuallis folia quercus, sed minora, angustioraq; eisdem diuisuris in ambitu. colore aliquatenus casio: radix longa, tenuis: flores purpurei, graciles. Folia cum radice in vino pota, illitave aduersus serpentes polent. eadem drachmæ pondere cum thuris obolis tribus in vini veteris hemina, quadragenis diebus, ieiuno ore, contra regium morbum bibuntur: veteres tumores, & inflammationes mitigāt: sordida vlcera purgant. Tota in vino decocta, tonsillarum crustas abrūpit: oris nomas gargari & atque colubet. Aint si aqua spargatur tricliniū,

qua maduerit, latiores conuictus fieri. Datur potandum in tertianis febribus tertium à terra geniculum, cum folijs circūdantibus: quartanis quartum. Sacram vocant herbam, quoniā multum ad amuleta, expiationesq; commendetur.

Astragalus. CAP. LVII.

Astragalus parvus est à terra frutex, folijs, & ramis ciceri similis: flore purpureo, paruo: radice rotūda, raphani modo grādi, quæ adnatas appendices firmas habet, nigras, præduras, veluti cornua, inter se implicatas, gustu adstringentes. Nascitur in ventosis, opacis, & in nivalibus. eo Memphis Arcadiæ scætet. Aluum sistit radix in vino pota: vrinam mouet: vetustis vlceribus sicca efficaciter inspargitur: sanguinem supprimit. agrè propter duritiam tunditur.

Hyacinthus. CAP. LVIII.

HYACINTHUS folia habet bulbi: dodrantalem caulem, læuem, minimo digito tenuiorē. herbagei coloris: comam procumbentem, florū purpureorum plenam, incuruam: radicem quoque bulbaceam. Quæ vt creditur, pueris cum vino albo illita, pubertatem coërcet, & non patitur erumpere: sistit aluum pota, & vrinam impellit: phalangiorūq; morsibus auxiliatur. Semen astringentius est, theriacis expetitur: regiū morbum emendat, cum vino potum.

Papau

Papauer erraticum. CAP. LIX.

Papauer erraticum, quod rhœada vocant, vere quidem in aruis cum hordeo nascitur: flore protinus deciduo, unde & nomen apud Græcos accepit. Folia erucæ, aut origano, aut cicchorio, aut thymo similia spectantur, sed longiora, diuisa, scabra: iuncus ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos sylvestris anemones, puniceus, interdum albus: oblongum caput, sed quàm anemones minus: semen rufum: radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinque, aut sex in vini cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis, quibus somnus accersendus est. Semina acetabuli mensura ex aqua mulsa pota, aluū leniter emolliūt: ad idem præstandū mellitis placentulis, & dulciarijs libis admiscuntur. Folia cum calycibus illita, inflammationes sanant: eorundem sotu, & perfusione somnus allicitur.

Papauer satium. CAP. LX.

Esatium papaueris genere, quod hortense est, semen in panem densatur, qui sanis in vsu sit: eo etiam ex melle pro sesama vtuntur: thylacitin vocant. Capitulum habet longū, & semen candidum. Sylvestre vero caput habet insidens, demissumq;: & nigrum semen: quod pithitis nominatur: nonnullis tamen & ipsum rhœas dicitur, quoniam eius scapo lacteus succus emanat. Tertiū magis sylvestre, & ad medicinas valen-

tius multò his longius, producliore capitulo. Omnium in cõmune natura refrigeratrix. quære si capita ipsa, & folia decoquantur in aqua, somnum fotu conciliabunt. Bibitur decoctũ contra vigilias. Calyces cum polenta triti, & cataplasmatidis admisti, ignibus factis, & inflammationibus prosunt. Tunduntur quoq; virides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad vsum recoduntur. Capita quoque per se in aqua coquantur ad dimidias, iterũque adiecto melle, dum humor coeat in eclegmatis lentorem. Id medicamentum in tussi, arteria fluxionibus, & cæliacorum affectu, doloris leuamentum præbet. efficacius tamẽ redditur, addito, hypocistidis succo, & acacia. Papaneris nigri semen tritum cum vino bibitur, contra citem aluum, & feminarũ profluvia. in peruigilijs fronti, tẽporibusq; illinitur ex aqua. Opiũ eius magis refrigerat, inspissat, siccataq;. Sumptum erui magnitudine, dolorem finit, concoquit, & somnum allicit: tussi, atque cæliacorum valetudini auxiliatur: verũ si copiosius hauriatur, nocet. cũ lethargicos efficiẽs interimat. Ad dolores capitis cum rosaceo persusum, efficax est: aurium dolori cum amygdalino, myrrha, & croco instillatur: inflammationibus oculorum cum torrefacto oui luteo proficit: igni sacro, & vulneribus cum aceto: podagris, cum lacte mulieris, & croco. somnum acersit subditum sedi pro balano. Optimum habet

*Est graue, & densum, gustu amarum, odoratu
soporiferum, quod faciliè aqua diluitur, laue,
candidum, neque asperum, neque grumosum,
quod inter colandum non vt cera coëat, & in
sole diffundatur: dein admotum lucernis, non
atra luteat flamma: extinctum denique odoris
vim conseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut
sylvestris lactuca succo adulterant. Verùm glau-
cio fucatum, in dilutione croci colorem reddit:
lactucaceo succo fictum, exiliter spirat, & aspe-
rius spectatur: gummi vitiatum splendet, &
infirmum est. Nec desunt, qui eò dementia de-
nènerint, vt adipem ei admiscerent. Fictili no-
uo torretur ad oculorum medicamenta, dum
mollius, atque rufius appareat. Diagoras, vt
Erasistratus author est, vsum eius damnavit,
oculorū lippitudinibus, & aurium vitij infundi
vetās, quoniā visus aciem hebetaret, & soporē
gigneret. Addidit Andreas, illitos eo protinus
excacari, si nō adulteraretur. Mnesidemus vsum
duntaxat olfactandi probauit, quoniā ad con-
ciliandum somnum conueniret: alioqui nobis
vt noxto interdicit. Quæ commentitia esse expe-
rimento deprehenduntur: siquidem effectus, vi-
rium huiusce medicamenti fidem faciunt. Qua-
re non alienum fuerit scriptis mandare, quoniā
modo is excipiat sucus. Aliqui capita ipsa,
& folia tundunt, & prælo exprimunt, teretesq;
in mortario digerunt in pastillos: id meconium*

vocatur, multum opio ignauius. Porro opij faciendi ratio hac est. Cum ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem incidere oportet, lacrymam exeuntem digito in concham abstergere: nec multo post redire, ut concreta inueniatur: etenim quatum, aut postero die etiam offenditur, in vetere pila teri debet, & in pastillos cogi, cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne vestibus succus deradatur.

Papauer corniculatum.

CAP. LXI.

Vulgò papauer cornutum.

Papauer ceratites, id est, corniculatum, folia habet candida, hirsuta, verbasco similia, in ambitu sylvestris papaveris more serrata: caule non dissimili: flore pallido: calyculo sceni graeci, in corniculorum modum inflexo, unde nomen mutuatur semine papaveris. pusillo, nigroque: radice per summa cespitum, nigra, crassa. nascitur in maritimis, et asperis. Radice ea vis inest, ut in aqua decocta ad dimidias coxendicum, & iocinoris affectus potu sanet. prodest his, qui crassa quedam, & araneosa cum lotio reddunt. Alium leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulsa poto. Crustas emarginant, illita ex oleo folia floresque: argema ac nubeculas iumentorum, perunt etas abstergunt. sunt qui glaucium hoc papaveris genere falsitari existimarunt, falsi quadam foliorum cognatione.

Papau

Papauer spumeum. CAP. LXII.

Aliud Papaueris genus aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab alijs heracleum, caule dorantali: folijs admodum paruis, radicle similibus: fructu inter ea candido. nam herbula alba est, & spumea tota: radice in summo cespite. Legitur astate semen, cum integrè adoleuit, deciditq; exiccatum. Datum acetabuli mensura in aqua mulsâ, vomitione expurgat. priuatim huiusmodi purgatio, comitialibus prodest.

Hypecoum. CAP. LXIII.

Hypecoon, aliqui hypopheon vocant. nascitur in segetibus, aruisq; folijs ruta, exilibus ramis. Natura eadem, quæ papaueris succo.

Hyoscyamus, siue apollinaris.

CAP. LXIIII.

Huoscyamus frutex est caules emittens crassos: folia lata, oblonga, diuisa, nigra, hirsuta: flores è latere caulis, ordine prodeunt, tanquã punicorum cytini, scutulis septi seminum plenis, vt papaueris. Tres eius differentie. Vna semine nigro, floribus penè purpureis, similacis folijs, cytinis præduris & spinosis. Alterius semen subflauum vt irionis, flores lutei, folia & siliquæ simpliciores, ambo insaniam gignunt, & soporem: ideo in communi vsu damnantur. Tertium genus, vt quod mitissimum esset, medici recepere: pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminuq; in maritimis ruderibusq; nascens. cuius

ius occasio si non adsit, rufum usurpari oportet. niger, ut deterrimus, improbat. Recentis semine, caulibus, folijsq; suis succus in sole exprimitur, & exicato humore, usus ad annum usque prorogatur: nam facile corruptione sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine. separatim in aqua calida tuso, & expresso. Liqueamentum autem succo lacteo praestantius est, & magis dolores finit. Contusa herba recens, addita trimestri farina, digeritur in pastillos, & reconditur. Liqueamentum primum, & quod a sicco semine exemptum est, collyrijs, quae doloris sensum auferunt, commodissime inferi solent. contra acutas, calidasq; fluxiones, dolores aurium, atque vulvae mala prosunt: cum farina autem, aut polenta, oculorum pedum, ceterarumq; partium inflammationes placant. Semen eadem praebeat: tussi, destillationibus, oculorum fluxioni, & doloribus efficax: contra mensium abundantiam, & erumpentem aliunde sanguinem, oboli pondere cum papaveris semine, & aqua mulsa bibitur: podagris subuenit: testibus inflatis, mammisq; tumentibus à partu, tritum ex vino illinitur. Alijs quoque cataplasinatis, quae doloris leuamentum praestant, admisceri solet. Folia omnibus medicamentis, dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta utilissime imponuntur. recens ad mitigandos omne genus dolores oblinuntur: sium vino terna, quaternave pota sanant.

algidas febres, quas epialos vocant. Cocta olerii modo folia, si acetabuli mensura manduntur, mediocrem insaniam gignunt, idem efficere tradunt, si colo vlcus sentiente, infundantur. Radice in aceto deacta, dentes in dolore colluuntur.

Psyllium. C.A.P. LXV.

PSyllion folijs est coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus sarmentosa fœni modo, in totâ herbula, ramis dodrantalibus: coma à medio caule exoritur, duobus tribusve cœuolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, publicum simili, vnde & nomen, in aruis, & incultis nascitur. Vis, et ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conueniens: articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, luxatis, illitum auxiliatur: imponitur in dolore capitis, cum rosæo aqua, aut aceto; enterocelis infantium, & prominenti vmbilico, illitum ex aceto medetur. Teritur acetabuli mensura, & in aqua sextario madefactum, ubi concreuit aqua, illinitur: siquidem vehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum calorem reprimat, contra ignes sacros efficax est. Fama est, si virens domum importetur, non sinere in ea publices gigni. Cû adipe tuum sordida vlcera, & qua cacœthe vocantur, expurgat, Succus vermiculosis auribus, aut flu-

xione laborantibus. ex melle prodest.

Solanum hortense. CAP. LXVI.

Hortense Solanum frutex est cibus idoneus, exilis, pusillus, multis concavis alis: folio nigro, maiore quam ocimi, & latiore: fructu rotundo, viridi, qui post maturitatem nigrescat, aut fulvescit. herba innocentis gustus. Natura ei refrigerandi: quare folia vlieribus quæ serpunt, & ignibus sacris, conuenienter cum polline polenta illinuntur. ægilopia, capitisque dolores, trita & imposita per se sanant: astuanti stomacho auxiliantur: parotidas cum sale detrita illitu discutunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum, atque vlcera quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo, & argenti spuma: ad ægilopas cum pane: infantium adustioni, quam syriasim vocant, cum rosaceo perfusus proficit: in collyrijs, aquæ vel oui vicem exhibet, contra acutas fluxiones illitus: aurium dolori instillatus prodest. mensuram abundantiam sistit in vellere subditus. Succus fuluo gallinarum cortalium fimo subactus, & linteo appositus, ægilopys præsentaneo est remedio.

Solanum halicacabum.

CAP. LXVII.

Est & aliud Solanum, quod peculiari nomine halicacabon, aut physalida, id est vesicariam vocant, folijs antedicto similibus, verum latioribus: cuius caules, posteaquam adoleuerunt, prona terram spectant: folliculis orbiculatis, vesiculis

ficulis similibus, in quibus semen continet fuluū, rotundum, laeue acmorum vna figura: quo coronarij vtuntur, corolis intexentes. Vim, vsumq; hortensis solani habet, verū cibus nequaquam expeditur. Regium morbum purgat, semine potu, & vrinam pellit. Ex vtraque herba succus extrahitur, qui siccatus in vmbra reconditur, ad eadem valens.

Solanū Somniferum. CAP. LXVIII.

Solanum somniferum, aliqui etiam halicabon appellant, fruticat multis ramis, densis, caudicosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, cotonea q; mali similium plenis: flore grādi, rubro: fructu in folliculis crocato: radice grandi, subrubro cortice vestita. nascitur in saxis, non procul a mari. Radicis cortex, in vino drachma pondere potus, somnificam vim habet, opio mitiorem. Semen vehementer vrinam cit. Corymbi duodecim hydropicis dantur: si quid numero adijciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. Succus pastillis inferitur, & medicamentis, quae doloris lenamentum praebeant. de coctus in vino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

Solanum furiosum. CAP. LXIX.

Solanum manicon aliqui persion, alij thryon appellantur. Huic folium erucij simile, maius
 x aliquan

aliquantò, satis acantho, quem paderota vocat accedens: caules à radice proceros emitit decem aut duodecim, vlna altitudine adoleſcentes: caput in cacumine oliuæ figura, ſed vt platani pilula hirsutius, verùm maius, latiusq;: florem nigrum: poſtquàm eo exiit, racemus exit rotundus, niger, denis aut duodenis acinis conſtans, ſimilibus hedere corymbis vt vna mollibus: radice firmatur candida, craſſa, caua, cubitali. gignitur in montibus: vento perflaris, & plataneatis. Radix drachma vnius pondere pota ex vino, facit ſpecies vanas, imaginesq; non iniuncundas obuervari: ſed duplicatus hic modus, ad tres uſque dies mentis alienationem aſſert: quadruplicatus interimit. Remedio eſt aqua mulſa copioſius pota, & vomitione reiecta.

Dorycnium. CAP. LXX.

DOrycnion Crateuas halicacabon, aut caleam vocat: frutex olea nuper prodeunti ſimilis. Naſcitur in petris non procul à mari, ramis cubito minoribus: folij olea ſimilibus colore, minuſculis, firmioribus, præter modum ſcabris: flore candido: ſiliquis in cacumine, ceu ciceris, denſis, rotundis: quinis intus aut ſenis ſeminibus, exigui crui magnitudine: lacubus, firmis, verſicoloribus. radix ad digiti craſſitudinem, & cubiti longitudinem adoleſcit. id ſomniſerum eſſe conſtat. Copioſius hauſtū mortē adfert. Nec deſuere qui dicerent, ſemen in amatoria expeti.

Man

Mandragoras. CAP. LX XI.

M Andragoram, aliqui antimelum, alij circaam vocant, quoniā videatur radix ad amatoria cōducere. Duo eius genera. niger, quæ semina existimatur, thridacias appellatus, angustioribus folijs, ac minoribus quàm lactuca, virosis ac graueolentibus, in terra sparsis: mala gerit sorbi similia, palida, odorata, in quibus semen veluti pyrorum: radicibus inharet bene magnis, binis, ternisve, inter se conuolutis, nigris foris, intus albis, crasso cortice vestitis: caulem non fert. Alter candidus, qui mas dicitur, nonnullis morion vocitatur. huius folia magna alba, lata, leuia vt beta: mala quàm alterius duplo maiora, colore in crocum inclinante, iucū dē cum grauitate quadam olentia, quorum pomorum cibo aliquantūm opiliones soporātur: rē dix alterius similis, maior & candidior, orbata & hac caule. Succus fit è cortice recentis radicis tuso, & prælis subiecto, qui in solatus, vbi concreuerit, fœtili reconditur. Malis quoque succus depromitur, sed aliquantō ignauior. Deliberatur radix, & traiectus lino cortex, ad vsum suspenditur. aliqui radices in vino ad tertias coquūt, et defecatiū ius seruant, cyathōq; vino vtūtur in peruigilijs, & doloribus, & ante sectiones, vssionesq; ne sentiatur. Succus duobus obolis ex mulso potus, vt veratrum, per vomitiones bilem atram, pituitanq; extrahit: verūm po

tu largiore vita adimitur. Medicamentis ocula-
ribus, & his quæ dolores finiunt, pessis quoque
emolientibus, admiscetur: semioboli pōdere indi-
tus, per se menses, & partus expellit: subditus se-
di pro balano, somnificus est. Radix ebur emolli-
re fertur, quæ senis horis cum eo decocta sit: &
ad accipiendum quam effingere obtaueris for-
mam ipsum facile præstat. Folia recentia conue-
nienter oculorum inflammationibus, & colle-
ctionibus, quas ulcera citarunt, cū polenta illi-
nuntur: duritias omnes, suppuraciones, strumas,
& tubercula discutiunt: stigmata sine exulcera-
tione delent, si quinis, senisve diebus sensim per-
fricentur. Folia servantur in murijs eosdem ad-
usus. Trita radix ignibus sacris ex aceto, & ser-
pentium iclibus ex melle, aut oleo medetur: stru-
mas, atque tubercula cum aqua dissipat: ar-
ticulorum cruciatus, cū polenta sedat. Fit citra-
coctionē vinum è cortice radicis ad hunc modum.
Ternæ minæ in vini dulcis metretam conjū-
tur. Datur ex eo terni cyathi, ijs qui setari, aut
amburi debēt, ut antè dictum est: siquidem nul-
lo tunc afficiuntur dolore, sed veterino quodam
pressi torpescunt. Mala soporem afferūt olfactu,
& etiam si mandatur: item expressus ex eis
succus, nimio tamē dolore percussus, obmutescūt.
Semen malorum potum vulvas purgat: apposi-
tumq; cum sulphure ignem non experto, rubra
fæminarum profluvia sistit. Scarificata, pun-
ctisq;

Etisq; multifariam raperta radice erumpens lachryma, cauo vase recipitur. Liguamētū autē succo lacteo præstantius est. sed non vbiq; , vt experientia docet, radices lacteum succum delacrymant. Alium tradunt esse mandragoram, nomine Morion, in opacis iuxta specus enatum: folijs albi mandragora, minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambientibus, quæ mollis est, & candida, paulo maior palmo, pollicemq; crassitudine æquat. Tradunt eam in pane, obsoniove drachma pondere deuoratam, vsum rationis intercipere. obdormiscit enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus impos, ternis quaternisve, ex quo data est, horis. Hac medici vtuntur cū scindēdi, vrēdiue necessitas adest. Antidotum esse volunt radicem, cum manico solano potam.

Aconitum. CAP. LXXII.

Aconitum, aliqui pardalianthes, alij cammoron, alij thelyphonon, alij myoclonon, alij theriophonon vocant. Folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora: & subhirsuta: caulē palmo altū: radix scorpj caudam æmuletur, et alabastri modo splendet. Torpescunt, vt fama est, scorpiones admoti radice, stupētq; : qui rursus ellebori contractu, exitantur. Oculorum medicamenti leuādi doloris gratia adijcitur. Enecat pantheras, sues, lupos, & feras omnes, in carnibus obiectum.

Aconitum alterum. CAP. LXXIII.

Est & alterum Aconitum, quod aliqui cynodonon, alij lycodonon appellant. Huius genera sunt tria: vnum, quo vtuntur venatores: alia duo in vsum suum vertere medici. è quibus tertium, quod Ponticum nominatur, plurimum in Italia, montibus Iustinis exilit, à priore distans, quoniam folia faciat effigie platani, crebriore densura, longiora, & multo nigriora: caulem siliicis pediculo similem, nudum, cubitali altitudine, aut ampliorem: semen in siliquis oblongis recondit: radices in modum squilla marinae circum nigrescunt. Quibus ad venationem luporum vtuntur: insertæ siquidē crudis carnibus, & denotate lupos necant.

Cicuta. CAP. LXXIII.

Cicuta caulem edit geniculatum, vt funis. Li, grandē, folia ferule, angustiora, graui odoratu: rami mox umbellæ in summo prodeunt: flores quoq; albicantes, & semen aniso candidius: radice non alta, concaua. Cicuta lethale venenum inest, suaq; vi refrigeratoria necat. Remedio est vini meraculi potus. Succus exprimitur cōtussis cacuminibus, priusquā semina, & coma siccificent, qui sole densatur in pastillos. Multus ad medendi rationem vsus est aridi: commodè miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia temperantur: ignes sacros, & vlcera quæ serpunt, illitis restinguit. Herba cū coma trita, & testibus

circumlita, libidinum imaginationes in somno
compescit, sed genitale resoluit. lat puerperarū
mammis apposita extinguit: in virginitate mā
mas coerces, & increfcere non patitur. pueris
præstat, vt eorum testiculi cibum non sentien-
tes intabescant. Efficacissima vis Cretica,
Megarenfi, mox Attica, & in Chio, & Cilicia
nascendi.

Taxus.

CAP. LXXV.

Smilax à Grecis, taxus à latinis appellatur,
Arbor à betis magnitudine, & foliorum eius
dem figura. in Italia, & Narbonensi Gallia
Hispania cōtermina nascens. Auicula quæ Itali
cæ taxi baccas deuorant, denigrantur: & qui
ederint easdem homines, alui profluuiū corripiū
tur. Narbona tã præsentis est veneni, vt si qui
dormiant sub ea, aut in eius vmbra subsideant,
ledantur, & sæpenumero moriantur. quare de
taxo hæc traduntur, vt ab ea caueamus.

Apocynum. CAP. LXXVI.

Apocynon, siue cynocrambe, brassica canina,
frutex est longis viticulis constans, malè o-
lentibus, lentis, vitiliumq; modo obsequiosis, fra-
ctu ferè inuictis: folio hedere, molliore tamen,
& per extremum acutius, lento, graui odore:
id luteo succo turget. Siliquæ cœ fabarum, fol-
liculari specie, digiti longitudine protendun-
tur: semine intus duro, paruo, nigro. Folia
cum adipe in panes coacta, canes, lupos, vul-

pes, & pantheras enecant, in cibo data, & protinus eorum coxendices resolvunt.

Nerium seu rhododendrum.

CAP. LXXVII.

Nerion aliqui rhododaphnē, alij rhododendron vocant. frutex est vulgaris notitia, longioribus quā amygdala folijs crassioribusq; flore in rosam conformato: fructu amygdalæ simili: corniculato. qui patefactus quandā lanosam naturam ostendit, spinarum pappos representantem: radice longa, acuta, lignosa, gustanti salsa, nascitur in amoenis, maritimis, & secus amnes. Flores, & folia mulis, canibus, asinis, & quadrupedū plurimis venena sunt, hominibus verò cōtra serpentiū morsus præsidia, è vino pota, eò magis ruta addita. Imbecillæ etiam animates vt pecus, & capra, si aquam bibant, in qua folia ea maduerint, moriuntur.

Fungi.

CAP. LXXVIII.

Fungorum differentia duplex: aut enim māduntur, aut perniciales sunt. Multis de causis venenosi gignuntur, vbi videlicet clauus ferrens, in quo sit rubigo, aut panni marcior adfuerit: aut si iuxta serpentis cauernam, arborēsve, quæ priuatim pariūt noxios fructus, erūpant. Cōtinent qui tales sunt, nescio quod strigmentū, concretamq; pituitam, terraq; eruti, quàm celerrimè computrescunt, atque marcore vitiantur. Sed qui veneno imbuti non sunt, suauem in

iuri

iuribus gratiam habent: largius tamen sumpti nocent, & agrius concocti strangulant, aut choleram morbum citant. Remedio est nutri potus, aut licinium cum acida muria, aut feruesfacta satureia, aut origani iusculum: debellantur etiā gallinacei fimi potu ex aceto, aut eiusdem delinctu cum melle multo. Corpus alunt, sed agrè dissoluantur, cum magna ex parte integri ipsi cum recrementis alui reijciuntur.

Colchicum. CAP. LXXIX. Censetur

Colchicon, aliqui phemeron, sunt qui agre Hermodactylum bulbum vocant. Autumni exitu flos etylus offerrem edit croci, candicantem: ab eo tempore folia cinarum. bulbi, sed pinguiora: caulem palmo altum, ferentem rufum semen radicem foris è nigra rufescentem, quæ delibrata, cædida, et mollis spectatur, lactea succo madet, atque gustatu dulcis inuenitur: bulbus eius mediā habet rimā, fissuramq; qua flos erumpit. Plurimū in Messenia, & Colchis enascitur. Ea comesa, fungorum more, stragulo enecat. Hæc autē depinximus, ne à quoquam imprudenter pro bulbo deuoretur, mirū enim in modū saporis voluptate imperitos allucit. Remedio sunt eadem, qua fungis: bulbulum etiam lac potum auxiliatur. itaque cum adfuerit, non aliud desideratur auxilium.

Ephemcrum. CAP. LXXX.

Ephemerō, aliqui syluestrem irin appellant. Folia habet lili, sed tenuiora: caulem pa-

rem: florem candidum, amarum: semen molle: radicem vnā, digitali crassitudine, longam, adstringentem, odoratam. nascitur in syluis, & opacis. Huius radix dentibus precipua, si decocto colluantur. Folia in vino cocta, discutiunt tumores, & tubercula, quae nihil adhuc humidi contraxerunt.

Helxine. CAP. LXXXI.

Officinis
parietaria.

HElxine nascitur in parietinis, sepit, & maceris. folia ei mercurialis insunt, hirsuta: cauliculi subrubentes, & circa eos veluti semina aspera, adhaerentia vestibus. Folia refrigerandi, spissandiq; naturam habent. quae ex causa sanant illi sacros ignes, adusta, condylomata, panos incipientes, tumores, inflammationesq;. Succus eius cum cerussa, ignibus sacris, & ulceribus quae serpunt, commodè illinitur: imponiturq; podagris cum hircino adipe, aut cerato cyprino: veterem tuum emendat, instar chyati haustus tonsillis inflammationem sentientibus vtiliter & gargarizatur, & oblinitur, aurium dolori cum rosaceo, instillatus leuat.

Alfine. CAP. LXXXII.

Alfinen, aliqui antyllion, nonnulli myota vocant, quoniam musculorum aures folia imitantur. Lucis, opacisq; gaudet, vnde alfine dicta est. Haec erat eadē, quae helxine, nisi humilior esset, & folijs minoribus, nec hirsuta. vteritur, odorem cucumis reddit. Vim refrigerandi

randi, adstringendiq; obtinet: oculorum inflammationibus cum polenta illinitur: Succus aurii doloribus infunditur. quin & emendat omnia quæ helxine, id est, muralis herba.

Lens palustris. CAP. LXXXIII.

Lens palustris inuenitur in aqua non fluente. Officinæ
 te, muscus lenticula similis, refrigeratoria lenticula
 natura. Propter quod cōueniēter collectionib⁹, igni aqua.
 sacro, & podagris illinitur per se, & cum polenta,
 glutinat & procidētia puerorū interanea.

Sedum maius. CAP. LXXXIIII.

Semper viuum magnū ideo nominatur, quoniam
 niam perpetuò folia vireant. cuius caules cubiti
 altitudinem implent, interdum excedūt, pingues,
 crassitudine pollicari, virentes, charactia tithymali
 modo infecti: folia pinguia, carnosissima, longitudine
 pollicari, in cacumine lingue similia, alia in terram
 conuexa, alia in capite stātia inuicem, ita vt ambitu
 effigiem imitentur oculi. nascitur in montibus, & testaceis: supra
 domicilia etiam seritur. Eius vis refrigerare, & adstringere.
 Medentur igni sacro, romis, vlceribus quæ serpunt,
 oculorum inflammationibus, ambustis igni podagris per se,
 & cum polenta illita folia. Succus capiti in doloribus,
 cum polenta, aut rosaceo persunditur: datur in potu cōtra
 phalangiorum ictus, dysenteriam, aluiq; profluvia:
 teretes tineas potus in vino excutit: subditus in vellere,
 mulierum abundantia sistit.

Succus

Succus oculorum lippitudinibus, sanguinis vitio conceptis, iungitur.

Sedum minus. CAP. LXXXV.

Semperuium parum in petris, parietinis, et Smacerijs, necnon scrobibus opacis nascitur, caulibus ab vna radice multis, tenuibus, crebro foliatis: exilibus folijs rotundis, pinguibus, mucronatis: caule à medio emicante, palmum alto, umbellam, herbidosq; flores, & tenues gerente. Folia eisdem cum priore viribus prædita sunt.

Sedi genus tertium. CAP. LXXXVI.

Tertium videtur semperuii genus, quam aliqui andrachnen agriam, aut telephon vocauerunt. Romani illecebram, pusillis, crassioribusq; folijs, hirsutis, portulaca proximis. nascitur in saxis. Vis ei excalectoriam, acris, illita cum oxungia strumas discutit.

Umbilicus veneris.

CAP. LXXXVII.

Cotyledon, siue umbilicus Veneris, folio est in acetabuli formam tornato, ineuidenter concavo, breui in medio cauliculo, in quo semē inest: radice oliuæ modo rotunda. Succus cum vino circumlitus, instillatusve contecta genitalia nudat: inflammationibus, sacris ignibus, strumis, pernionibus, illitu auxiliatur: stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesta, calculos frangunt, urinam cient: hydropicis ex melle dantur. Herba vtuntur ad amatoria.

Vmb

Vmbilicus veneris alter.

CAP. LXXXVIII.

Est et alterū vmbilici Veneris genus, cymbalion aliqui, vocant, pinguis folijs, latioribus, ligularum modo, densis circa radicem, medium oculi ambitum describentibus, vt in maiore semper uiuo, adstringentis gustus, cauliculo tenui, in quo flores & semina hyperici: radice maiuscula. Facit eadem, quæ semperuiuum.

Vrtica. CAP. LXXXIX.

Dvo vrtica genera. Altera syluestrior, asperior: latioribus, nigrioribusq; folijs: semine lini, sed minore. Altera non æquè aspera, minuto semine. Folia vtriusque illita, canis morsibus addito sale, medentur: gangranas, carcinomata sordida vlcera, & quæ cachoërt he vocantur, itē luxata, panos, tubercula, parotidas, suppurationesq; sanant: lienosis cum cerato imponūtur: faciunt ad profluvia narium cum succo trita, & naribus indita: menses ciunt eadem detrita cum myrrha, & imposita: procidentes vuluas recentia contactu resilire cogunt. Semen potū ex passo venerem stimulat, & vuluæ ora patefacit: cū melle delinctum orthopnææ, lateris & pulmonū inflammationibus prodest, thoracem expurgat, erodentibus medicamentis admiscetur. Cocta cū conchis folia aluum emolliunt, vrinas mouent, inflationes discutunt: decocta cum ptisana, virtua pectoris extrahunt: mulierum menses euacuant

cant, cum myrrha modico pota. Inflammatione turgentem tuam, gargarizatus succus reprimat.

Galiopsis. CAP. XC.

Galiopsis, frutex in totum caulem, & folia habet vrtica, lauiora, & quæ grauem odorem trita reddant: flore purpureo, tenui. nascitur circa sepes: adificiorum areas, ac semitas ubique. Folia, caules, semen, succusq; , duritias, & carcinomata dissipant: struinas, panos & parotidas discutiunt. Oportet bis die tepidum ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere, ad putrescentia, gangranas, & nomas, cum sale efficaciter illinuntur.

Galion. CAP. XCI.

Galion nomen ex eo traxit, quod in contrahendo lacte, coaguli vicem impleat. ramulū foliumq; habet apparina similitum, rectum: florem in cacumine luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. Flos igni ambustis illinitur, & sanguinis profuua sistit. Cerato rosaceo galion admiscetur, insolatum vsquedum albescat, & sic lassitudines reficit. Radix venerem concitat. Nascitur in palustribus.

Senecio. CAP. CXII.

Senecio cauliculo est cubitali, subrubro: folijs continuis: per extremitates eructa, modo diuisis, sed minoribus multo: luteis floribus, qui celeriter dissecli vanescunt in pappos. Nomen verò
fib

sibi vendicauit, quoniam flores capillorum ritus
 canescant radice superuacua. Nascitur maximè
 in macerijs, & circum oppida. Folia cum flori-
 bus refrigerant: quare illita cum vini modico,
 vel per sese, testium & sedis inflammationes sa-
 nant: quin & ex manna thuris medentur, cum
 reliquis vulneribus, tñ ijs quæ nerui acceperunt.
 Illi per se cum aceto pappi, idem munus præstāt:
 verum recentes epoti, strangulant. Totus caulis
 si coctus in passo potui detur, stomachi dolores
 à bili contractos persanat.

Thalictrum.

CAP. XCIII.

Thalictum folia coriandri habet, pinguiora
 paulò: caulem rutæ crassitudine, in quo so-
 lia. Quæ trita illitu antiqua vlcera ad cicatri-
 cē perducunt. Nascitur maximè in cæpestribus.

Muscus marinus.

CAP. XCIII.

Marinus muscus nascitur in scopulis, testa-
 ceisq; haud procul à mari, gracilis, capilla-
 ceus, caulis ex pers. Præcipua ei spissandi vis &
 collectiones colubendi, & podagras, quas refri-
 gerare opus sit.

Fucus marinus.

CAP. XCV.

EPhyci marini generibus, quoddam latum,
 & alterum sublongius, & rubens: tertium
 cædidum, nascens in Creta, floridū valde quod
 nulla correctionis labe polluitur. Omnia vim hæ-
 bent refrigeratoriā, non podagra modò, sed etiā
 inflammationibus, in cataplasmatibus efficaciter
 util

utilem: verum ijs vti humidis conuenit, priusquam exarescant. Nicander puniceum aduersus serpentes dedit. Hoc fucos quidam putant mulieres suum colorem mentiri, cum tamen sit radix la eiusdem nominis, qua sese fucant.

Potamogetum. CAP. XCVI.

Potamogeton, folium betæ simile, hirsutum, paululum supereminens extra aquam. Refrigerat, & inspissat: pruriginibus vtile, & contra veterum vlcerum nomas. Nomen ex eo inditum est, quod palustribus, & aquosis nascatur. Stratiotes. CAP. XCVII.

Stratiotes in aquis nascens, iisdem supernatat, & sine radice viuit, vnde cognomen traxit. Herba semperuiuo similis, ni maiora haberet folia. Quæ refrigerant: sanguinem, qui defluit à renibus: pota sistunt; vulnera quæ inflammationem minantur, intumescere, non sinunt: ignibus sacris, & tumoribus ex aceto illuntur.

Stratiotes millefoliū. CAP. XCVIII.

Vulgatum millefolium.

Stratiotes miliefolium exiguus frutex, palmiti altitudine, aut amplius assurgit: folijs auium pulli penas imitantibus, breuis admodum, dissectoq; foliorum exortu. Folia sylvestre cuminum simulant, præsertim breuitate, atque scabritia, breuiora paulo: densiore umbella, & pleniore. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modum anethi: flores paruas, & cædi-

dos. Nascitur in asperis agris, præcipuè circa semitas. Eximij vsus ad vlcera vetera, recentiaque profluentem sanguinem, & fistulas.

Verbascum. CAP. XCIX.

Verbascum differentias summas habet duas hoc nigrum, illud album: in quo mas, & femina intelligitur. Femina igitur folia sunt brassica, pilosiora multò, & latiora, candida: caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus: flores albi, aut ex luteo palescentes: semen nigrum: radix longa: gustu acerba, crassitudine digiti. nascitur in campestribus. Verbascum, qui mas appellatur, ob longius, arbis folijs, & angustioribus, tenuiori caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore, latioreq; constaret folio. Syluestre folia fert saluia: altas virgas, & lignosas, & circa eas ramulos, quales marrubij flores luteos, auri amulos. Sunt & phlomidès duæ, hirsutæ, rotundis folijs, humiles. Tertia lychnitis appellatur, ab alijs autem thryallis folijs ternis, aut quaternis, vel paulò pluribus, hirsutis, crassis, pinguibusque: apta ad lucernarum lumina. Radix priorum duarum adstringit: quare quod magnitudine ludurum talum æquet, in alui profluvio: conuenienter ex vino datur. Decoctum ruptis, convulsis, fractis, antiqua tussi auxiliatur: dētium dolorem collutione mitigat. Verbascum cui flos aureus, capillos tingit & quocunque abijciatur, blattas in se contra-

A his

lit. Coſta in aqua folia aduerſus tumores, & oculorum inflammationes illinuntur: ſyderatis ulceribus ex vino, & melle, cum aceto autem vulneribus medentur: cōtra ſcorpionum ictus ſunt auxilio. Sylueſtris folia ambuſtis igni ſunt cataplaſmata. Aiunt in folijs eius, quam ſœminam dicimus, aridos ficus omnino non putreſcere.

Aethiopis.

C. A. P. C.

Aethiopis folia habet verbaſco ſimilia, per quam hirsuta, denſa q̃; in orbem circa radicem imā redacta: caulem quadrāgulum, † ſcabrum, ſimilem apiastro, aut arctio, multis contuum alis: ſemen erui magnitudine, geminum, in vno conceptaculo: radices ab eodem ceſpite numeroſas, longas, plenas, glutinoſas guſtu: qua ſicca ingreſcunt, durantur q̃; vt cornua poſſint videri. Plurima naſcitur in Ida monte Iroadis, & in Meſſenia. Auxiliatur purulentis excreationibus, iſchiaDick, pleuriticis, arteria ſcabritijs, decocta radix, & pota: quin & cū melle, eclegmatibus vicem prabet.

ANNO TATIO.

† Hoc loco in vulgatis Græcis codicibus legitur *παχύν*, hoc eſt, craſſum. Quā vocem interpres Plinium fortè, vt ſolet, ſecutus omiſit. Sed cur nos non eam adiecerimus, fecit Oribafius, quem in hoc Plinio adſtipulari inuenimus.

Arcti

Arction. CAP. CI.

Arction, aliqui potius Arcturon vocant, semilis est verbasco folijs, nisi quod hirsutiora. & rotundiora sunt: caule longo, molli: semine minuti, paruo: radice tenera, alba, dulciq;. Decocta cum semine radix in vino, dentium dolorem mulcet, si contineatur ore decoctum: ambusta, pernionesq; fouentur eodem: bibitur aduersus coxendicum dolores, & stranguriam è vino.

Personata. CAP. CII.

Personata folia habet cucurbitæ, maiora tamen, hirsutiora, nigriora, & crassiora: caulem albicantem, quanquam et interdum vidua caule reperiatur: radice intus candida, foris nigra. Hæc drachmæ vnius pondere pota cum pimentisnucibus purulenta, & cruenta extus sientibus auxiliatur: trita dolores à contorsionibus artuum contractos, illitus sedat. Folia vtiliter antiquis vlcerebus illinuntur.

Petasites. CAP. CIII.

Petasites pediculus est cubito maior, crassitudine pollicis, à quo prægrande folium, galeæ modo amplum, ceu fungus dependet. Contra phagedenas, & vlcera quæ cacoethe vocantur, efficaciter illinitur.

Epipactis. CAP. CIIII.

Epipactis ab alijs elleborine, parua herba, exiguus folijs. Iacineris vitijs vtilis, & contra venena pota.

Fumaria. CAP. CV.

Fumaria fruticosa herbula est, pratenera, cō-
 friandro similis: folijs candidioribus, vndi-
 que numerosis, cineracei coloris: flore purpureo.
 Huius succus acris est: claritatē facit oculis, dela-
 crymationemq;: vnde nomē traxit. Illitus cum
 gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Cō-
 manducata herba biliosam vrinam trahit.

Lotus urbana. CAP. CVI.

Lotum urbanam alij trifolium vocant. na-
 scitur in hortis. Extractus succus, addito
 melle, oculorum argema, nubeculas, catererasq;
 caligines discutit.

Lotus syluestris. CAP. CVII.

Syluestris Lotus, quam trifolium minus ap-
 pellant, plurimum in Lybia gignitur, caule
 bicubitali, et saepe maiore, alis multis: folijs trifo-
 lij pratēsis: semine fœni graci, multò minore, gu-
 stu medicato. Vim calfaciendi, et leniter adstrin-
 gendi obtinet: vitia cutis in facie, maculasq; cum
 melle peruncta expurgat. Trita per sese, aut cū
 malua semine, in vino, aut passo bibitur: aptissi-
 mē contra dolores, qui vesicam male habent.

Cytisus. CAP. CVIII.

Cytisus frutex est albus in totū, vt rhān⁹
 Cramqs spargēs cubitales, & maiores: in
 quibus folia fœni graci, aut loti trifolia: minora
 dor

dorso medio prominēte. Ea digitis trita erucam olent, gustatāque cicer recens sapiunt. Folia refrigerant: tumores inter initia discutiunt. si cum pane trita illinantur. decoctum potu vrinam ciet. Nonnulli, quod apes alluciat, prope aluearia serunt.

Lotus Aegyptia. CAP. CIX.

Est & in Aegypto lotus, quæ in campis flumini inundatis provenit, caule fabæ, flore paruo. candido, lilio simili, quem tradunt occidente sole comprimi occluditq; ad ortum autem aperiri: adduntq; caput ipsum vespera aquis condi, & ad exortum solis emergere. Caput quale papaueris, maximum: & intus grana, ceu milij, quæ Aegyptij exiccant, & in panes cogunt. Radicem lotos hæc habet, mali cotonei similitudine, quæ cruda cocta q; manditur: decocta q; lutei oui qualitatem exhibet.

Millefolium. CAP. CX.

MYriophyllum, siue millefolium, caulis est tener, singularis, vnica nixus radice: plurimus folijs, lanibus, sceniculo similibus, vnde nomen accepit. Caulis flavescit, varius, ac veluti ex industria deliniatus. nascitur in palustribus. Vulnere recentia ab inflammatione vindicat, si vel viride, vel siccum ex aceto oblinatur: precipitatis in potu cum aqua, & sale datur.

Myrrhis. CAP. CXI.

MYrrhis simillima est cicuta, caule, folijsq;

radix ei oblonga, mollis, rotunda, odorata, cibo
nō insuavis. Quæ pota in vino, phalangiorum
morsibus auxiliatur: sit menstrua, & partus
secundos, purgâtque à puerperio feminas: subue-
nit & phthisicis cōcta in forbitiōne. Aiunt quo-
que eandem bis die tēre potam ex vino, in pe-
stilentia salutarem esse, & ne morbi contagia se-
tiantur, obstore. Myagrum. CAP. CXII.

MYagron, aliqui melampyron vocant,
herba est surculacea: folijs rubia, palli-
du, tripedanea: semen oleosum, feno græco simi-
le. Quod contusum igni torrent, peruntisq; vir-
gis ad lucernarum lumina vtuntur. Hoc pingui
scabritias corporis lauigari, atque expoliri con-
stat. Onagra. CAP. CXIII.

ONagra, siue onothera, aut onuris frutex
est arboris instar, prægrandis, amygdalino
folio, sed latiore, lilio non dissimili: flore, rosaceo,
magno: radice candida, longa, cūm siccata est vi-
num olente, nascitur in montibus. Aqua, in
qua radix maduerit, in potu data, feras miti-
gat, & cicures facit, illita quoque tetra vlcera
multet.

Cirsium. CAP. CXIIII.

CIRSIUM, caulis est tener, duorum cubitorū
triangulo similis: ab immo foliola, rose spe-
ciem referentia: anguli spinosi, per intervalla
molles; folia buglosso similia, longiora, subcandi-
da, modicè hirsuta, partibus extremis aculeata:

caecumen caulis orbiculatum, hispidum: in quo capitula in summo purpurea, qua soluuntur in lanugines. Radicem huius loco laboranti adalligatam; dolores varicum sedare Andreas scripsit.

Aster Atticus. CAP. CXV.

Aster Atticus cauliculus lignosus, florē in caumine habens purpureum luteūque, per ambitū diuisum, anthemidis modo, capitulum, foliolis stellæ modo radiatis: quæ autem caulem ambiunt folia, oblonga sunt, ac hirsuta. Feruētī stomacho, oculorum inflammationibus, proci-
dua sedi, ac inguinibus illitū auxiliatur. Tradunt purpureum florem, si ex aqua bibatur, anginis, & pueris comitiale malū sentientibus, opitulari. Inguinum inflammationi recentem illinire conuenit. Si aridus flos sinistra dolentis manu decerpatur, & inguinibus adligetur, dolore liberat.

Isopyron. CAP. CXVI.

Isopyron aliqui phasiolon ob similitudinē vocant, quoniam folium, quod est aniso simile, in pāpinos torquetur: capitula sunt in summo caule, tenuia, plena seminis, melanthij gustum imitantis. Contra tuſſim, & cætera pectoris vitia, semen ex aqua mulsæ bibitur: hepaticis, & sanguinem excreantibus vtile.

Viola purpurea. CAP. CXVII.
Iola purpurea foliū habet hedera minus,

tenuius, ac nigrius, nec multò dissimile: cauliculus à radice medius prodit, in quo flosculus suavisimè olens, purpureus. opacis, & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se, & ex polenta illinuntur aptissimè stomacho astanti, & oculorum inflammationibus, sediꝑ procidenti.

Cacalia. CAP. CXVIII.

Cacalia, quæ leōtice vocatur, folia fert magna, alba: è quibus medius caulis emicat, rectus: albus, florem ferens robori, aut oleæ similem, nascitur in mōtibꝫ. Radix in vino madefacta, vt tragacantha, delinctu aut manducatu per se tussibus, scabritijs arterijs medetur. Grana, quæ post excussum florē innascūtur, trita et cū cerato illita, faciē erugāt, & cutē extendunt.

Bunium. CAP. CXIX.

Bunium caulem edit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine: in quo ramuli minutis folijs, ac floribus scatent: folia proximè radicem, apio similia, longè tenuiora, coriandrini proxima: flores anethi: semen odoratū, hyoscyamo minus. Vrinam ciet, excalfacit, secundas euocat: lieni, vesicæ, renibus vtile. Tam humidum, quàm siccum, expressiq; succi caulibus, folijs, radicibusq; vsus inualuit ex aqua mulsæ.

Pseudobunium. CAP. CXX.

Pseudobunium palmi altitudine fruticat in Creta, folia, ramulosq; napi ferens, acri gustu

flu. Tormina, atque stranguriam, laterumq; dolores sanant quaterni rami eius poti in aqua: illiti quoque cum sale, & vino tepētes, strumas discutiunt.

Chamæcissus. CAP. CXXI.

CHamæcissos folio est hedera; tenuiore, longiore: ramulis à radice quinis senisve, dodratalibus, foliosis: flore violæ alba simili, candidiore, ac tenuiore, gustu supra modum amaro: radice tenui, candida, inutuli. nascitur in cultis. Bibunt conuenientissimè ischiadici folia, tribus obolis in aqua cyathis tribus, tricenis, quadragenisve diebus: eodem pota modo, senis aut septenis diebus, regium morbum purgant.

Chamæleuce. CAP. CXXII.

CHamæleuce lumborum doloribus propitia est. herba virens, incuruis folijs surculisq; flore rosaceo.

Buglossum, lingua bubula.

CAP. CXXIII.

Buglossum nascitur in campestribus, & sabulosis. Iulio mense colligitur. Aiunt eam, quæ tres thyrsos emittit, cum semine, & radice trita, potamq; contra tertianos horrores prodesse: quæ quatuor, ad quartanos: ea in vino decoquitur. Herbam abscessibus vtilem esse volunt. Verbasco simile est, solum in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitans linguas. Quod in vinum delectum, animi voluptates auget.

A 5 Cyno

Cynoglossum. CAP. CXXIII.

Cynoglosson folia latifolia plantaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa: caule vacat, & humi sternitur. prouenit in sabuletis. Folia cum suillo adipe veteri, medentur morfibz canum, alopecijs, et ambustis. Emollit alium decoctum herbae ex vino potum.

Phyteuma. CAP. CXXV.

Phyteuma folia habet struthij, minora: copiosum semē, perforatum: radicem paruam, tenuem, per summa terra nitentem. Quam ad amatoria conuenire, nonnulli scriptum reliquerunt.

Leontopodium. CAP. CXXVI.

Leontopodion duum digitorū herbula est, folia ferens angusta, longitudine ternum, quaternumve digitorum, hirsuta, quae iuxta radicem lanosiore flocco canescunt: capitula in summo caule quasi perforata: flores nigri: semē usque adeo spissa lanugine inuolutum est, ut saepe fallat: radice parua cohaeret. Quam tradunt appensam ad amatoria prodesse, & tubercula discutere.

Hippoglossum. CAP. CXXVII.

Hippoglosson, frutex est folia habens rusci tenuis figura, & spinosam comā, & in summo ceu linguas ē folijs exeuntes. Capitis dolorem corona ex comis imposita minuit. malagma is radix, succusq; admiscetur.

Antirrhinum. CAP. CXXVIII.

ANtirrhinon, alij anarrhinon, vocant herbam caule, & folijs anagallidi similem: florem alba viola; purpureo, minore tamen, ideoq; syluestris anagallis nominata est, semine vitulinarium simili. Tradunt perunclos ea cum oleo lilino, venustiores fieri, nec vlllo medicamento ladi posse, si quis appensum gestet.

Catanance. CAP. CXXIX.

EX eo genere vna, folia coronopi habet, longa: radicem iunci modo pratenuem: capitula fena, septenave, in quibus erui semen inest. Crescens in terram flectitur, & se contrahit ad speciem vnguium milui exanimati. Altera mali parui magnitudinem explet, radice exigua olivæ magnitudine: folijs quoque olivæ colore, & figura, mollibus, diuisis, humi inclinatis: semen vt cicer, minutum, in virgulis dependet, puniceæ coloris, multis foraminibus pertusum. Vtranq; narrant in amatoria expeti. Thessallica mulieres his vt tradunt.

Tripolion. CAP. CXXX.

TRipolion in marinis nascitur locis; quæ alludit vnda, recedensq; dimittit, neque in mari, neque in sicco: folio glasti crassiore: palmeo caule, in mucrone diuiso. Eius, vt tradunt, flores colorem ter die mutant, mane candidi, meridie

radie purpurei, sero punicei conspiciuntur. Radice alba, odorata, calidi gustus. Quæ drachma duabus in vino pota, aquam, urinamq; per aluum extrahit. In medicamenta digeritur, quæ venena arcent.

Adiantum. CAP. CXXXI.

Adianton, polytrichon, pusilla gerit folia, similia coriandri, in summo incisuris diuisa: cauliculi, quibus exoriuntur, nigro colore nitet, pratenuis, palmum alti: radice superuacua: neque caulem, neque fructu, neque florem profert. Decoctum herbe potum, prodest spirandi difficultati, suspiriosis, leni, & selle suffusis, & urina difficili: calculos frangit, aluum sistit, serpentium morsibus auxilio est: contra stomachi fluxiones in vino bibitur: secundas ciet, & menstrua: sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur, alopecias densat, strumas discutit: furfures, & mania capitis vlcera ex lixiuio emendat: defluentes capillos continet, cum ladano, & myrtino, & susino, aut hyssopo, vinoq;. Decoctum eius cum lixiuio, & vino infusum, idem praestat. Coturnices, & gallinaceos pugnaciores facit, in ciborum additum. Seritur gratia vtilitatis pecorum circa ouilia. Umbrosis, et palustribus, circa parietu aspergines, & fontiu specus enascitur.

Trichomanes. CAP. CXXXII.

Trichomanes nascitur eisdem in locis, quibus adian

adianton: filici simile, sed exilius: folijs lenticulae, tenuibus, in ordinem vtrunque digestis, aduersis in se, in ramulis tenuibus, acerbus, fusco colore splendentibus. Eadem quæ & adianton prestare posse constat.

Xanthium, siue lappa.

CAP. CXXXIII.

Xanthium nascitur, lato et pingui solo, et lacubus exiccatis, caule cubitali, anguloso, pingui, prodeuntibus ex eo crebris alis: folia atriplicis habet, insecta, nasturtium odore imitantia: fructum grandis oliuæ modo, rotundum, & ut platani pilula, spinosum, qui contactu vestibus adhærescit. Is antè collectus quàm perfecte siccescat, tunditur, & fictili vase reconditur. Flauos autem facit capillos, si acetabuli instar tepida aqua madescat, mox caput, nitro antè perfriellum, illinatur. Alij in vino tundunt, & ita afferant. Semen aptissimè tumoribus imponitur.

Aegilops, siue festuca.

CAP. CXXXIII.

Aegilops herbula folia tritici habet, sed molliora, in summo capite semina bina ternaverubra, quibus arista quasi capillacea exeunt. Illita cum farina herba ægilopij medetur, duritias discutit. Succus farinae admixtus siccatur, & eorundem gratia reponitur.

Bromus. CAP. CXXXV.

Bromus herba ægilopi similis, exiccatoriam vim

vim habes. Decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuri colato par. modus mellis adijcitur: rursus incoquitur, dū liquidū mellis. crassitudo fiat. Linteum eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam. vlcerum efficax est. Aliqui tritam aloē addunt, & eo modo vtuntur. Cum siccis rosis cocta in vino, grauem oris halitum emendat.

Glaux. CAP. CXXXVI.

Glaux cytiso, aut. lēticula folijs similis, quae supernē virent, auersa q̄; candidiora spectatur: ramuli à terra exiliunt quini senive, tenuis ab radice. dodrantem alti: flores viola alba, purpurei exeunt, minores tamen. nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, sale, & oleo in sorbitione, ad renocandam extincti lacris vbertatem.

Polygala. CAP. CXXXVII.

Polygala palmi altitudinem petit, folijs lenticulae, gustu. adstricto. Quae pota, lactis abundantiam facit.

Osyris. CAP. CXXXVIII.

Censetur:
Linaria
Vulgò ap
pellata.
Osyris frutex est niger, ramulos ferens ternos, lentos, fractuq; cōtumaces, & in his folia quaterna, quina, senave, ceu lini, nigra in initio, dein colore mutato rubescētia. Decoctum eius potum, iuuat arquatos.

Smilax aspera. CAP. CXXXIX.

Smilax aspera, folia habet periclymeni: sarmentia

menta tenuia, multa, rubi modo, aut paliuri aculeata: arbores scandit, ab imo ad summa perreptans, se conuoluēs eis: fert racemos exiles, qui maturi rubescunt, gustumq; leniter mordent. Nascitur in palustribus, & asperis: radice dura, crassaq;. Folia, & acini, & antè, & post epotia venenosorum antidota sunt. Tradunt, si infantibus nuper in lucem editis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodū venena nocitura. Inciditur etiam ad alexipharmaca, id est, ad ea medicamenta, quibus venena arcentur.

Smilax læuis. CAP. CXL.

Læuis Smilacis folia hederae similitudinem habent, molliora, lauiora, tenuiora: huius sarmenta supradicta similia, nullis horrent spinis: conuoluitur arboribus, vt prior: fructū parit lupini modo nigrum, exiguum, floribus in cacumine perpetuis, multis, rotundis. Hac similace, quadam topiariorum arte, tentoria cōtra æstus molestiam factitantur: folia per autumnū decidua. Semine cum dorycnio poto, ternis singulorum obolis, varia & tumultuosa in somnis obuersari, traduntur.

Ruscus. CAP. CXLI.

Syluestri myrtus, aliquibus oxymyr sine, aut myrtacantha. Latinus ruscum appellatur. foliū fert myrti, latius, in formā lanceæ mucronatū. haece per maturitatem rubescunt, rotunda.

da, à medio folio dependentes, osseo intus nucleos: cubitales ramuli ab radice exeunt, vitiliū modo lenti, fractu contumaces, foliosi: radice graminis simili, acerbā, & subamara. Folia, & bacca in vino pota, urinam cient: menses pollunt, vesica calculos frangunt, stillicidio vrinae medentur, dolores capitis sanant, & regium morbum. In asperis, & precipitibus locis enascitur. Decoctum radicis in vino potum, eosdem praebeſe. Etus. Cauliculi recentes, asparagorum vice in cibo sumuntur: amari autem sunt, sed urinam mouent.

Laurus Alexandrina. CAP. CXLII.

LAurus Alexandrina folio est ruscī maiore, molliore, & candidiore: semine inter folia rubro, ciceris magnitudine: ramos spargit in terra dodrantales, interdum longiores: radice sylvestri myrto simili, maiore, molliore, odorata, inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pondere in vino dulci, & stillicidio vrinae auxiliatur, sed sanguinem extrahit.

Daphnoides. CAP. CXLIII.

Vulgò
Laureola

DAphnoides cubiti altitudine fruticat, ramis flexilibus, obsequiosisq; multis, à medio sursum versus foliosis: cortex supra modum viscosus ramos vestit, folia lauri, graciliora, & molliora, fractu cōtumacia, quorum gustatu os & fauces incenduntur: flores candidi: bacca, cum

emartu

emarturuit, nigra: radix inutilis. nascitur in montosis. Pituītā extrahit folium recēs, vel aridum in potu: menses ciet, & vomitū: caput inanit commanducatū: sternutamenta mouet. Bac ca quindecim pota aluum resoluunt.

Chamædaphne. CAP. CXLIIII.

CHamædaphne virgas emittit cubitales, singulari ramulo constantes, rectas, tenues, leues: folia lauri similitudine, leuiora multo, ac viridiora: semen rotundū, rubens, annexū folijs. Illinuntur capitis doloribus trita folia, et stomachi ardores mulcent: ad sedanda tormina cum vino bibuntur. Potus cum vino succus menses, & vrinam ciet: idem facit pessō appositus.

Veratrum album. CAP. CXLV.

Elleborum album, Latini veratrum album vocant, fert folia plantaginis, aut betæ sylvestris similia, sed breuiora, & nigriora, & rubescē = Plin. catia: caulem cauum, quadrantalem, tunicis con- naliū uolutum, quas abdicat, cum arefcere incipit: rad- dorso ru- dicibus nititur multis, tenuibus, ab oblongo, & bescētia. exiguo capite ceparum modo exeuntibus, nascitur in mōtibz, & asperis. Radices mēsisibz colligendæ. Optimum habetur candidum, friabile, carnosum, modicè extensum, nec tamen iunci modo mucronatum, quod frangendo puluerem emittit, & tenuem habet medullam, gustu non admodū feruens, neque saluam subinde ciens, huiuscemodi autem strāgulat. Primatum Cyre

naicum tenet. Galaticum autem, & Cappadocicum candidiora, & puluere quodam obsita, alerius strangulatus mouent. Vomitione autem varios extrahit humores. Collyrijs admiscetur, quæ caliginem oculorum discutiunt. partus impositum necat, menses pellit, sternutamenta excitat: mures interficit, cum melle, & polenta subactum: absomit carnes, si cocatur vna. Datur per se ieiunis, & cum sesama, aut ptisana succo anthalica, aut lentis cremore, cum aqua mulsa, aut pulte, aut quavis alia sorbitione. Cogitur cum pane, & ita inassatur. Preparatio corporum, ac victus ratio diligenter tradita est, cum ab his quid de medica eius portione scriptitarunt, tum maxime à Philonide Siculo Ennensi, cui nunc assentimur: quippe longum nimis esset in hac præsertim editione de materia, simul medicam curandi rationem exponere. Dant nonnulli in pultis sorbitione, aut copioso halica cremore, aut paucum antea cibum dari præcipientes, statim veratrum offerunt, ijs præsertim, quibus strangulationis suspicio imminet, aut si valetudo corpus infirmat: hoc enim modo deiectionis nihil periculi minatur, quod cibo munitis non intempestiuè medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones conitant subdita ex eo balani cum aceto.

Veratrum nigrum. C A P. CXLVI.

Elleborum nigrum appellatur melapodion, quoniam caprarum pastor nomine Melapus furen

parentes in se Prætidæ primus purgasse &
 sonasse fertur. Folia ei viridia, platani simi-
 lia, minora, folijs sphodylij proxima, subæstera,
 nigriora, pluribus diuisuris incisa: caulis asper:
 flores in purpura albicantes, racematim cohæ-
 rentes: semen cnici, quod in Anticyra sesamoides
 vocant: quo deiectiones moluntur. Radicibus
 cohæret nigris, tenuibus. à capitulo cepæ simili
 confibratis, quarum est vsus. In colibus, asperis,
 & sitientibus locis enascitur. Optimum est.
 quod ex huiusmodi petitur terris, vt ex Anti-
 cyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eli-
 gi debet corpulentum, & plenum, in quo tenuis
 sit medulla, acre gustu, feruensq; cuiusmodi est
 in Helicone, Parnaso, & Aetolia natum: attam-
 en Heliconium præcellit. Veratrum nigrum
 purgat vêtrem detrahit bilem pituitasq; datū
 per se, aut cum scammonia, & tribus obolis siue
 drachma salis, decoquitur vel cum lente, & iu-
 sculis, quæ purgationis causa sumptiantur. Pro-
 dest morbis comitialibus, melancholicis, insanien-
 tibus, articularijs doloribus, & resolutis. Men-
 ses inditum trahit, partus necat: purgat fistulas
 impositum, & tertio die detractum. Item cōtra
 grauitatem auditus in aurem demittitur, ibiq;
 in alterum aut tertium diem esse finitur. Scabiē
 sanat illitum cū thure, aut cara, & pice et cedri
 no oleo: vitiliginibus, lepris, impetiginibus ex
 aceto medetur: dētiū dolorē collusione mittigat.

Eroderentibus medicamentis commiscetur: hydro-
picorum ventri vtilissimè imponitur factum ex
eo, farina hordeacea, & vino, cataplasma. Con-
sitū proximè radices vitiū vinū purgandi facul-
tate donat. Huius resparso domos expurgari
arbitrantur: quare inter fodiendum stantes,
Apollinem, Aesculapiumq; precantur, ac vitant
aquilæ volatus: aduolare enim non sine periculo
tradunt. nanque si auis effosionem alebori con-
spexerit, moriturum qui succidit, augurium est.
Celeriter effodiatur oportet, quoniam halitu ca-
put aggrauat: quapropter ad id arcendum, fos-
suri alium præsumere, & vinum bibere consue-
uerunt: nulli ita noxæ opportuni redduntur.
Veratri albi modo emedulatur.

Sesamoides magnum.

CAP. CXLVII.

Sesamoides magnum in Anticyra elleborum
vocat, quoniam albo veratro in purgatio-
nibus misceatur. Simile est senetioni, aut ruta lō-
go folio: flore candido: radice gracili, ignava: se-
men gustu amaro, cætera sesamæ simile. Ventre
detrahit. datur tritū ad bilis, pituitaq; deiectione-
nem, quantum tribus digitis capitur, addito ve-
ratri albi sesquibulo, ex aqua mulsa.

Sesamoides paruum. CAP. CXLVIII.

Sesamoidi paruo cauliculi sunt dodranta-
les: folia coronopi, minoræ, hirsutiora: & in cauli-
culorū cacumine capitula florū penè purpureorū
medio

medio eorū albo: semen sesamæ, fuluū, amarū: radix tenuis. Detrahit bilē, pituitasq; semē ex aqua mulsa potū dimidio acetabulo: illitū ex aqua tumores, ac tubercula discutit. Nascitur ī asperis. Cucumer syluestris. CAP. CXLIX.

Cucumis syluestris fructu solo distat à sati-
uo cucumere, quem longè minorem parit,
oblongis glandibus non dissimilē: folia, atq; sar-
menta satiui refert: radice candida, magna. Na-
scitur in sabuletis, & ruderibus. frutice intotū
amaro. Instillatus foliorum succus aurium dolo-
ri conuenit. Illita ex polenta radix, veterē om-
nem tumorem discutit: imposita cum resina tere-
binthina, tabercula rumpit: isciadicis insun-
ditur: podagras discutit, decocta ex aceto & illi-
ta. Eius decocto dentes in dolore colluntur. Ari-
da farina impetiginē, lepras, & vitiliginēs ab-
sterget: nigris cicatricibus colorem reddit, & in
facie maculas expurgat. Radicis succus sesquio-
boli pondere, & item cortex acetabuli quarta-
parte, bilem, pituitamq; deiciunt, præsertim in
hydropicis: deiectiones autem citra stomachi iniu-
riam mouet. Radicis selibra, in vini præsertim
Lybici hemina cōteritur, daturq; ex eo terni cya-
thi triduo, dum tumor abundē de primi cerna-
tur. E fructu huius cucumeris fit medicamentū,
quod Elaterium vocatur, ad hunc modū. De-
cerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, ser-
uantur nocte vna postridie imposito supra cra-

terem rariore cribro, vtriusq; manibus prehens, figillatim supino cultro, sursum versus aciem habente, finduntur, atque per cribrum humor in subiectum vas exprimitur: simulq; carnosum, quod h. est cribro, quò facilius excidat, eliditur, quod ita pressum est, residere sinitur, atque in vicinam peluim demittitur. Coaceruata autem in cribro semina dulci aqua persunduntur, & de novo pressa abijciuntur. Humor in pelui agitur, & linteis opertus, soli exponitur: dumq; steterit, tota supernatans aqua cum humore concreto, effunditur. Hoc verò identidem fieri solet, donec existens aqua liquefat: qua stillatim exhausta, sedimentum mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam protinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargant, & medium cavantes triplicatum linteum obtendant, per quod elaterium cum sua humiditate diffundunt, succatumq; in pillam, ut dictum est, conterunt. Alii pro dulci aqua marinam persundentes, ita eluunt. Alij in novissima lotionem mulsam aquam respergunt. Elaterium optimum esse constat, leue, non ponderosum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimum, quodq; lucernarum luminibus obiectum, facile flagret. Portaceum tamen scabrumq; , si turpidum spectetur, atque erui cinerisq; plenum sit, graue & riosum esse solet. Nec desunt, qui cuminis succo

amylum immisceant, vt candorem ipsum, & leuitatem imitentur. A bimatu ad decennium deiectionibus vtile est. Integer modus obolus est, minimus semiobolus, pueris chalci duo. si quidem copiosius periculum adfert. Bilem ac pituitam vtrâvis parte extrahit. optima suspiriosis est purgatio. quod si in animo sit deiectione moliri, aiectio salis duplo, & stibij quod colorare sufficiat, ex aqua, erui magnitudine catapotia dato, postea cyathus vnus aqua tepida sorbeatur. Ad citandas tamē vomitiones aqua diluēs elateriū, subiectas linguae partes penitissimè pēna oblinito. quod si quisquā difficilins euomat, oleo, aut vnguento irino resolutio: somnum inhibeto. Porro his, qui eximiē vacuantur, continuē vinum, & oleum dare conuenit: etenim vomendo restituntur. Quod si vomitiones nō finiantur aqua frigida, polenta, posca, poma, & qua stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Ciet elateriū menses, & partus enecat. in pesso subditū. morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum, & diuturnis capitis doloribus liberat. efficacissimè anginis illinitur, cum vetere oleo, melle, aut felle taurino.

Staphis agria. CAP. CL.

Staphis agria, siue herba pedicularis folia habet labrusca, diuisa: et cauliculos rectos, molles, nigrosq; : fert florem glasti: & folliculos virides similes ciceri, & in his radicem

triangulum, scabrum, ex nigro subfulvescente,
 intus album, gustu acrem. Grana quindecim, si
 trita in aqua mulsam dentur, crasum humorem
 per vomitum purgant: sed qui hauserunt, am-
 bulare debent. Prudenter tamē attendere oportet,
 et aquam mulsam continuo potui dare, quoniam
 pericula strangulationis inferunt, & fauces
 adurunt. Trita, & ex oleo illita phthiriasi
 prodest: item prurigini, & psoris. Cit plurimam
 pituitam commanducata: decocta in aceto, dentium
 dolori, colluto ore, subuenit: rhematismum
 gingivarum sistit: ulcera oris manantia cum melle
 sanat. Vrentibus malagmati imponitur.

Thapsia. CAP. CLI.

THapsia nomen ideo accepit, quod in Thapso
 eiusdem nominis insula, primum inuenta sit.
 Tota verò natura ferule similis est graciliore
 caule folijs fœniculi: umbella anethi in cacumine,
 à singulis surculis erumpente: flore luteo: semen
 quale ferule, latiusculum, sed aliquantò minus:
 radix foris nigra, intus candida, longa, acris,
 craciore libro vestita. Lactis extrahendi ratio
 hac est. Facto in ambitu scrobe cortices inciduntur:
 aut radix in fornicis speciem in se excavata
 cooperitur, quò merus succus confluat. oportet
 illuc sequenti die se conferre, & congestum
 succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila,
 & succus organo per quallum expressus, fœtili
 crasso insolatur. Aliqui folium unum terunt:
 sed

sed inualidior huiusmodi succus. Hoc autem interest, quoniam qui ab radice manauit, grauius olet, & humidus permanet: è folijs autem extractus excicatur, atque terebinthi iniuriam sentit. Qui succum colligit, stare debet non obuersus vento: aut potius cum dies apricus est, & à flatu fileat: quoniam ob halitus acrimoniam facies vehementer intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustulae. ob id prius liquido cerato, & adstringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Tam cortex radices quam succus purgandi vim habent, & lacteus succus in aqua mulsa potus: nam vtrinque bilem extrahunt. Radicis modus, quaterni oboli, cum tribus seminis anethi drachmis: succi, terni oboli: lactis, obolus vnus. quod eo amplius assumitur, periculosum est. Huiusmodi purgatio conuenit suspensiosis, & diuturnis laterum doloribus, reiectionibusque: datur in cibis, aut obsonio, quibus difficile sit vomere. Tam radix, quam succus omnium maxime, quae pares cum eis vires adeptae sunt, vim habent extrahentiam ex alto, ubi ex imo aliquid euocandum est, aut meatuum laxitas alio transferenda est. vnde succus illitione, aut radix recens affritu alopecias explent. Radix, succusque cum aquis cerae, thurisque portionibus, sigillata, liuoresque tollunt: sed non plus binis horis dimittantur: locus deinde aqua maris calida foveatur. Vicia cutis in face emendat,

cum melle illitus succus: lepras tollit: tubercula discutit, perunctus cum sulphure. In diuturnis pulmonum, laterum, pedum, articulorumq; valetudinibus utiliter illinitur. Valet ad integendam colicis glandem ijs, qui natura non circumfisione curti sunt: tumorem enim excitat, qui pinguium fotu emollitus, præputij iacturam refarcit.

Spartium.

CAP. CLII.

Spartion frutex est longas ferens virgas, sine folijs, firmas, fractu contumaces, quibus vite vinciuntur semē lenticula, in folliculis phasiolorum modo nascēs: florem, ut alba viola, luteū. Purgant per superna vehementer ellebori vice, citra periculū flores, & semina quinīs obolis in aqua mulsa pota. Semen deiectionē mouet: ramis in aqua maceratis mox tuis, extractus succus, ischia dicis, & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modo ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, et infundere ischiadicis clystere: strigmiēta autem elicit cruenta.

Silybum.

CAP. CLIII.

Silybon lata spina est. folia ferens chameleonis albi. Hac recēs cum sale oleoq; cocta estur. Radicis succus drachmæ pondere potius vomitiones ciet.

Glans vnguentaria.

CAP. CLIIII.

Glās vnguentaria fructus est arboris myricæ similis magnitudine anellanae nucis. cuius
nucleus

nucleus amygdalarum amararum modo tritus, humorem reddit: quo ad pretiosa vnguenta pro oleo vtuntur. Nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia, & Petra oppido secus Iudaeam. Praefertur plena, retens, candida, quae facile de libretur. Ea drachma pondere pota lienem absumit: cum lolij farina, et aqua mulsa podagricis illinitur. Psoras, leprasque, decocta in aceto: vitiligines, & nigras cicatrices cum nitro emendat: & cum lotio lentiliginos, varos, & papulas infacit, & cutis vitia tollit. Vomitiones mouet, & aluum cum hydromelite resoluit: stomacho aduersatur. Oleum, quod ea exprimitur, aluum potu ciet. Cortex eius magis adstringit: verum tussae, & expressae succus abstergentibus medicamentis adiucitur, quae aduersus prurigines, & scabritias idonea sunt.

Narcissus. CAP. CLV.

Narcissum sunt qui vt lilium, liriū mappellarint, folia profert porro similia, tenuia: multò minora, & angustiora: caulis vacuus, & sine folijs, supra dodrantem attollitur: flos albus, intus croceus, in quibusdam purpureus, radix intus alba, rotunda, bulbosa: semen velut in tunica, nigrum, longum. Probatissimum nascitur in montibus, suauis odore: ceteri porro imitantur, atque herbaceū virus olēt. Radix cocta siue estur, siue bibitur, vomitiora est: abustis igni potest cum exiguo molle trita. p̄ciosos nervos illi

illitu glutinat: luxatis malleolis, diuturnisq; articulo-
rum doloribus trita ex melle, & imposita
subuenit. Vitia cutis in facie, vitiliginisq; cum si-
mine vrtice, & aceto emaculat: cum eruo, &
melle, vlcerum sordes expurgat: abscessus rum-
pit concoctioni repugnantes, infixa corpori ex-
trahit, illita cum lolij farina, & melle.

Hippophaes. CAP. CLVI.

Hippophaes, quo fullones vestes interpo-
lant, in sabulosis, maritimisq; nascitur,
surculaceo frutice, vndique denso & largo, folijs
oleæ longioribus, mollioribusq; inter quæ candi-
cantes spinæ emicant, sicca, angulosa, intersitio
quodam distantes: flores hederæ corymbis simi-
les, racematim coherent minusculi tamen et mol-
les, candidi, ex parte rubescences: radix lacteo
succo madet, crassa, mollis, amara gustanti: ex
qua perinde ac thapsia, succus eximitur. qui per
se, & cum erui farina subactus, siccat, & ad
vsum reconditur. Syncerus pituitas, bilem,
aquasq; deijcit, oboli pondere: erui verò farina
subactus, quatuor obolis, cum aqua mulsa. Fru-
tex cum radicibus siccatus tunditur, & cum a-
qua mulsa dimidiæ hemina tritus datur. Radi-
ce, & herba liquamentum depromitur, vti in
thapsia, huius in purgationibus mod⁹ est drach-
ma. Hippophæstum. CAP. CLVII.

Hippophæston, id quod aliqui hippophaes
appellant, nascitur eisdem locis, quibus hip-
poph

pophaes, estq; spinæ fulloniæ genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore: inanibus tantùm capitulis: folijs paruis, spinosis: radículas habens molles, crassas. Succus radice, folijs, & capitulo exprimitur, & exiccatur. Datus cui voles, tribus obolis in aqua mulsæ, aquam pituitasq; detrahit: priuatim comitialibus morbis, nervorum vitijs, & orthopnœæ conuenit huiuscemodi purgatio. Ricinus. CAP. CLVIII.

Cici aut croton, nomen accepit à ricini anima Vulgo *caclis* similitudine. Arbor prouenit parua fici taputia altitudine, folio platani, maiore, leuiore, & nimis maior. griore: ramis, candicibusq; caulis, in arundinis morem: semine in vuis asperis, quod corticibus exutum ricinum animal representat. ex quo oleum nomine cicinum exprimitur, cibis fœdum, lucernis emplastrisq; vtile. Grana triginta numero purgata, trita potu pituitas, bilem, aqua q; per aluum extrahunt, vomitionesq; mouent. sed iniucunda admodum est, & molesta purgatio: siquidem stomachum vehementer subuertit. Tusa & imposita, vitia cutis in facie, varosq; expurgat. Folia cum polenta trita, inflammationes oculorum, tumoresq; leniunt: turgentes mæmas cohibent, eadem ex aceto illita, ignes sacros restringunt.

Tithymali.

CAP. CLIX.

Tithymali genera septem, quorum masculina

lus caracias appellatur, ab aliquibus amygdaloides: alter myrtites, qui femina existimatur, eumq; myrsinitem, aut caryitem vocant: tertius paralius: quem tithymalida appellarunt: alius helioscopius: quintus cyparissias: sextus dendroides, septimus platyphyllos dicitur. Characis caules supra cubiti altitudinem attolluntur, rubri, lacteo succo, atque acri madentes: folijs oleæ circum ramos, angustioribus, & longioribus: radice crassa, lignosa: pendet in cacuminibus caulium coma iunci, sub qua caueolæ foliolis balnearum similes in quibus semen continetur. nascitur in asperis, & montibus. Succus aluum purgat, trahit pituitam, bilémq; binis obolis in posca sumptis, & cum aqua mulsa vomitiones mouet. Appetente vindemiæ tempore succus, cum gestis ramulis, mox dissectis, & vase conclusis, excipitur. Aliqui adijciunt farinam erui, & in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos ternas quaternasve guttas instillant, vt cum his inarescant, quas ad vsus conducunt. Per se etiam tusus in pillâ, & in pastillos coactus reponitur. Porro cum extrahitur lac, neque quo ventus aspiret, stare quenquâ, neque manus oculis ad mouere conuenit, sed antequàm colligas corpus, præsertim faciem, collum, scrotumq; genitalis, adipe, aut oleo cū vino perungere. Fauces autem exasperat: quapropter utapotia cera, aut decocto melle oblini par-

est, & hoc modo dari. binas tamen ternasve flos purgationis gratia sumpsisse, scitum est. Recens lacex oleo, perunctos in sole capillos euellit: renascentesq; flavos et exiles efficit, deniq; omnes perimit. dentium cauernis inclusum, lenat dolores: sed cera dentes oblinendi, ne suo delapsu fauces & linguam vitiet. Tollit illitum impetigines, formicantes verrucas, pensiles, & quae thymi florem representant. valet aduersus pterygia, carbunculos, phagedenas vlcera, gangranas, fistulasq;. Legitur semen autumnis, & siccatum sole leuiter tunditur, feruefactumq; loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Semen, & folia lactei succi effectum praebent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui inueterant, admisto cum lacte lepidio, & caseo contuso. Radix drachmae pondere in hydromelite pota, per inferna trahit. decoctum cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore. Fœmina quam myrsiniten, aut caryiten vocant, similis suapte natura daphnoidi: folijs myrti, sed maioribus, firmis in cacumine acutis, & pungentibus: ramulos ab radice mittit dodrantales: fructum fert. æternis annis, nuci similem mordaci gustu. nascitur in asperis. Succus radix, semen, folia consimilem antedicto sortiuntur facultatem: sed ad citandas vomitiones inualidior hæc est. Aliud tithymali genus dicitur paralius, quæ tithymalida, aut mecona aliqui appellauere. Nasitur in maritimis, et ramis subrubentibus

bentibus: palmum altis, quinis, senisve à radice
 exeuntibus: folijs lini, angustis, parvis, oblongis,
 in versus quosdam digestis: capite in cacumine
 orbiculato, in quo semen, vt eruum, vario colori
 emicat: flos albus. Frutex totus cum radice la-
 cteo succo turget. Similes ad vsus reconditur. He-
 lioscopus dicitur, folijs portulacæ, tenuioribus,
 rotundioribusq; ramulis prodeuntibus à radice
 quatuor aut quinque, rubentibus, dodrantali,
 altitudine, tenuibus, lactis copiosi plenis: capit-
 anethi: semine velut in capitulis incisso. Helio-
 scopij nomen accepit, quoniam comas cum sole
 circumagat. circa oppida nascitur, potissimum
 in ruderibus. Colligitur succus, semenq; vt a-
 liorum. Eadem, quæ superioribus vires, non ta-
 men vsque adeò valida. Cyparissias in caulem
 exit dodrantalem, vel maiorem, sub rubrum: ex
 quo folia pini similitudine exoriuntur, mol-
 liora tamen, & tenuiora: & in totum nascentem
 pinum æmulatur, vnde nomen traxit. Can-
 dido succo madet: cui eadem vis, quæ superiori-
 bus. In petris nascens dendroides cognomi-
 natur. ampliter opacat, in cacumine frondosam
 spargens comam, succo lacteo prægnans, caulicu-
 lis rubentibus, folijs myrti. tenuioris, fructu
 characis. Eiusdem effectus, cuius superiores, simi-
 liq; modo reconditur. Platyphyllos verbasco
 similis est. Radix, succus, & folia per inferna
 trahunt aquas. Pisces necat, tusus, & aqua in

sparsus. Reliqua tithymalorum genera, quæ suprà scribuntur. idem efficiunt.

Pityusa. CAP. CLX.

Pityusam specie à cyparissia differre constat, etsi tithymalorum generi assignetur. Caulis supra cubiti altitudinem assurgit, geniculatus: folijs piceæ, acutis, exilibus: flore paruo, velut purpureo: semine instar lenticulæ, lato: radice crassa, candida, succo referta. quibusdam in locis frutex hic prægrandis inuenitur. Detrahit per alium radix drachmis duabus data in aqua malsa: item seminis drachma. succi cum farina subacti cochlearium in catapotio datur. modus foliorum drachmæ tres.

Lathyris. CAP. CXI.

Lathyris, quam aliqui tithymalum appellant, eamq; tithymalorum numero adscribunt, caulem emittit cubiti altitudine, & digitali crassitudine, inanem. gignuntur in cacumine alæ, & folia in caule oblonga, amygdalinis proxima, latiora, & lauiora: quæ autem in summis ramulis exierunt, minora conspiciuntur, aristolochiæ, aut oblongæ hederæ figura. In cacumine fructum summis surculis gerit, triplici loculamento insignem, rotundum, ceu capparin, in quo grana, intercurfantibus membranis, inter se distincta continentur, eruis, maiora, rotunda: quæ dum corticibus exuuntur, candida sunt & gustu dulcia. Nullus radiciis vsus: totus fru-

tex lacteo succo turget, vti tithymalus. Grana sex, aut septem in cata potio, aut cum ficis, aut palmulis deuorata aluum purgant: sed aqua frigida postea sorbenda, trahunt autem bilem, pituitam & aquas. Succus tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. cum Gallinaceo, aut oleribus folia decoquuntur ad eosdẽ effectus.

Peplus. CAP. CEXI.

Peplos frutex est lactei succi plenus: folijs, paruis, vt ruta, paulo latioribus: rotunda coma ferè dodrantali, humi respersa: semine sub folijs paruo, rotundo, minore quàm candidi papaueris. pluribus scatet auxilijs. Vnicam radicem habet, superuacuam, ex qua fruticat. nascitur inter vites, & in hortis. Colligitur mensesibus, siccatur in umbra, & continuè versatur. Fructus rufus & feruescens reconditur. Bilis, ac pituita detrahatur acetabulo eius in hydromelitis cyathopotio. Obsonijs inspersa conturbat. aluum muria conditur.

Peplis. CAP. CLXII.

Peplis, quam aliqui syluestrem portulacam vocant, Hippocrates. peplion, in maritimis maxime nascitur, late opaco frutice, candidi succi pleno: folijs satina portulacæ, rotundis, infernè rubentibus: semine sub folijs rotundo, vti in peplo, feruente gustu, radice singulari, superuacua, tenui. Colligi, & reponi, ac dari, vti peplos, & sale condiri solet. Easdem habet vires.

Cham

Chamæsyce. CAP. CLXIII.

CHamaſycen aliqui ſycen nominant. Ramos emittit quaternum digitorum, teretes, ſuccoſos, in terram deiectos: folia lentis, parua, pepalum planè referentia, tenuia, quæ à terra non attolluntur: ſemine ſub folijs rotundo, vt in peplo: neque caulem, neque florem promit: radice firmatur tenui, ſuperuacanea. Rami ex vino triti vulnæ dolores ſedant, in peſſo appoſiti: tollunt tumores, ac verrucas omnium generum illiti. Decoctorum cibo aluus reſoluitur. Succus ſimili effectu prodeſt. Illitus contra ſcorpionis iectus auxiliatur: adueſus caligines oculorū utilis, & hebetudines, incipientes ſuſſuſiones, nubes, cicatrices, cum melle inunctus. In ſquallidis, petroſisq; naſcitur.

Scammonia. CAP. CLXV.

Scammonia ramos ab vna radice emittit triū ſcubitorum, multos, pingues, & qui nonnihil craſſitudinis præ ſe ferant: folijs helxine, aut hederaceis, mollioribus tamen, hirsutis, & trian- gulis: flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente: radice prælonga, craſſitudine cubitali, candida, graui odore, ſucco-grauida. Legitur ad hunc modum ſuccus. Capite exempto, radix teſtudinis ſpeciem cultro excauatur: quo fit, vt in cauum confluat ſuccus, qui conchis demum excipitur. Alij ſcrobis in terra concauerato ſinu fodiunt, in quos ſubiectis iuglan-

diū folijs, profundunt succum. siccatumq; extra-
 hunt. Laudatur autem scammonium leue, niti-
 dum, rarum, & colore quàm simillimum tauri-
 no glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex
 Mysia regione Asia deportatur. Nec attendere
 solùm par est, si lingua tactu albescat (hoc enim
 euenit adulterato, quod admisto sit tithymali la-
 cle) sed longè magis antea narratis, item si non
 vehementer linguam exurat, id quod misti ti-
 thymali argumentum est. Natione autem Syria-
 cum, & Iudaicum deterrima habentur, graui-
 densa, erui farina, & tithymali. vitiosa. Succus
 drachmæ vnius, aut quaternum obolorum pon-
 dere haustus ex aqua pura, vel mulsæ, per infer-
 na bilē, et pituitam extrahit. Ad resoluendam
 aluum binos obolos cū sesama, aliòve semine sū-
 psisse satis est. Datur efficacioris purgationis cau-
 sa, succi tres oboli, cum duobus veratri nigri, &
 aloes drachma vna. Fiunt purgatorij sales, drach-
 mis viginti succi scāmonis in senos salis cyathos
 adiectis. Horum modus proportionē virium: in-
 teger quidē, tria cochlearia: medius duo: mini-
 mus, vñ. Radicis drachma vna, aut altera pur-
 gat cum ijs, quæ retulimus. Nonnulli decoctum
 radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cū horde-
 acea farina teritur, cataplasmate ischiadicis v-
 tili. Partus enecat succus, vuluæ in lana subdi-
 t⁹: tubercula discutit cū melle, aut oleo illitus. de
 cocto in aceto peruncta lepræ abiguntur, diu-
 tur

turni capitis dolores ex aceto, & rosaceo perfunduntur.

Chamelæa. CAP. CLXVI.

Chamelæa surculosa fruticat, ramis dodran-
talibus, folia oleæ similitudinem habent, te-
nuiora, & amara, quæ gustata linguam mor-
dent, & arteriam deradunt. Detrahit pitui-
tam bilêmque, folijs præsertim in catapotio
deuoratis. namque duæ absinthij partes, adiecta
chamelæa, vna hydromelite exipiuntur, & in
catapotia coguntur. ea autem in ventre non
liquefunt: siquidem quotquot fuere deuorata,
regeruntur. Folijs cum melle tritis, sordida vlce-
ra, & crustosa repurgantur.

Thymelæa. CAP. CLXVII.

Thymelæa est, ex qua granum Cnidium,
quod est semen ipsius, colligitur. Hoc Syri a-
polinum vocant, quoniam satui lini frutex sua
pte natura similitudinem referat. Virgas edit
pulchras, multas, tenues. binum cubitorum: fo-
lijs chamelæa, angustioribus, & pinguioribus
viscosis, gummosisq; si mordeantur: flore candi-
do: fructu myrti in modum rotundo, qui inte-
ritia v. ret, & tamen rubescit: inuolucrum fir-
ctus durum, foris nigrum, intus album. Hoc peu-
inferna bilem: pituitam, aquasq; detrahit, si vr-
ginti granorum pars interna bibatur: verum
fauces adurit. Itaque cum farina, aut polenta,
aut in vna acino dari debet, aut melle cocto ob-

ductum deuorari. Qui agrè desudant, trito semine cum nitro, & aceto inunguntur. Folia, quæ peculiariter cneorum appellantur, per messes colligi debent. & siccata in umbra recodi. Quibus dare libeat, antea tundere, & nervos eximere cõuenit. Illitum acetabuli modo cum diluta vini potione, aquã extrahit: mediocrius purgat, addita lente cocta, aut cõtritis oleribus. Thymelæa farina vna acerba succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Herba stomacho infesta, partus imposita necat. Nascitur in montibus, & asperis. Hallucinatur, qui coccon Gnidium fructum esse chamelæa existimant, decepti quadam foliorum similitudine.

Sambuscus. CAP. CLXVIII.

Sambuci duo genera. Vnum in arbore assurgit: surculos spargens arundinaceos, teretes, cauos, candicantes, proceros: folia iuglandis, ternæ quaternæve, ex interuallis circa ramos exeunt graui odore, minutim in ambitu secta: & in ramulorum cacuminibus, cauliculusq; circinata umbelle, quæ florem candidum pariunt: mox acinum terebintho similem, in nigredine subpurpureum, racemosum, succo madentem, vinosumq;. Alterum genus chamaæcte vocatur, Romanis ebulum. longè humilius est, magisq; herbaceo generi assignandum: caule quadrangulo, geniculato: folijs amygdalæ, ex interuallo longioribus, geniculatim expansis, pinnatisq;, graueolentibus.

bus, in ambitu ferratis, muscario sambucei: flore, & acino eiusdem: radice nititur longa, crassitudine digitali. Eadem vtriusque vis, & vsus exiccans, aluo detrahens aquam, stomacho inutilis. Folia olerum more coquuntur, ad pituitam, bilemque detrahendam. Caules teneri in patinis cocti, eadem efficiunt. Radix in vino decocta, et in cibis data, hydropicos adiuvat: prodest viperarum morsibus, eodem pota modo, vulvas emollit insidentium, decocto: patefacit eorum spiracula, & vitia corrigit. Acini in vino poti, eodem surgunt munere: denigrant capillos illiti. Folia, si pratenera ad mollia ex polenta illinantur, inflammationem mitigant: ambustis, & canum morsibus illitu profunt: ulcera quae dehiscunt in fistulam, agglutinant. ijs, qui prodagra tentantur, cum seuo taurino, aut hircino profunt illita folia.

Pycnocomum. CAP. CLXIX.

PYCNOCOMON constat eruca folijs, acrioribus, scabris, & crassis: caule quadrangulo: flore ocimi: semine marrubij: radice nigra, aut pallida, rotunda, exigui mali figura, terram redolente. inuenitur in saxosis locis. Semen gravia somnia, & tumultuosa facit, drachmis instar potum. tumores discutit, illitum cum polenta: & siccicula, adactosque corpori aculeos extrahit. Folia illitu tubercula, panosque discutunt. Radix eius in aqua mulsa di. um drachmarum pondere, album soluit, & bilem extrahit.

Apios. CAP. CLXX.

Apios ramulos duos siue tres iunceos spagit, rubros, tenues, qui à terra parum attolluntur: folijs rutæ, oblongioribus tamen, & angustioribus, herbaceis: semine paruo: radice hastula regie in formam pyri turbinata, rotundiore tamen, succi fecunda, intus habet corpus candidum, extra cortices nigros. Superior pars eius vomitione bilem, pituitasq; extrahit: inferior per aluum: tota vtrinq; purgationes mouet. Succum si libet eximere, tusa radix in fîchili mergitur, & agitata aqua, quod supernatat penia selectum, exiccatur. Purgat vtraq; parte is succus, sesquiobolo potus.

Colocynthis. CAP. CLXXI.

Coloquin-
tida offi-
cinis.

Colocynthis sarmenta, foliaq; satiui cucumeris emittit, per terram repentia, diuisa: fructum in speciem mediocris pile conglome ratum vehementer amarum, quem legere oportet, cum coeperit in pallidum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua malsa, melle cocto, myrrha, & nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Aresactæ pile teruntur, & infuse clysteribus prosunt neruorum resolutioni, coxendicium doloribus, & coli vitijs, vt quæ bilem, pituitam, & strigmenta, interdum etiam cruorem eliciant. fœtus ad motum enecant. Dentium dolorem tollit, si vicia repurgetur, & luto oblita cum aceto, &

nitro

nitro inferuescat, hocq; iure decocti dētes colluā-
tur. Si aqua mulsa, aut passum in eadem inco-
quatur, & sub diuo refrigescat, potu crassum
humorem, & strigmenta alui detrahēt: stoma-
cho supra modum aduersatur. subdita ex ea ba-
lano alui excrementa eūciuntur. Virentis succo
vtilissimè ischiadici perfricantur.

Epithymum. CAP. CLXXII.

Epithymon flos est è thymo duriore satureia
simili. Capitula habet tenuia, & leuia: &
in eis caudiculas, quasi capillamēta. Potum cum
melle detrahīt pituitam, bilemq; atrum per in-
ferna. Priuatim prodest melancholicis, & infla-
tis, acetabuli mensura ad quatuor drachmas,
cum melle, sale, & aceti exiguo. Plurimum in
Cappadocia, & Pamphylia gignitur.

Alypum. CAP. CLXXIII.

Alypon surculosa herba est, subrubra: gra-
tibus ramulis: tenuibus folijs: flore molli,
leui, & copioso: radice beta, tenui, referta acri
succo: semine epithymi. Gignitur in maritimis,
maximè Libyæ, quàm largissima, quanquam
alibi quoque plurima prouenit. Semen atram
bilem deicit, si mensura epithymo pari cū sale,
& aceto sumatur: verum interanea leuiter ex-
ulcerat.

Empetrum. CAP. CLXXIIII.

Empetron aliqui phacoides vocant. nascitur Galenice
in montibus, & maritimis, salso gustu: sed prasoides.

quò propius terreno: fuerit amarius sentitur. Trahit bilē, pituitā, & aquā, si bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

Vitis syluestris. CAP. CLXXV.

Vitis syluestris sarmenta vitis modo praelonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice: folijs hortensis solani, longioribus, ac latioribus: muscoso flore, et capillaceo: fructu, exiguis uuis simili, post maturitatem rubente: rotunda est acinorum facies. Feruesacta radix in aqua, & in cyathis duobus vini aqua marina diluti, pota, humorem alui ciet: ideo hydropicis datur. Vna eius vitia cutis in facie, & maculas omnes expurgat. Enascentes viticula, cibi gratia, sale conduntur.

Vitis alba. CAP. CLXXVI.

Vitem albam aliqui bryoniam vocant. Folijs, vituculis, pampinisq; satiuam vitem imitatur, sed hirsutiora sunt omnia: ea, quos prope se nacla sit frutices, suis clauiculis completitur: fructus rubens in vna dependet, quo coria pilis spoliuntur. Ex ea asparagi, qui prima germinatione exeunt, decocti in cibo, aluum, & urinam cient. Folia fructus, radix acrem vim sortiuntur: itaque vlcerum phagedani, gangrenis, chironijs, putrentium tibiarum tadio, effeciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat: vitia cutis in facie, varicq; lentigines, & cicatrices nigras emendat, cum eruo,

creata

creata Chia, & fieno græco. Eodem effectu prodest decocta in oleo, vsquedū liqueſcat: ſugillata tollit, & reduuias committit. inflammationes diſcutit illita ex vino: ſuppurationes rumpit. medicamento aptè immiſcetur, quod carnem eſe: inſecta oſſa extrahit, trita, & impoſita. Datur comitialibus in potu, drachma pondere, quotidie anno toto: prodeſt attonitis, & vertigine laborantibus, conſimiliter aſſumpia. Contra viperarū iſtus pota drachmis duabus, auxiliatur: partus necat: mentem interdum ſubturbat. Fœminarum locis appoſita partus, ſecundāsque morantes trahit: cit vrinam pota. Eclegma ex ea ſit cum melle. difficile ſpirantibus, ſtrangulatus oppreſſis, tuſſientibus, vulſis, ruptis, & laterum doloribus. Lienem ternis obolis pota ex aceto triginta diebus, conſumit: illinitur ad eadē cum fico. Ad muliebres quoque inſeſus decoquitur. ſiquidem vulūas purgat, ſed abortum facit. Succus è radice vere exprimitur, qui trahit pituitā cum aqua mulſa potus. Ad pſoras, & lepras ſemen efficaciter illinitur. Lactis abū dantiam facit ſuccus eius, ſi cum tritico decocto ſorbeat.

Vitis nigra. CAP. CLXXVII.

Nigra vitis, quā aliqui nigrā bryoniā vocāt, folia fert hederæ, ſimilaceis proxima, ſed maiora: caules etiā cognatos: capreolis ſuis arbores, quaſi adminicula, cōprehēdit: fructus race
mati

matim coherent, qui inter principia virent, & post maturitatem nigrescunt: radix foris nigra: intus bux eo colore nitet. Viticula, quæ primo germinum partu erumpunt, in olera recipiuntur: menses pellunt, vrinas cient, lienem absumunt: vertiginosis, comitialibus, nervorum resolutione tentatis prosunt. Radix eadem, quæ vitis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum vino exulceratis iumentorum cervicibus commodissimè illinuntur: luxatis itidem imponuntur.

Filix mas. CAP. CLXXVIII.

Filici folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex vno pediculo cubitali longitudine exeunt, multifida, & lateribus pinnata, subgravi odore: radice per summa cespitum, nigra, oblonga, filices multas fundente, subastringente gustu. nascitur in montibus, & saxosis. Radix latus tineas excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsa: melius si cum scammonia, aut veratri nigri totidem obolis detur: sed qui sumunt, alia prægustare debent. laborantes lienis incremento recreat. Radix & potu, et illitu cū axungia, vulneribus sagitta harundinea factis, est auxilio. cuius rei probatio talis fertur. Peribit filix, quam per ambitum sata copiosior harundo coronet: & contrà evanescens abibit harundo, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerit.

Filix fœmina. CAP. CLXXIX.

Filix fœmina folijs est filicis, surculosis, altioribus

ribusq; & quæ non singulari, vt illa: pediculo
fulciantur: radicibus longis, pluribus, obliquis,
quæ ex nigro in luteū flauescunt: aliqua etiā-
num rubræ inueniūtur. Pellunt lata interaneo-
rum animalia, cum melle, eclegmate sumpto: po-
ta cū vino drachmis tribus teretes tineas eijciūt.
Data faminis sterilitatem faciunt: & pragnā-
tibus abortum, si supergrediantur. Farina hu-
midis vlceribus, & cicatrici repugnantibus in-
spargitur: iumentorum ceruicibus medetur. Fo-
lia recentia in oleribus cocta mandūtur, vt ven-
trem emolliant.

Filicula. CAP. CLXXX.

Filicula nascitur in muscosis petris, & vetu-
stis arborū caudicibus, præsertim quercuū,
palmi altitudine, filici similis, subhirsuta, non
tenui perinde diuisura. Radix pilosa, in qua cō-
tinentur cirri, ceu polyporum, crassitudine digi-
ti minimi, coloris intus herbacei, austera aliquā-
tūm, & gustu subdulcis. Purgandi vim habet.
Coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta,
aut malua, ad aluum soluendam. Arida farina
aquæ mulsæ insparsa, detrahit bilem, & pitui-
tam: trita luxatis efficaciter illinitur, & aduer-
sus rimas, quæ inter digitos sunt.

Dryopteris. CAP. CLXXXI.

Dryopteris nascitur in veterum quercum
musco, filici similis, multò minore foliorū
incisura: radicibus inuicem implexis, hirsutis,
gust

gustu acerbis, in dulcedinem vergentibus. Psilothrum est cum radicibus trita: illinitur enim primum vsque dum sudorem euocet, mox sudor abluitur, & recens imponitur.

Cnicus. CAP. CLXXXII.

Officinis,
Cartami
ve.

CNicus folijs constat oblongis, per ambitum diuisis, asperis, spinosis: caule sesquipedali: capitulo magnitudine grandis oliuæ: flore croci: semine candido, alioqui rufo, longo, anguloso. Huius flore in obsonijs vtuntur. Seminis tussis, & expressi succus, cum aqua mulsæ, vel iure gallinacei, aluum purgat: sed stomacho aduersatur. Ex eo autem fiunt offula, quas placentulas vocant, adiectis succo amygdali, nitro, aniso, & melle decocto, quæ aluum emolliunt. Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nucis iuglandis magnitudinem impleant: è quibus ante cœnam duas, vel tres sumpsisse satis est. Ratio temperandi hæc est. Cnici candidi sextarius, amygdalarum tostatarum & delibratarum cyathi tres, anisi sextarius vnus, aphronitri drachma vna, cum carnibus triginta caricarum. Seminis succus lac coquit, & magis ipsum resoluendæ alui facultate donat.

Mercurialis. CAP. CLXXXIII.

LINOXOSTIS, aliqui partheniō, alij hermubotanion appellat, folijs constat ocimi, helixiæ cognatis, sed minoribus: ramulis duplici geniculorum modo cinctis, alarum cavis multis. fructu

fam. i

ſœmina, copioſo, quandã racemorũ ſpeciẽ præbẽte, mari è foliorum ſinu dependente, paruo, rotundo, ceu binis teſticularibus vnã coherentibus: frutice dodrãtali, aut maiore. Vtraque in oleribus manditur, ad aliũ ciendã. cocta in aqua, epoto iure, bilem aquamq; detrahit. Cõſtat, vt mares gignãtur, hũc jacere: vt ſœmina, illã, ſi à purgatione bibãtur, & trita folia genitalibus admo-ueantur.

Cynocrambe. CAP. CLXXXIIII.

CYnia, aut cynocrãbe, cauliculum binum dodrantum altitudine emittit, mollem, ſubalbidum: folia mercuriali, aut hedera ſimilia, certis interſitijs ſubalbida. ſemen folijs adharet, paruum, rotundum. Folia cum caulibus pota, alium cient. oleribus commendantur. Ius decocti & pituitam, & bilem, aquamq; detrahit.

Heliotropiũ maius. CAP. CLXXXV.

HELIOTROPIO magno flos eſt effigie ſcorpionis cauda, vnde ſcorpiuro ei nomẽ: & quoniã folia cum ſole circumagat, heliotropion ducitur. Folia ocimi habet, hirsutiora, candidiora, & maiora: ramuli à radice terni, quaterni, aut ſæpe quini exiliunt, multis alis concavi: flos in cacumine candidus, aut ſubfulvus, incuruatur vt ſcorpionis cauda: radix tenuis eſt, & inutilis. naſcitur in aſperis. Decoctũ herba ex aqua, fasciculo manus plena, potu pituitã, bilẽq; per aliũ extrahit: cõtra ſcorpionũ iclus in vino po-

zum, & illitū prodest, ad alligatur ad conceptus
arcendos. Auiunt per horam vnā ante acceſſio-
nes, ſeminis grana quatuor cū vino quartanas
finire, tria verò tertianas. Illitum ſemen formi-
cantes verrucas, penſilesq;: & i hymos, & epuy
Elidas exiccat. Folia infantium deſtillationibus,
quas ſyria ſeu vocant, podagriis, luxatiq;: vti-
liſſimò illinitur. menſes ciēt: partus trita, & im-
poſita pellunt.

Heliotropium minus.

CAP. CLXXXVI.

Heliotropium paruum naſcitur in paluſtri-
bus, iuxta lacus, folijs antediſto proximis,
rotundioribus: ſemine acrochordonum verruca-
rum modo, penſili, rotundo. Herba cum ſuo ſemi-
ne pota, adieſto nitro, hyſſopo, naſturtio, & a-
qua, latas tineas, teretesq;: excutit. Penſiles ver-
rucas, quæ acrochordones vocantur, cum ſale il-
lita tollit.

Scorpioides. CAP. CLXXXVII.

Scorpioides herbula eſt, folijs paucis: ſemine
ſcandæ ſcorpionis effigie. Illita ſcorpionum
iclibus præſentaneo eſt auxilio.

LIBRI QVARTI.

FINIS.



P E D A C I I

DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE

Medica materia.

LIBER QUINTVS.

Præfatio.



Vperioribus quatuor libris, amicissime Aree, tradidimus de aromatibus, oleis, vnguentis, arboribus, & earundem lacrymis, ac fructibus: item animalibus, melle, lacte, adipi, cerealibus, oleribus, necnō de omni radicum, herbarum, succorum, seminumq; ratione. In hoc autem totius operis quinto differemus de vinis, & metallicis à vitæ nostræ commentationem auspicati.

Vitis vinifera. CAP. I.

Folia vitium, & tritici capreoli, capitis dolores illius mitigant, & inflammationem stomachi, ardoremq; cū polenta. Folia etiam per se, ut quæ refrigerent, & adstringant, imponi solent. Potus eorum succus, dysentericis, sanguinem

D

exce

excreantibus, stomachicis, et grauidarum malacia medetur. Eadem efficiunt madefacti in aqua capreoli, & poti. Lacryma vitiū, quæ veluti gumi in caudicibus concrefcit, ex vino pota calculos pellit: illita lichenas, & psoras, leprasq; nitro prius perfrictas sanat eadem cum oleo sapius pilis illitis. psilotri effectum habet: maximeq; sanies, quam accensa sarmenta vitium viridia exudarunt: quæ & peruncta verrucarum infectiones extrahuntur. Cinis sarmentorum, & vinaceorum, detractis in sede condilomatibus, & thymijs, illitus ex aceto medetur: prodest luxatis & viperarū morsibus: contra lienis inflammationem illinitur cū rosaceo, & ruta, & aceto.

Labrusca. CAP. II.

Labrusca duorū generum est. Alterius vua non maturefcit, sed florētenuſ ænanthen nominatam perducit. Altera ad frugem peruenit, paruis acinis, nigra, & adstringens. Folia: caules, & clauicula, quibus repunt, vim habent culta viti similem.

Vua. CAP. III.

Vua recentes aluum turbant, & stomachū inflant. inoſcentiores, quæ decerptæ diu perdere, ideo quòd in eis copia humoris exiccatur vtilisq; ſiūt stomacho, & riſque, atque cibi auditatem excitant. In viti acis, & ollis ſeruata, eri & stomacho grata ſunt. aluum ſiſtunt, ſed deſiccam, & caput tentant: & ſanguinem excreanti

antibus conueniunt. Similesq; ,qua in musto fue-
re. Sapa, aut passò condita, stomachum magis in-
festant. At qua solem prius passè, in aqua cœle-
sti conduntur, minus vinosæ sunt, siticulosis, ar-
dētibus, & lōgū febribus salibres. Recōditi vi-
nacei inflāmatiis māmīs, rigētibus, ac præduris,
cum sale illinuntur. Decoctura eorum dysente-
ricos, cœliacos, & fœminas fluxione vuluæ labo-
rantes inuat infusa: ad desēssiones, ac fetus assu-
mitur. Nuclei acinorum adstringendi vim obti-
nent: stomacho vtilis sunt. Inspargitur farina
tostorum, polentæ modo, dysentericis, & cœlia-
cis, & solutis stomacho.

Vua passa. CAP. IIII.

Vua passa alba adstringentior est. Prodest
vesitata caro earum tussi, faucibus, renibus
ac vesicæ. Estur in dysenteria per se cum nucleis:
& decocta in patinis cum melle, admista milij,
ac hordei farina, & ouo, valet ad purgandum
caput: eiusdem gratia cum pipere commanduca-
tur. Testium inflāmationes sedat, illita cum lo-
mento fabarum, & cumini farina. Fauos, epiny-
ctidus, carbunculos, enatas in articulis putredi-
nes, & gangrenas, sine nucleis trita, & cum ru-
ta imposita sanat. podagræ conuenienter cum
panacis succo illinuntur: mobiles vngues illita,
celerius extrahit.

Oenanthe. CAP. V.

Oenanthe vocatur vitis syluestris fructus, cū

D a flo

floret. Recondi debet fictili non picato, collectaꝫ substrato linteo, in vmbra siccatur. Laudatissima in Syria, et Cilicia, & Phœnice. Vis ei adstrictoria: quare pota stomacho, ac ciunde vrina utilis. aluum sistit, ac sanguinis excreationes. Contra fastidia, & acorem stomachi, sicca, & illita efficax est. capitis doloribus tam viridis, quàm sicca ex aceto, & rosaceo pfunditur: sanguinolenta vulnera cataplasmate, & incipientes agilopas, oris vlcera, & genitalium nomas trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo ab inflammatione vindicat. Pessis miscetur ad sistendum sanguinem: contra oculorum delacrymationem, & stomachi ardores cum polline pollenta, & vino illinitur. Cinis cremata in testa candentibus prunis, facit ad oculorum medicamenta, reduuias, & pterygia, abscedentes gingiuas, cruentasq; cum melle sanat.

Omphacium. CAP. VI.

Omphacium succus est acerba vna nondum maturescētis, è Thasiavite, aut Aminaa. Oportet autem ante Canis ortum, expressam melliginem in rubro cre, linteo cooperto, insalare, vsq; dū cogatur: semperq; quod seruici vasis concretum hæsīt, reliquo humori permiscere: noctu verò à subdialibus locis in lectum referri, quandoquidem nocturni rores ipsum concrecere non sinunt. Eligendum est flauum friabile, vehementer adstringens, & linguam mordens.

Sunt

Sunt qui coquendo melliginem cogant. Prodest contra tonsillas, ruam, vlcera oris, humida ginginarum vitia, purulentas aures cum melle, aut passo: item ad fistulas, vetera vlcera, nomas que ex aceto. dysentericis, & mulieribus fluxione vulue laborantibus clystere infunditur: oculorum claritati, & scabritia, & erosionibus angulorum conuenit. Bibitur ad recentem sanguinis excreationem, etiam si rupta parte aliqua contingat: sed pauco, & equatiore est vtendum, valde siquidem exurit.

Vini natura. CAP. VII.

VIno vetere nerui leduntur, & reliqui sensus, quod tamen gustu suauius est: quare cauendū ijs, qui intestinae alicuius partis imbecilitatē sentiunt, attamen in secunda valetudine paucū aqua dilutū, innoxie sumitur. Nouū inflat, egrē coquitur, in somnia parit graua, et vrinā ciet. Aetate medium vtraq; vitia fugit: quare ad victus sanorum, egrorumq; vsurpatur. Album tenue, stomacho vtile, est ac facile in membra distribuitur. Nigrum verò crassum est, & concoctu difficile, carnē alit, & ebrietatem creat. Giluū, vtpote quod mediū est, medias inter vtrunq; vires habet. In secunda tamē, & sinistra valetudine, cū primis laudatur album. Quin & vina sapore distant. siquidē dulce crassis partibus constat, & difficilior à corpore expirat: stomachum inflat, aluum & interanea vt

mustum turbat, sed minus inebriat: renibus, & vesica aptissimum. Austerum per urinam celerius trāsit: sed capita dolore tentat, & temulentiam gignit. Acerbū ad ciborū per membra digestionū accommodatissimum: aluum, & ceteras fluxiones cohibet, minusq; urinam expellit. Nouum nervos minus tentat. Vinum aqua marina factum stomacho aduersatur, sitim stimulat, nervos infestat, aluo aptum, à valetudine se recolligentibus inutile. Passum, quod uis sole sic catis in area, aut in sarmento torrefactis exprimitur. Creticū cognomine, aut pramnion, aut protropon: & sepa, quæ sit musto igni decocto, Græci sirion, aut hepsēma appellant: nigra quidē, & quæ dicuntur melampsithia, crassa sunt, & corpora multum alunt: candidū tenuius: & heluola inter hæc media, medias sortiuntur vires. Omnia tamē adstringūt, & pulsus reuocāt, faciunt aduersus venena, quæ exulcerando vocant, ex oleo pota, & vomitionibus reddita: cōtra cicutas meconium, pharicū, toxica, & cōcretum in grumos lac: itē cōtra renū, & vesicæ pruritum, rostones, exulcerationesq; inflat tamen, et stomacho aduersatur. Priuatim, prodest melampsithium, si venter rheumati suum sentiat. Albū magis ceteris emollit aluū. Gypso conditū nervis officit, caput aggrauat. & incēdit, ac vesicæ aduersatur: cōtra venena ceteris aptius. Picata, aut resinata excalfaciunt, concoquūt: san-

guinem excreantibus inimica. Quæ verò aparchyta vocant, vt quæ admistâ sepam recipiunt, caput implēt, temulentiâ gignunt, ægrius in hælitum expirāt, stomachum malè habent. Inter Italica vina Falernum principē locum obtinet: quod inueteratum per quā facile coquitur, pulsus exuscitat, aluum adstringit, stomacho vtile: sed vesica nocet, atq; ijs qui visus hebetudinē sentiunt, & ad potus crebros minimè idoneum.

Albana crassioribus constant partibus, dulcior: stomachum inflant, ventrem emolliunt, sed concoctionem non aequè adiuuāt, & nerva sa minus infestāt: vetuste eadem austerum saporem concipiunt. Cecubum, cū sit dulce, est & Albano crassius: corpus, & colorē alit: ægrè tamē coquitur. Surrentinum valde austerum est: quare intestinorum, & stomachi fluxiones cohibet, & cū tenue sit, caput minus tentat: inueteratum suavius redditur, & stomacho vtile. Adriannū, et Mamertinum in Sicilia aequè crassū partibus gignuntur: modicè adstringunt, & ocysimè inueterātur, minusq; ob suam tenuitatem nervos tentāt. Paratypianum, quod ex Adriatico sinu defertur, odoratum, ac tenuius est: quare liberè epotum fallit, diu seruat ebrietatem, & soporem adfert. Istricum Paratypiano simile est, sed vrinam vehementius pellit. Chium tamen antedictis mollius, & aptū potui est. bene alit, & minus inebriat, fluxiones cohibet, oculorum

medicamentis utile. Lesbium facile membra subit,
 Chio leuius, & aluo idoneum. Ephesiū eandem
 vim habet, quod Phygelites nominatur. Verū
 Asianum ē Tmolo monte, Mesogites appellatū,
 capitis dolores ciet, & nervos lēdit. Cum verō,
 & Claxomenium, quoniam multam sibi ma-
 ris aquam vendicant, facile corrumpuntur: fla-
 tus mouent, aluum turbant, nervis officiunt. Vi-
 num omne (vt reliqua in commune dicātur) me-
 rum, ac syncerum, & sua natura austerum, ex-
 calfacit, facile in membra distribuitur, stomachū
 adiuvat, appetentiam ciborū inuitat: vires alit,
 ac robur auget: summum conciliat, & commen-
 dat colorem. Potum liberalius auxilio est contra
 assumptam cicutam, coriandrum, pharicum,
 ixiā, meconiū, argenti spumam, taxum, aco-
 nita, fungos ve: contra serpentium morsus, & o-
 mnium ictus, quæ refrigerando neccant, aut sto-
 machum in vomitiones effundunt. Facit ad lon-
 gas inflationes, rosionesq; precordiorum, ac di-
 stentiones, stomachi resolutionem, & si venter,
 aut interanea rheumatismum sentiant. Conue-
 niunt sudatoribus, & quibus corpus immodico
 sudore digeritur, maximè alba, vetera, & odo-
 rata. Quæ tamen vetustate dulcescunt, renibus,
 ac vesicæ acōmodatiora redduntur: vulneribus,
 inflammationibusq; in succida lana imponun-
 tur: tetra vlcera, & phagedænica, & fluxioni-
 bus obnoxia commodè persunduntur. Quæ ma-
 rinam

vinam non receperunt. austera, & alba, ad sanorum victus vsurpantur. In his prestant Italica, Falernū, Surrentinū, Cecubum, Signinum, & permulta Cāpaniæ, & Paratypianū ab Adriatico sinu, & Siculum, quod Mamertinū appellatur, Ex Græcis Chium, Lesbiū, te Phygelites ex Epheso. Crassa verò, et nigra stomacho negotiū exhibent, inflationē pariunt, corpus augment. Tenuia tamē, & austera stomacho prosunt, & minus carnes alunt. Vetera valde tenuia, & candida vehementius vriam ciunt, & dolores capitis mouent, nervosq; largius pota tentāt. In media ætate, vt à septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autē pro ætate, & tēpore anni, & consuetudine, & qualitate vini definiatur. Nō sitire, & modicē cibos prolui, optimum est præceptum. Nocet ebrietas omnis, & maximē assidua, siquidem obsessos nervos quotidie remittit: largiorq; potus acutorum morborum adfert initia. Mediocris tamen vinolētia aliquot diebus, maximē post aquæ potus, vtilis: namq; modo quodam ex alto euocat sensilesq; expurgat excretus, & per caca corporis ducit spiracula. Sed aquam post vinolentiam bibere oportet: siquidem valetudinis alicuius gratia facta temulentia remedium adfert frigida.

Vinum omphacites. CAP. VIII.

Omphacites nomine, peculiariter fit in Leibo, siccata sole acri vna, paulò ante maturi

D S tatē

tatem decerpta, triduo aut quatrinduo, donec tace-
 cemi in rugas contrahantur: expressumq; vinū
 cadis insolatur. Vim astringendi habet, prodest
 dissolutis stomacho, & ilei dolore laborantibus:
 item pręnantium malacia, & crudis. in pesti-
 lantia quoque sorptū auxiliari dicitur. Huius-
 modi vina nō nisi post multos ānos bibi possūt.

Lora. . . C A P. IX.

LOra, quam deuteriam, alij potimon appel-
 lāt, fieri solet adiectis metretis tribus aqua
 in viricea, quibus triginta vini metreta extra
 ēta fuerint: calcatis vinaceis expressoq; decocto
 ad tertias partes, & additis in singulos cōgios
 modi eius qui remāsit, binis salis sextarijs, post
 hyemē transfunditur in vasa. Lora intra annū
 vtendum: etenim celeriter exolefcit. Conuenit
 agris, quibus timemus noxā vini, coactis sape
 desiderijs eorum obtēperare: item a longa vale-
 tudine se recolligentibus. Fit & vinum, quod
 adynamō vocant, lora vires habens, hoc modo.
 Pares aquę, & musti mensura coguntur molli
 igne, donec absumatur aqua, quod vbi refrixe-
 rit, elutriatum picato vase reconditur. Alij ma-
 rina, et cęlestis aqua, mellis, & musti paros mi-
 scent portiones, decapulāt, & quadraginta die-
 bus insolant, quo ad annum vtuntur ad omnia
 eadem. Vinū ē labrusca. . . C A P. X.

Vinū ē syluestri vna nigrū, adstringit: pro-
 dest alui, et stomachi fluxionibus, et ceteris
 qui

quibus conſtrictione, & contractione opus eſt.

Vinum melitites. CAP. XI.

Melitites datur in longis febris, qua ſtomachum infirmarunt. nanque aluum leuiter emollit, vrinam ciet, ſtomachum expurgat. prodeſt articulario morbo, renum vitijs, imbecillo capiti, & mulieribus abſtemijs: odoratum ſiquidem eſt, & corpus alit. Diſtat à mulſo, quod ſit è vino vetere, aſtero, & melle exiguo. Melitites autè adiecto ad quinq; congios aſteri muſti mellis congio, et ſalis cyatho. Cortinis magnis quo magis ad efferueſcendum locus pateat, fieri oportet. ſenſim aſperſo ſale: cumq; efferuere deſierit, in alia vaſa transfunditur.

Mulſum. CAP. XII.

Mulſum è vetere vino, aſteroq; et bono melle factum, præfertur: minus enim inflat, acceleriter id genus in uſum venit. Vetus corpus alit. media ætate, aluo prodeſt, vrinam pellit, à ſummo cibo ſumptum, nocet: & inter initia potum, implet: dein appetendi auiditatem reuocat. Fit mulſum duabus vini metretis, admixta vna mellis. Aliqui, quò celerius præberi poſſit, mel cum vino coquunt, & ita transfundunt. Alij vtilitatis gratia, ad ſextarios ſex muſti feruentis vnum mellis adiungunt: et vbi fuerit, vaſe recundunt. dulce autem permanet.

Aqua mulſa. CAP. XIII.
Qua mulſa eaſdè, quas mulſum vires poſſidet

det. Cruda vtimur cūm moliri deiectionem, aut vomitionem incitare volumus: vt ijs, qui uenena hauserunt, ex oleo decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescentis pulsus, quos illi dixerē microsphycōs, tuſſientibus, peripneumocis, et ijs, qui immodico sudore digerūtur. Iā paratum, conditiuumq; , quod aliqui hydromeli propriē vocant media etate adynamo uiuo, aut lora in recreandis viribus respondet, & similem vim adipiscitur. quare inflammationibus aliquius membri plusquam lora prodest. Inueterati tamen vsus damnatur inflamatis, aut constrictis: sed laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, sudatorib; ue conuenit. Fit duabus pluuię aquę veteris ad vnā mellis partem additis, & in solatis. Alij fontanā aquam adiiciunt, & ad tertias partes decoquūt, & ita recondunt. Nec desunt qui hydromeli appellent, quod à melle elutis aqua fauis confici ac seruari soleat: sed meracius confieri conuenit. aliqui id coquunt. Aegrotantibus noxium est: quoniam plurimum ceraginis sibi vendicat.

Aqua.

CAP. XIII.

DA aquis in vniuersum decernere, propter locorum proprietates, & peculiare naturas, cælū, & alia pleraque, difficile est. Magna tamē ex parte optima est dulcis, syncera, nullius omnino qualitatis particeps, & quę ne minimo quidem tempore in pręcordijs commodatur. ad
has

hæc quæ & facili via fertur, & citra molestiam
nec inflationes creat, & minimè computrescit.

Aqua marina. CAP. XV.

Aqua maris calida est, & acris stomacho
aduersatur, aluum enim conturbat: pitui-
tâ expellit. Si verò calida ad fots adhibeatur,
elicit, & discutit: neruorum vitijs, & pernioni-
bus, ante vlcera prodest. Miscetur cataplasmati
ex hordeacea farina, & emplastris, & discutien-
tibus malagmati. Ad mouendas eiectiones tepe-
facta infunditur, & ad tormina, calida, pforas,
pruritus, impetigines, lēdes & mammas rigē-
tes, foueri vtile est: liuores fots discutit. ad veno-
natos ictus, qui tremorem, & refrigerationem
afferunt, salutaris intelligitur: maximè scorpio-
num, phalangiorum aspidumq;: etiam si quis in
calidam descendat, auxiliatur. & malo habitu
confectis iandiu corporibus, neruisq; balnea ex
ea vtilis, hydropicos, captis dolores, aurium gra-
uitates, feruentis vapor leuat. Syncera, & sine
potabilis aquæ mistione reposita, virus deponit.
Sunt qui etiam præcoquant, & ita recondant.
Datur ad purganda corpora per sese, aut expo-
sca, aut cum vino, aut melle: verum post de-
iectionem dant gallinæ, aut piscium iuscula, ad
domandam morsus acrimoniam.

Thalassomeli. CAP. XVI.

Quod thalassomeli vocatur, vehementer
purgare cōstat. Tēperatur aut æqui par-
tienti

tionibus maris, mellis, & imbris ex alto, defacatis, & picato vase per Canis estus insolatis. Alij ad binas marina cocta singulas mellis adijciunt, & vase condunt. huiusmodi moderatius est aqua marina & mitius.

Acetum. CAP. XVII.

Acetum refrigerat, & adstringit. Stomacho utile, appetentiam excitat: erumpentē undecunque sanguinem, potu in se sūve sistit. prodest alui fluxionibus coctū cū cibis, cruentis vulneribus inditur: inflammationes arcet, in succidis lanis, aut spongia impositum: reprimit proci dentia sedis: vulnāq;: item abscedentes gingivas & sanguine manantes. Ad nomas & ignem scarum, vlcera quæ serpunt, lepras, impetigines, pterygia, cū aliquo conuenienti efficax est: phagedanas vlcerum, nomasq;: fotu continuo cohibet: podagricis calido fotu, cum sulphure auxiliatur sugillationes rapit, cum melle illitum. Contra capitis ardores cum rosaceo in succidis velleribus, aut spongia imponitur. Ad aquā inter cutem, grauitatem aurium, & sonitus sibilosq;: feruentis vapor proficit: instillatum quoque aurium vermes necat. Panos coercet tepidi fotus, aut si imbuta aceto spongia admoueatur: pruritus permulcet. Contra venenatos serpentium ictus, qui refrigerando nocent, calidum commode soletur: & frigidum ijs, quæ exurens virus ei aculatur

eiaculantur. Calidum potum, atque vomitionibus redditum, & aduersus omnia venena efficax est, præsertim contra meconium, & haustâ cicutam, conglobatum in ventre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiam, taxumq; cum sale. haustu voratas hirudines, si sorbeatur, eijcit: tussim veterem mitigat, & recentem lacescit. In orthopnoea calidum commodè sorbetur: gutturis fluxiones gargarizatum inhibet: anginis, et vna procidenti conuenit. contra dentium dolorem calidum colluitur.

Acetum mulsu. CAP. XVIII.

ACetum mulsu, quod oxymel vocant: hoc modo temperatur. Aceti heminas quinq; salis marini pondo: mellis minas decem: aquæ sextarios quinque, pariter coquito, & decies effervescente cortina: atque ubi refixerit, dissundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischiadicis comitialibus, & articulorum morbo confistatis prodesse creditur. Cõtra morsum eius vipers, quam sepa vocant, haustum meconium, ixiamve auxilio est. Anginis vtiliter gargarizatur. Acida muria. CAP. XIX.

ACida muria, quam Græci oxalmen vocant, cotra nomas sotu, putrida vlcera canum morsus, & venenatos ictus auxiliatur. Sanguinis fluxiones post ecixos calculos sistit, si statim calida in vulnus inijciatur: et prociduum sedem reprimat. dysentericis, si nomas sentiant, infunditur.

tur, oportet autem ex lacte instillare. Hirudines sorbitione, aut gargarizatu necat. farsures & manantia capitis ulcera extergit.

Thymoxalme. CAP. XX.

Thymoxalme veteres utebantur, dabātq; laborantibus imbecillitate stomachi, ternos quaternosve cyathos, aqua callida dilutos: item in articularibus morbis, & inflammationibus. Crassos humores, atrósque trahit. Hoc modo fa-
ctitatur. Thymi triti acetabulum, salis idem modus, ruta, pulegi, polenta, singulorum exigua portiones in vas coniunguntur, aqua terni sextarii, & aceti terni cyathi infunduntur, & circumposito linteo sub dio madescunt.

Scillinum acetum. CAP. XXI.

Scillinum acetum hoc modo fit. Scilla, que candida fuerit, expurgata cōciditur, traiectaq; lino segmenta modicis intervallis, ne se cōtingāt, siccantur in umbra quadraginta diebus: mina eorum in aceti boni sextarios duodecim immergitur, & vase diligenter operto septēnis diebus: in sole madescit: post eum dierum numerum scilla eximitur, & expressa abijcitur: defacuum acetum transfunditur, & reponitur. Aliqui scilla minā quinque aceti sextarijs miscent. Alij citra exiccationem repurgantes, parem mēsuram adiungunt, & senis mensibus macerari patiuntur. Id multò magis humorum lentitias digerit. Gingivas humore praegnantibus collutient

stringit, firmatq; , & motos dentes stabilit, putredines oris, & graues halitus tollit. durat fauces sorbitione, & calosas facit: vocem expedit, & hympidam, canoramq; reddit. Datur stomachicis aegrè cibum concoquentibus, melancolicis, comitialibus, vertiginosis, mente captis: item vuluarum strangulationibus, lienis in cremento laborantibus, ischiadicisq;. Imbecillos admodum recreat, corpus sanum reddit, & bonum colorem præstat: oculorum aciem exacuit: tarditatem quoque aurium, infusione purgat. In summa ad omnia efficax. Cauendum tamen intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut nervorum vitijs. Datur quotidie ieiunis sorbendum inter initia exiguum, paulatim adaugendo, ad cyathum vsque. Nonnulli binos dant cyathos, aut largius.

Scillinum vinum. CAP. XXII.

Scillinum vinum fit hoc modo. Dissectam, vti dictum est, scillam, & sole siccata cõtundito, minam eius tenui cribro incernito, & linteo raro illigata in Alcenos sextarios musti recentis, ac boni demergito. vbi trimestri spatio maduerit, elutriatum vinum, obstructo diligenter vase, recondito. Licet quoque sic humida scilla vti. In orbicylos, rapi modo, dissectam duplicato pondere, quadraginta diebus insolari oportet, & valde inueterascere. Alia parandi ratio. Scilla dissecta, & repurgata tres minas in Italicam metre

E tam

tā musti demittito, & senos menses in vase ob-
structo macerati finito. post id tēpus defecatum
& excolatū vinū recundito. Vtile est contra cru-
ditates, & ciborum corruptiones: item ijs. qui re-
nomunt cibū, & si pituita in xentre, aut stoma-
cho coherit. Prodest lienosis, malè, habitis corpori-
bus, aqua inter cutē, regio morbo, difficili vrina
torminosis, inflationibus, resolutioni nervorum
horroribus longis, vertiginosis, et vulsis, mense,
pellit: minimè nervos infestat. Hoc vinum vetu-
state fit melius. Cauendus in febre vsus, aut si in
teranea vlcus sentiāt.

Vina marina. CAP. XXIII.

VIna ex marina aqua, variè faciliuntur.
Aliqui enim statim cūm decerptæ sunt v-
ne, aquā maris admiscēt. Alij in area vuas so-
le siccāt, quib⁹ calcatis marinā adijciūt. Alij pas-
sas prius vuas in dolijs marina aqua macerāt,
mox calcatas exprimūt. id magis passi generi-
bus adscribitur. Qua tamē austeriore gustu tē-
perantur. cōtra febrīū aduentantiū indicia va-
lēt, si modo meliora non adsint: atq; subducunt;
profunt purulenta extusissentibus, & si dura
alvus exerceat. Qua ex Aminis vuis fiunt, ca-
put tentāt, stomacho aduersantur, flatus creāt.
Verūm quò plenior habeatur historia, ijs qui
huius studio tenētur, nō inutile existimamus va-
nias vinorū cōpositiones adferre, nō quòd frequē-
ter, aut necessariis exitat. vsus, sed nequid o-

mississe videamur, quod ad eorum rationē attinet. Sunt autē quadā ex ijs scilicet, minoris cura ac impediū, quae cadunt in vsus: vti q̄ ex cotoneis malis, pyris, siliquis, itē myrti baccis cōponuntur.

Vinum cydonites. CAP. XXIII.

CYdonites, nomine alio melites appellatur, & ita fieri consuevit. Mala cotonea exemptis seminibus, frustatim rapi modo scinduntur. & duodecim minarū pōdo, in musti metretam, triginta diebus macerantur: postea defecatū vinum reponitur. Alia faciendi ratio. Oportet ad singulos mellis sextarios denos succi cotoneorū tororum pressorumq; adijcere, & ita recondere. Vinū hoc adstringit: praeest stomacho, dysenteriae, hepaticis, renū vitijs, et vrinae difficultatis. Melomeli, quod et cydonomeli nomināt, sic fit. Cotonea mala seminibus suis castrata, in quam plurimū mellis, quo penitus demersa cōtegātur: cōijciuntur: id post annū mitescit, mulso nō dissimile. Praestat eadem, quae superior compositio.

Hydromelum. CAP. XXV.

FIt hydromelon duabus mensuris aquae coctae, & sub Canicula syduis insolata, additis ad vnam melomelitis facili ex cotoneis. Vis huius eadem est.

Omphacomeli. CAP. XXVI.

Omphacomelitis faciēdi ratio haec est. Acerbae vuae adhuc immaturae, & tribus diebus

bus insolata exprimuntur, & ad ternas succi partes, melis optimi despumati singula partes, adijciuntur: & insolatur in vasa transfusum. Vinum reprimendi, ac refrigerandi habet. stomachicū, celiacisq; conuenit. Vsus post annum est.

Vinum ex pyris. CAP. XXVII.

FIt & è pyris, perinde atque cotoneis, vinum *Fapytes* nomine, sed ita vt pyra non magnopere maturescant. Ex siliquis etiam, mespilis, sorbis, simili modo temperatur. Omnia hæc genera acerba sunt, & adstringunt. stomacho vtilia sunt atque intestinas fluxiones cohibent.

Vinum cœnanthium. CAP. XXVIII.

FIt è feraci vite syluestri, quod vocatur *cœnāthinum*. Sicci flores minis duabus musti cado macerati, post triginta dies mutantur, mox colatum vinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastigia, & cœliacos, & dysentericos.

Vinum ex punicis. CAP. XXIX.

FIt è punicis malis maturis, quod *rhæten* nominant, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus abest, *apyrena* vocant, ac decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluuio exortam stomacho vtile, adstringit aluū, & vrinam mouet.

Rosaceum vinum. CAP. XXX.

Hodites sic fit. Rosarum siccarum, et sarū

q̄ minam linteolo deligatam in sextarios octo musti demergito: & post tres menses defecatum vinum transfundens recondito. Vtile ijs, qui feбри carent, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibo potum: & contra humiditas aluos, & dysenterias. Fit quoque ex succo rosarum addito melle, quod rhodomeli vocant: quod alteria scabritijs conuenit.

Myrtites vinum. CAP. XXXI.

MYrtites fit, baccis nigris, quæ maturitatē excefferint, tussis, & organo expressis. Aliqui ad tertias coquunt. Alij baccas prius sole torrent, & quaternis sextarijs contusarum, ternas aquæ heminas adiiciunt, & vini veteris parem modum: postea exprimunt, & seruant. Magnopere adstringit. stomacho vtile: fluxionibus ventris, ac stomachi prodest, & cōtra intestinas vlcerationes, & profluua. denigrat capillos.

Myrsinites vinum. CAP. XXXII.

MYrsinites sic temperatur. Rami nigra myrti cum suis baccis, & folijs tussi, decem minarum pondo, in tribus musti congijs feruescunt, donec duo supersint, aut certè dimidium: id vinum colatum ad vsus reconditur. Contra fursures, vlcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas, & purulentas aures efficax est: sudores sistit.

Lenticinum, & terebinthinum vinum.

CAP. XXXIII.

E 3 Lenti

LEntiscinū similiter vt myrsinitestēperatur.
 Nec secus terebinthinū; nanq; bacciferi eorū
 rami sumi debent. Similes insunt vires. adstrin-
 gūt, stomacho accommodantur, & defluxionibus
 intestinorū, vesicæ, & stomachi, et sanguinis pro-
 fluito. Vlcera omnia fluxionibus obnoxia, sicut
 ad cicatricē perducunt: fluxiones vuluæ, ac sedis
 in se sione cohibēt.

Palmeum vinum. CAP. XXXIII.

PAlmulas maturas, quas vocāt chydeas in
 vrcealū imo pertusū, et obstructū picata arū-
 dine, demittito: lino foramiē sit obturatū, et qua
 dragenis sextarijs ternos aquæ cōgios insūdito.
 quod si ipsū ita dulce esse nō libeat, quinq; cōgios
 insudisse satis est. post decē dies detractō ab arū-
 dine linteo assumito vinū crassū, & dulce, et re-
 ponito. Suae illud quidē, sed capiti noxiū. cōtra
 fluxiōes propter adstrictoriā vim efficax: stoma-
 chici, cæliaci, sanguinē expuētibus cōuenit. Ali-
 qui idē addita aqua iterū capiūt, et tertio, quar-
 to, quinto, sexto ve faciunt, quod tādē acore
 vitiat.

Vinum ex caricis factum.

CAP. XXXV.

CAtorchites, aliquibus sycites vocatur, in Cy-
 pro fit, ita vt palmeum: sed hoc interest, quo-
 niam pro aqua tantundē humoris adiiciunt, in
 quo recenter pressa vinacea maduerint. Caricae,
 quæ chelidonia, aut pœonicea appellantur,
 præse

Præsertim nigra macerantur, vti diximus: & post decem dies humore excipitur, atque iterum, aut tertio, idē modus aquæ, in qua vinacea maderint, infunditur. simili modo intercedēte spatio, quarto, aut quinto assumitur. Demaceratorum liquor non secus acorem cōtrahit, & aceti usum præbet. Id tenue est: flatus gignit, stomacho aduersatur, fastidium parit, aluo tamē prodest, urinam ciet, mēses trahit, lactis vbertatem facit, vitiosum sanguinem creat, & elephantia sin adfert, vt potio, quam xython appellamus. Aliqui sex amphoris, decem salis sextarios adiungunt. Alij murie amphorā. quod non facile vitiat, & aluo idoneum fore censent. Alij thymum, & fœniculum imo subiungunt, & caricæ superponunt: & ita vicissim, donec vas expleuerint. Fit & è sycomoris eodem modo vinū, sed in acetum acre degenerat: quoniam non ita praualet vis eorum, vt fluētis liquoris dulcedinem retinere possit.

Resinatum vinum. CAP. XXXVI.

Resinatum vinū populatim facilitari solet. copiosum in Galatia: quoniam vinū illic coacescat, vna non maturescere, ob cœli algorem, nisi picea resina temperetur. Resina autem cum cortice triditur, & amphoræ dimidiata hemina permiscetur. Aliqui vbi efferbuit, excolant, separantes resinam: alij relinquunt. Hac vina vetustate dulcescunt. Omnia capitis dolorem, & ver-

tigines faciunt: coctionem tamen adiuvant, & urinā cient: ruffientibus, ac destillatione vexatis conueniunt: item cæliaci, dysenterici, & hydropici, & scæminis fluxione vuluæ laborantibus: altis exulcerationibus infunditur. In hoc autem genere nigricans magis albo constringit.

Vinum strobilites. CAP. XXXVII.

Strobilites fit maceratus in musto nucibus pineis, recetibus fractisq; præbetq; resinati effectus. Si quis madesactas nuces pini musto decoquat, potū affatim conuenit ijs, qui tabitudine consueverunt.

Cedrinum, & ex aliquot arboribus, ac fructibus vinum. CAP. XXXVIII.

Cedrinum, iuniperinum, cupressinum, laurinum, pineum, aut abiegnum, simili ratione fiunt. Diuisos recenter ramos, cum fructū edunt, aut soli, aut balneo, aut igni admoerere oportet, uti consudent, congioq; vini minam vnā permiscere, & post duos menses transfundere, & antequā recondantur, insolare. Factitiorū vinorum vasa impleri debent: nanque non plenis vasis, vina in acorem corrumpuntur. Medicata autem vina rectè valētibus insalubria. Omnia excalfaciunt, urinā cient, & substringunt. Laurinum tamen vehementius excalfacit. Fit quoq; è fructu cedri maioris vinum, congio musti, adiecta tusarum baccarū selibra. diebus quadraginta insolari debet, & defactū in vasa transfer

ferri. Fit etiam vinum è baccis iuniperi, non aliter quàm cedrites, & ad eadē valēs. Cedrites hoc modo fit. Cedriam dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluunt, & ita musto replent. Hoc genus vini excalfacit, extenuat: tussī antiquæ vtile sine febre, pectoris laterisq; doloribus, torminibus, ventris, & interaneorū vlceribus, purulētis excreationibus, mulieribus vuluæ causarijs, hydropicisq;: facit aduersus ventris tineas, & horrores. Contra venenatos ictus auxiliatur: serpentes necat: aurium doloribus instillatum medetur.

Picatum vinum. CAP. XXXIX.

Picatum ex liquida pice, & musto temperatur. Picem autem primū marina, aut muria tantisper eluere oportet, dum inalbuerit, & syncera maris aqua defluat: mox aqua dulci proluenda: cōgrys octo musti vncia picis vna, aut altera adijcitur: vbi efferbuerit, & cōstiterit, in vasa diffunditur. Hoc genus vini excalfacit, concoquit, purgat, abstergit: vtile doloribus pectoris, alui, iecinoris, lienis, & vuluæ, si sine febre sint, veteri rheumatismo, exulceratiōibus in altum recedentibus, tussī, suspirijs, concoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, præsertim in succida lana impositum.

Vinum absinthites. CAP. XL.

Absinthita faciundi ratio euariat. Aliqui enim duodequingenta sextarijs Itali-

E § carum

carum amphorarum, admistam absinthij pontici libram decoquunt ad tertias: & ubi infunderint sex aceti sextarios, & absinthij selibra ac diligenter permiscuerint, diffundunt in vas dumq; conqueuerit, defacat. Alij absinthij minam in amphoram demittunt, tusamq; & raro linteo deligatam, in cado musti macerant binis mensibus. Alij absinthij quadrantem, alij trientem, & nardi Syriacæ, cinnamomi, cassia, floris iunci odorati, calami, elatæ, palmaram singulos sextantes inijciunt in metretam musti, & tundentes prius pila, obstructo vasis spiraculo, binis ternuue mensibus dimitunt: postea defecatum vinum transfundunt ad vsus. Alij addunt in musticadum. Celticæ nardi drachmas quatuordecim, et absinthij drachmas quadraginta, linteo inuolutas: & post quadragesimum diem elutiant. Alij in senos sextarios musti, absinthij libram, & sicæ pini resina sextantem immittunt: & post decem dies excolat, & recondunt. Vtile est stomacho, vrinam ciet, tardam coucoctionem accelerat: hepaticis, regio morbo, & renum vitijs auxiliatur: fastidia discutit. ijs prodest, quibus stomachus negotium exhibet: valet contra longam præcordiorum distentionem, & inflationes, teretesq; ventris tinea, & remoratos menses, contra hausta ixiæ venena quam plurimum potum, & vomitionibus redditum, auxiliatur.

Vinum

Vinum hyssopites. CAP. XLI.

HYssopites è Cicilio hyssopo maxime laudatur. Fitq; similiter, foliorum hyssopi tusorum libra in amphoram musti coniecta: linteolo raro cum quibusdam lapillis folia inuoluuntur, vt degrauiatus pondusculo fasciculus sidat: vinum post quadraginta dies defacatum elutriatur. Cōtra pectoris, latreū, & pulmonis vitia, veterem tussim, & suspiria prodest: urinā cit: torminibus. & horroribus febrium circuitu repetentibus auxiliatur. menses mouet.

Vina ex diuersis plantis facta.

CAP. XLII.

Simili modo chamadrites fieri solet. Excalsa scit, discutit: cōuulsis, regio morbo, vluu inflationibus, tarda concoctioni, incipienti aquæ inter cutem subuenit. Inueterascens medius redditur. Stœchadites non secus temperatur. Congy sex stœchadis minam addere oportet. Crassitiem, inflationes, laterum nervorumq; cruciatus, & perfrictiones discutit. comitialibus commodè datur cum pyrethro, & sagapeno. Fit ad eadem acetum è stachade herba, vt paulò antè diximus, aceto macerata, quod eosdem implet effectus. Fit vinum è betonica, quam cestron psychotrophon appellant. Herbā semine maturo prægnantem, cum suis ramulis minæ pondo, congys duobus vini macerant, & post septimum mensem transfundunt. Ad multa interaneorum vi-

tia, vt frutex ipse, pollet. Et vt in vniuersum di-
 catur, factitia vina sibi misturarum vires adsci-
 scūt. quare nō difficile fuerit ijs, qui illarū natu-
 ram norint, vinorū vires coniectura quadā con-
 sequi: veruntamen vinorum vsus febricantibus
 abdicandus. Fit etiānum ē betonica acetum
 ad eadē vitia vtile. Tragoriganites fit quater-
 nis tragorigani drachmis linteolo colligatis, in
 quaternos musti sextarios cōiectis, & post ter-
 tiū mensem transfusis. Prodest torminibus, vul-
 sis, ruptis, laterū doloribus, spiritūū discursatio-
 ni, agris concoctionibus. E napii fit vinum, no-
 mine bunites, drachmis duabus tusi napi in sex-
 tarios duos musti additis, & ceteris eodem mo-
 do factis. Prodest stomachicis, & dimicatione, aut
 longo equitatu fatigatis. Dictami drachmas
 quatuor macerato quaternis musti sextarijs.
 Facit aduersus stomachi fastidia: mēses, & pur-
 gamentū à partu subducit. Marrubij adulti fo-
 lia tundito, & sextarios octo in musti metretā
 demittito, et reliqua cōsimiliter facito. Cōuenit
 hoc vinum pectoris vitijs, & omnibus, quibus
 marrubium, Thymi tusi, & cribrati vncias cen-
 tum linteolo colligatas, in amphorā musti adij-
 cito. Valet contra aegras coctiones, fastidia, dy-
 senteriam, neruorum & precordiorum dolores,
 hybernos algores, & venenata animalia, quorū
 morsus frigus insequitur, aut putrescit³ locus.
 Simili modo ē satureia vinum fit. quod eadem,

quæ thymites præstat. Sic quoque origanites ex Heracleotico origano cōficitur similiter cū supra dicto. Facit eadem, quæ thymites. E calamintha, pulegio, & abrotono vina fiūt eodem, quo thymites modo. Prosunt stomachicis, cibum fastidientibus, & regio morbo: quòd vrinam moueant. Fit item è conyza vinum contra venenata ante alia efficax.

Vinum aromatites. CAP. XLIII.

Aromatites ita fit. Palma, aspalathi, calami, nardi Gallici, singulorū quatuor sextarios sumito: postquàm cōtriuieris, passò subigito, coactis ingentibus offis, & in sextarios duodecim austeri musti deiectis, operculato vase, quæ draginta diebus quiescere finito: deinde vbi fæce expurgatum fuerit, recōdito. Alia eius ratio. Calami vncia, plu drachmæ septem, costi drachmæ duæ, nardi Syriaci drachmæ sex, cassiæ vncia, croci drachmæ quatuor, amomi drachmæ quinque, asari drachmæ quatuor. Omnia simul trita, & linteo colligata in cadū musti, demerguntur: & postquàm vinū deferbuerit, transfunditur. Facit ad pectoris, & laterū, & pulmonis dolores, difficili vrina, horroribus, retardatis mensibus, atque ijs qui per frigora iter faciunt: potum conuenit. pituitæ crassitiem extenuat, colorem alit, somnum conciliat, dolorem finit, renum, & vesicæ vitij auxiliatur.

Vin

Vina ex diuersis odoramentis facta.

CAP. XLIII.

Fit & vinū ad destillationes, cruditates, tussim, inflationes, & si humor in stomacho coit. Myrrhæ duæ drachmæ, piperis candidi drachma vna, iridis drachmæ sex, anisi drachma tres. omnia plenius tusa, & linteolo inuoluta, in sex vini sextarios coniunguntur: vinum post triduum colatur, & in lagenâ reconditur. Datur post deambulationem meraculū, cyathi vnius mēsurâ. Fit quoque nectarites ex helenio herba, radice sicca pondo quinque drachmarum linteolo colligata, & in congios sex musti addita, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi, & pectoris vitia: urinam pellit. E Syriacâ nardo, & Celticâ, malabathroq; vinum factitatur, hac ratione. Singulorum seictrā in binos musti congios mitto, post menses duos colato. Datur cyathus vnius cum tribus aquæ. Hoc vinum efficax est cōtra vitia renum, hepaticos, regiū morbum, & vrinæ difficultatē. prodest stomachi, atque ijs quos pallor decolorat. Alij vnciam, aut sextantem acori, & Celticæ nardi quadrantem in musti amphoram adiungunt. Asari quadrantem in senos musti sextarios itidem demittito. Id vini genus urinā ciet: hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis, ischiadicisque conuenit. Radicis syluestris nardi recentis, & tritæ, cribratæque besseni in congiūm musti coniuncto: duos menses

menes quiescere finito. Vtile est hepaticis, difficili vrinae, inflationibus, stomachicis.

Vina ex diuersis herbis facta.

CAP. XLV.

Radicis dauci contusa drachmas sex in musti amphorā imposito, & similiter transfundito. Facit ad dolores thoracis, praecordiorū, & vuluae: menses pellit, ruetus ciet, et vrinā prodest tussi, ruptis, vulsisq; Saluiae vnciā in musti amphorā, quod idē cū ceramio est, mittito. Valet cōtra renū, vesicae, & laterū dolores, reiectiones sanguinis, tussim, rupta, vulsa, & suppressos mēses. Paeuacis vnciā in musti congiū mittito, & trāsfundito. Prodest ruptis, vulsis, cōtussis, orthopnoeae: lienis crassit iē extenuat: cōtra tormina, coxendicū dolores efficax est: tardas concoctiones accelerat: menses, & partus extrahit: aqua inter cutē, & serpentīū icibus auxiliatur. Vina ex acoro, et dulci radice cōsimili modo fiūt. Oportet enim singulorū vncias octo in senos cōgios mittere, tribus mensibus macerare, mox in vas transferre. Faciunt ad pectus, & latera, & vrinā mouēt. Seminis apij recētis, maturi, et cribrati vnciā nouē in limbo colligata in musti amphorā demittatur. Appetitū excitat: stomachicis, & difficili vrinae auxiliatur: faciles spiritus facit. Ex fœniculo, anetho, & petroselino, vina eodē modo fiūt, et ad eadē efficacia. Fit et è flore salis vinū, multò ad purgandū efficacius, quàm

vinum aqua marina temperatum. Fauces, vesicam, renes, & stomachum infestat: quare neque in secunda, neque aduersa valetudine prodest. Fit etiam vinum, quod phthorion vocant, quoniam partus necat, & abortus facit, veratro, aut scammonia, aut syluestri cucumere, iuxta radices vitium sato: siquidem vites sibi illorum vires adsciunt. Id vinum partus enecat: datur ieiunis mulieribus, quae antequam vomuerunt, cyathorum octo mensura, dilutum. Ramorum thymelaeae cum suis folijs, & fructu triginta drachmas mittito in congios tres musti, & leui igne coquito, donec congiij duo supersint, defecatumque recodito. Aquosa purgat excrementa, & lienem absorbit. Chamelaea dum floret, cum folijs tusa, & cribrata decem drachmarum pondere, in musti congium additur: post duos menses vinum in vas transfertur. Aquae inter cutem, hepaticis, & lassitudine confractis, efficax est: item mulieribus, quae a partu aegre purgantur Chamapityinum simili modo fit, ad eadem conueniens: urinam quoque ciet. Librum radices mandragorae concidito, segmenta lino traiecit, quod selibram aequat, in musti cadum demittito, ibique esse finito ad menses tres, deinde transfundito. Media potio, heminae dimidium: bibitur, passo in duplum addito. Aiunt heminam vini congiio mistam, potu soporem adferre. cyathus unus cum sextario vini potus, enecat. Mediocris usus eius doloris sensum auferre

aufert: fluxiones increffat. olfactu, potuq; , &
 cum inditur, idem præstat. In congium musti a-
 qua marina diluti. drachmas duodecim nigri ve-
 ratri triti in linteo mundo mittito: dumq; effer-
 buerit, in marina aqua congios quatuordecim,
 vbi pleniusculè fregeris, inijcito: post aliquot dies
 colato, & vtitor. Dato cyathum vnũ ex aqua
 balnei, in potu ad aluum soluendam, ijs. qui e-
 uomuerunt à coena. Alia ratio. Veratri drach-
 mas viginti, iunci odorati. vncias. duodecim, spi-
 ce Syriaca vncias tredecim. cribratas, & linteo
 colligatas, in septem vini. Coi sextarios, diebus
 quadraginta macerandas indito, postmodum co-
 lato, dabis in potu sesquiheminam. Aliter: Deco-
 ãe marinae aqua ex alto petita sextarios duo-
 decim, veratri. cãdidi libras sex, in musti ampho-
 ra quadagesimo die quã. madefeceris, colato, &
 vtitor. Alia ratio: Veratri drachmas duodenas,
 et aphronitri quaternas in senis musti sextarijs
 diebus quiniſdenis macerato, mox colato: & se-
 mestri exacto, vtitor. Id vini genus abortus fa-
 cit, & partus necat. Aut. vuas in sole siccatas im-
 ponito in musti metretam (implet. autẽ metreta:
 congios duodecim) & gypsum in vinum: mittito
 pondo drachmarum viginti. & biduo residere si-
 nito: conijcito. veratri nigri drachmas triginta,
 iunci odorati, calami, singulorum drachmas tri-
 ginta, baccarũ iuniperi sextarios duos & trien-
 tem, myrra, & croci singulorũ drachmã: inuol-

uens linteolo diebus quadraginta appēdito, pō-
stea collato dabis heminas tres, aut duas dilutas.
purgat à partu, & obortu scēminas: fœtus ex-
trahit: contra strangulatus vuluæ efficax. Scā-
monites sic fit. Radicis scāmonia per messes effo-
sa, trita, & linteo. colligata drachmas quinque
in musti congiū mittito ad dies triginta. Aluū
purgat: bilem, & pituitam extrahit.

De metallicis Lapidibus.

Cadmia. CAP. XLVI.

EX cadmia generibus optima est Cypria,
bothryitis nomine, densa, modicè grauis, &
in leuitatē magis declinās, racemosa facie, colore
spodij, quæ fracta cinerulenta est, et ceruginosa.
Proxima habetur foris carulea, intus condidior,
internatis venarū discursibus, onychita lapidi si-
milis, cuiusmodi sunt q̄ è veteribus metalis effo-
diuntur. Quadā etiā placodes, id est, crustosa di-
citur, segmentis quibusdā perinde quasi xonis
cincta, ob quod en'xonitin appellauere. Alia
ostracitis nominatur, gracilis, & magna ex par-
te nigra. Sed quæ testaceam faciē habet, terram
amplexa est. Improbatur candida. Oculorū me-
dicamentis bothryitis nomine, & onychitis, vti-
les: reliquæ ad emplastra, & farinas, quæ cicatri-
cibus inducendis insparguntur. Ad eadē Cypria
prodest. Ex Macedonia verò, Thracia, et Hispa-
nia delatæ improbantur. Cadmia effectus ad-
strin

Fringere, caua ex plere, sordes expurgare, exicca
 re, corporis meatus in sarcire, ex crescentia in car
 ne coercere, crustas creare, & vlcera, q̃ cacoethe
 vocatur, ad cicatricē pducere. Gignitur cadmia
 ex are in fornacibus cā dente, fuligine egesta fla
 tu, & lateribus, camerisq; fornacū in herente.
 Prægrandes autē, ac ferreae sunt rudes, ab offici
 ni appellatae acestides, per summa fastigia con
 nexae, & cōcameratae, vt quae ab are iactantur
 sursum corpuscula, cohereant, & inibi detinean
 tur: q̃ cū spissius incidēt, in corp⁹ cōcrescūt, et mō
 gen⁹ vnū eius, mō duo, mō omnia p̃ficiūt. Extra
 hitur et cadmia in Cypro è mōte, qui Solis incū
 bit. cremato lapide, cui pyritae cognomē est ī quo
 etiā mōte q̃dā quasi venae chalcitis, misyos, so
 reos, melāteria, cœrulee, chrysocollae, attramenti
 sutorū, diphrygisq; inueniūtur. Nec desunt, qui
 cadmia in lapidū fodinis inueniri tradant, falsi
 quadā lapidū cognatiōe: qualis inuenitur, & a
 pud Cumas lapis, nullā sui vim ostēdēs. Ij eo de
 prehēdūtur, q̃ sunt cadmia leuiore, nullūq; a
 lienū mādētibus sapore exhibēt: cōmāducatus
 itē lapis dētes offendit: cadmia, vtpote cū cedat,
 eū nō respuit. Alio autē discerni possūt argumē
 to. Cadmia in farinā detrita, & aceto subacta,
 atq; in sole siccata, coit: q̃ in lapide nō accidit. Itē
 trit⁹, et igni appositus lapis p̃silit, et sumū igni si
 milē ei aculatur: cadmia verò quieta manes, fuli
 ginēq; luteo colore, aut areo splendentē expuit,

vario & onarū discursu. In sup lapidis ignē expt⁹, atq; refrigeratus colorē mutabit, ac leuior multo fiet: sed cadmia nihil euariat, nisi quis eam multis diebus cremauerit. Fit et in argēti fornacibus cādidior, ac minus pōderosa, se viribus nequaquā comparāda araria. Vritur cadmia: superior carbonibus obruta, donec trās lucida spectetur, et ferrei stercoris modo bullet: mox extinguitur vino Aminao, q̄ ad emplastra pparatur: sed quæ ad pforarum medicamēta pparatur, aceto. Alij hoc modo exustā cōterūt in vino, rursūq; fictili crudo terrēt, donec pumicosa videatur iterūq; tritā ex vino, tertio vrūt, donec pr̄sus in cinerē redigatur, nihil scabritiæ retinens. hac spodio vice vtuntur. Lauatur autē in mortario trita, effusa subinde aqua, dū sordiū nihil emergat: dein coacta in pastillos reponitur.

Pompholyx. CAP. XLVI.

Pompholyx specie sola, nō genere à spodio distat. Si quidē spodos nigricat, & plerūq; pōderosior est, palarū pilorumq; plena, quasi purgamētum quoddā, qđ ab arariarum officinarū pavimentis, & fornacibus euerritur. Pōpholyx verò pinguis est. & cādica, vsque adeo levis, vt in auras euolare possit. Cuius duo floxerunt genera. vñ ad aeris colorē vergens, subpingue: alterū magnopere cādidum, summāq; lenitatē natum. Candida sit pōpholyx, quoties in perficiēdo are, fabri pstantiorē facere volētes, detritam
cadmi

cadmiā cumulatius insperferint. nanq; tenuissi-
ma fauilla, q̄ effertur, in pōpholygē coit. Caterū
pōpholyx nō ex aris modo materia, & fabrili
industria factitatur, sed ex cadmia quoq; ad
gignendā ipsam eximie follibus proflata. Cuius
faciunda ratio hac est. In domo gemina cōtigna-
tione opta, fornax extruitur, iuxta quā medio-
cris fenestra, ad tabulatū à sup̄nis partibus pa-
tea. domicilij paries fornaci p̄ximus, tenui fora-
mine ad fornacē vsq; p̄foretur, ad extirpiendā sol-
lis narē: ostiū mediocre habeat, pro exitu ingres-
suq; artificis fabricatū. domuncula altera huic
cōiuncta sit, in qua & folles, et flator suo mune-
re fungatur. deinde carbonibus in camino succē-
sis, assidēs artifex cadmiā particulatim fractā
inspargit, à locis supra infurnibulū extructis. idē
negotium obit infēnē artificis minister, simulq;
carhones adūcit, vsq; dū indita cadmiæ copia p̄-
sus absumatur. Itaq; egesta suffitu tenuis pars,
& levis materiæ in summā domū euolat, et pa-
rietibus, testis, fornacisq; adhærescit, cōflatū autē
inde corpus, inter initia erūpētibus aquarū bul-
lis simile p̄dit, postea maius incremētū capeffens,
glomusculis vellerū simile redditur. Ponderosus
autem imima loca se recipit, sed hoc fornacibus
offunditur, illud domus pauimēto coheret, qđ te-
nuiore deterius existimādū est, ideo qđ multum
terra collegerit, & spursitia in aceruatiōe re-
ferciatur. Sunt qui hoc modo tantū fieri spodi-

um arbitratur, de qua antè dictū est. Optima creditur Cypria, q̄ accepto aceto halitū aris praestat, colore aliquatū piceo, sapore cœni horrido: et si fraudē nō experta, flagāti carbone inferuescit, aereū colorē cōtrahit. Antedictis autē notū diligēter attēdendū est. Siquidē à nōnulli adulteratur taurino glutine, onillo pulmone, aut marino, aut crematis grossis, et quibusdā cōsimilibus, qđ facile cognitu fuerit: quippe nihil in ijs pbandis inuenietur eorū, q̄ antè dicta sunt. Pompholygē in cōmune ita lauari oportet. Ligatam linteo mūdo, modiceq; raro, aut siccā, aut aqua respersam in labellū demittito, qđ imbrē contineat, & huc atq; illuc fasciculū deferens, immergito: ita enim limosa pars eius, ac vtilis effluet, et omne sedimentū in linteulo remanebit, postea residere sinēs aquā cū cinere colis incernito, & novam infundēs, agitato, & effūdito: mutata tāti sper aqua, & colata, dū arenosi nihil sidat: demum aquam exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij quantū maximè fieri potest siccāt, manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imitetur: deinde linteo faucibus excepturi vasis obtento, aut laxius illigato, colāt, & quò facilius transeat, infusa per linteū largiore aqua, cinerem cōturbāt: mox spumosum, quod traiectum est, & supernatat vasi, concha excipiunt, & fīclili nouo ad vsus recundunt. Quod verò resedit sensim cribratū in aliud vas

trans fundunt, relicto arenoso; quod pessum ieratur: rursus lapidosa sidere patiuntur, & in vas aliud excolār: hoc identidē faciūt, donec cinis metus, et arena expers inueniatur. Alij paubatim integrā in aqua respergūt, arbitrati arenas, lapillosq; suo pōdusculo degrauiatos, pessum ire: pīls autē, et paleas leuitate sua in sublime attolli. Ceterū cinerē mediū separāt, et in pilam cōiectū, vt cadmiam, eluunt. Quinetiam lauatur vino Chio marina aqua diluto, modis quos suprā diximus: & ita redditur adstringentior, quā aquis elota. Vis pōpholygis adstringere, refrigerare, explere, purgare, obstruere, et aliquantū exiccare. Inter medicamētā numeratur, q̄ leniter crustas obducunt. Quod si spodon torrerē libet, diligenter tritā, et irrigatā aqua, colliges in pastillos, fictiliq; nono, subiectis leuibus prunis, orbiculos cōtinuō versabis, dū assuati fuluescant. Neque ignorandū ex auro, argento, plumboq; fieri spodium: verū post Cyprium, plumbeū maximē commendatur. Quoniam spodos saepenumero desideratur, necesse est ostendere, quae simili virtute polleāt, vt in spodij locum sufficit possint, antispoda vocant, quoq; modo sumi debeant. Folia itaque myrti cum floribus, & immaturis, in fictile crudū coniecta, indito operculo cūtinua foramina habente, vruntur fornacibus, donec figlinum proquatur. iterū in fictile aliud crudū trāsferruntur, quod vbi perassatum fuerit, exempta

lauantur ad vsus. Idem quoque fit è termite syl-
uestris oliua, si habeatur: sin secus, satina cū suis
floribus, aut malis cotoneis dissectis, & detraclis
ossibus aut gallis, aut laxeratis linteolis: itē ex
moris immaturis, id est, candidis, in sole prius a-
refaclis, aut terrebintho, aut lētisco, ænanthe,
aut mollibus rubi folijs vel è buxi coma: vel è
pseudocypereo cū flore. Alij ficulneas frōdes in so-
le antea siccatas, eodē modo parāt: alij taurinū
gluten: alij succidas lanas asperas, pice aut melle
irrigatas. Quæ omnia in spody vicē vsurpātur.

Aes vstum. CAP. LXVII.

AEs vstum probatur rubrū, & qđ contritū
colore cinabarim] imitetur: nigrum verò
plusquā deceat, exustū est. Fit autē è clauis solu-
tarū nauū, fictili crudo cōpositis: subperso sul-
phure cū sale pari, omnibus vicißim insparsis, fi-
ctile, circumlito figulari creta spiramento, for-
nacibus inditur, donec figlinū pcoquatur. Qui-
dam pro sulphure, & sale alumē inspargunt.
Alij sine sulphure ac sale, fictili multos dies vrūt.
Alij sulphure solo vtuntur, fuliginē tamen ex-
cutiunt. Alij oblitos scßili alumine clauos cū sul-
phure et aceto, fictili crudo cremāt. Alij in anea
olla aceto respersos vrunt, & iterū ac tertio idē
efficiunt, postea recōdunt. Principē locum tenet,
in Memphide cōbustum: proximum] in Cypro.
Adstringit, exiccat, reprimat, extenuat, atra-
hit: vlcera purgat, & ad cicatricem perducit: vi-
tia

tiā oculorum emendat. excrementia in carne cōsumit, nomas cohibet: vomitus ciet cum hydro-melite potum, aut cum melle delinctum, illitum ve. Lauatur vt cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat. Aeris recrementum, stercus ve, quam scoriam vocant, eodem modo lauatur: & eandem vim, sed imbecillio rem, habet. Flos æris .CAP. XLVIII.

FLOS æris, quē nonnulli clauorū veterū psegma, quasi resegmentū aut segmentū, nominarūt optimus est friabilis, in attritu fuluescens, milij effigie, & numero, brevis, pōderosus, modicò splēdēs, atque cōstringēs, qui delimatā æris scobem nō recepit, qua sæpe adulteratur. Sed id facile deprehēditur, cūm detiū illisu dilatantur ramēta. Fit autē: cū æs fornacibus fūsum, in receptacula delabitur, per cola fistularū ad ea pertinetiū. tū huic negotio addicti ministri, sordes expurgātes, aquā clarissimā insudūt, refrigerādi proposito: itaque repētino cōcretū, ac addēsatione, velut expuitur: & erumpit antedictus flos. Adstringit, & excrementia coërcet: offusā oculis caliginē emendat, sed magnopere mordet. Quaternum obolorū pondere datus, crassū humorē extrahit. carnosā narium, & sedis vitia absūmit, eruptiones papularū cū vino cohibet. Candidius cōtra diuturnas auriū grauitates tritus, in eas per fistulam flatu impellitur: vna, tōsillasq; reprimi, farina eius cum melle admota.

Squama æris. CAP. XLIX.

Squama æris excussa ex Cypris officinarum
 clauis, crassa quidem ipsa præstantior, qua
 helitis, id est, clauaris nominatur, sed ex vili p-
 miscioq; ære, aut candido, vitiosa intelligitur:
 quàm, vt pote tenuem, & inuvalidam. damna-
 uus, maximè approbantes crassam, rufam, præ-
 fertim si aceti respersu æruginē cōtrahat. Vim
 habet adstrictoriā, extenuantē, reprimētē, &
 erodantē: nom. s. coerces, vlcera ad cicatricem
 perducit. pota ex aqua mulsa, aquā trahit. Ali-
 qui farina subactā, dant in catapotio. Additur
 ad oculorū medicamenta: genarum nāque sca-
 britiā absūmit, & fluxiones exiccat. Lauatur
 hoc modo, Sicca æris squama expurgata selibra,
 cum nitida aqua in mortario manu diligenter
 conturbatur, quousque pessum ierit: abycitur,
 quod subsidit, & effusa aqua, hemina cœlestis
 imbris adycitur. & distēta manu, squama, qua
 si destringenda sit, vehementer cōfricatur, dūq;
 lentorem emittere cœperit, aqua sensim ad sex
 heminas vsque superinsunditur, terēdo validè:
 squama ad latus mortarij colligitur, ibiq; ap-
 primitur. quo factō, expressus humor pyxide ex
 ære rubro facta, excipitur. Hoc est enim velut
 flos squamæ, valens viribus, & ad ocularia me-
 dicamēta cū primis efficax. Inutile, imbecillūq;
 quod superest, lauatur donec nullam prorsus
 lentitiam exernat: & linteo opertum biduo

conquiescere finitur, effusaq; axtante aqua, vbi
 ficcatum erit reconditur pyxidicula. Alij vt
 cadmiam lauant, & reponunt.

Squama stomomatis. CAP. L.

Squama ex acie, aut mucronibus decussa,
 Squam vocant stomoma, eadem vis. Lauatur
 modo simili, & reconditur: sed ad moliendam
 alui deiectionem inefficacior est.

Aerugo ratilis. CAP. LI.

Aerugo rosa fitijs modis. In cadum, aut a-
 liud cõsimile vas, acetũ quàm acerrimũ in-
 funditur: superponitur inde inuersum aneũ vas,
 præsertim concameratum: sin minus, planum:
 sitq; obstructũ, nullumq; habeat spiramentum:
 exempto, quo doliolum obturaueris, operculo,
 decimum post diem incidens ærugo detraditur.

Aut æris lamina in cadis super acetum ita su-
 spenditur, ne ipsum attingat, & totidem post
 dies raditur. Aut massula æris, aut luminavna
 pluresve vinaceis non recentibus, sed iam aceſcẽ
 tibus cõdũtur, & simili modo versantur. Quin
 etiam ex delimata æris scobe aruginem facere li-
 cet: necnon è laminis, quibus bractæ auri cõclu-
 sa malleo ducũtur, si quis eas aceto respargat, ex-
 ter aut quater verset, donec aruginẽ cõtrahãt.

Tradunt aruginẽ in Cyprijs metallis gigni, la-
 pidibus quibusdã nonnihil æris habetibus qui-
 bus ærugo efflorescit: addũtq; p Canicula astus
 è quodam specu manare: sed illam paucã, & o-
 ptimã

piam esse: hanc speluncis effluentem, copiosam quidem, & boni coloris, sed vitiosam, quod lapides multos collegerit. Pluribus autem modis adulterant, aliqui punice admisto, alij marmore, alij atramento sutorio. Sed deprehendemus pumicem, aut marmor, dum pollice sinistre manus madefacto, æruginis portiunculā altero atterimus: siquidem eam diffundi constat: marmoris autem, pumicisq; partes coeunt non dissipata, demumq; tractatione crebra, & humoris cōplexu dealbescunt. quin & dentium appressu: si quidem sincera cedit, & lauis, & sine asperitate. Atramētum verò sutorium igne coarguitur: nanque si fictile, aut lamina adulterata ærugine illinatur, & feruenti cinere, aut carbonibus incalescat alterutrum, mutabitur, rubescetq; id, quod atramentum sutorium acceperit: quòd id vstum suapte natura talem sortitur colorem.

Aerugo scolecia. CAP. LII.

AEruginis, quā vocant scoleciam, duo sunt genera. quædam fossillis est, altera factitia ad hunc modum. In mortario Cyprii æris dimidiam heminam aceti albi acrisq; pistillo cupreo conterito, donec strigmenti crassitudinem imitetur: deinde aluminis rotundi drachmam vnam cum salis fossitij translucentis, aut marini quàm albißimi, solidiq; , aut certè cum nitri pari pondere teritur in sole æstuosissimis diebus: sub sydus Canicula, donec colorem æruginis contrahat, &

concre

concretu strigmētōsum fiat: vbi autem se in vermiculorum Rhodiācis similitum speciem coegerit, recondito. Efficax, & valde boni coloris redditur, si duas partes vrinæ veteris, cum vna aceti adieceris, & alia quæ dicta sunt, peregeris. Sūt qui aruginem rasilen, quæ in apparatu non respondit, gummi misto digerant in formas, & ita vendant. quod genus, vt vitiosum, improbat. Fit & quædam arugo ab aurificibus, mortario, & pistillo Cyprij eris, cum vrina pueri impubis, quæ aurum ferruminant. Antedicta aruginum genera vsto ari omnino respondent, sed magis effectu valent. Sciendum fossilem. scoleciā præstantissimam esse: deraſam sequi: postremo loco factitiā, mordacissima tamen est hæc, & magis adstringens. Aurificum autem arugo rose respondet. Aerugines omnes adstringunt, extenuant, excaſciunt. oculorum cicatrices emendant, lacrymas cient, nomas sistunt, vulnera ab inflammatione tuentur. vlcera ex oleo ceraq; ad cicatricem perducunt: callos, & sordida vlcera purgant, cum melle cocta: calum fistularū: erodunt cū ammoniaco collyrij modo in eas adacta, ad gingiuarum autem excrescentias, & extuberationem vtilis. Magnopere extenuant genarū crassitiem, cum melle illita: verū post illitionē sponsia ex aqua calida locus ſouendus est. resina therebinthina excepta, cum are & nitro lepras abigunt. Vritur arugo, quacunque
velis

velis, minutissimè fracta, cōminutaq; , in fictili patina, flagrantibus prunis superposita: versaturq; donec se mutet, & colorem cinereum concipiat: postea refrigerata reponitur ad vsum. Sūt qui cruda olla eam vrant, vti dictum est: sed nō prorsus eundem colorem cremata reddit.

Rubigo ferri. CAP. LIII.

Rubigo ferri restringit: sistit fœminarū profluuia admodum, potuq; præstat ne concipiat. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papularum eruptionibus medetur. Perquàm utilis ad scabritias genarum, reduuias, & pterygia. Condylomatus prodest, gingiuas firmat, podagras illitalenit, alopecias replet. Vinum aquæve, in qua cādens ferrum sit restinctum, potu coeliacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur.

Stercus ferri. CAP. LIIII.

Stercus ferri, quam scoriam vocant, eadem potest, quæ rubigo, sed inefficacius. Aconito ex aceto muso potum opitulatur.

Plumbum elotum. CAP. LV.

Lotura plumbi sic fit. In mortarium plumbum aquam injiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutulenta reddatur: linteo deinde colato aquam superinfundens: quò facilius quicquid est resolutum incerni possit. hoc iterum facito usque dum satis tibi habuisse videatur. vbi concederis

derit priore aqua effusa, nouam adiiciens, vt cadmiam lauato, donec nulla extet nigritia: postea in pastillos cogens reponito. Quidam scobem mundi plumbi lima quasitam, mortario pistilloq; lapideis terunt, aut manibus cum aqua paulatim adiecta fricant, donec nigrescat, mox vbi id pessum ierit, effusa aqua colligunt in pastillos. nam tritum vehementer, cerussa simile redditur. Alij elimata scobi modicam plumbaginem adiiciunt, affirmantes ita elotum plumbum praestantius esse. Potest refrigerare, adstringere, inducere, mollire, explere caua, sistere oculorum fluxiones. & vlcerum excrescentia. Sanguinem supprimit: prodest contra sedis vlcera, condylomata & hamorrhoidas, ex rosaceo: item ad ea, quae aegre cicatricem ducunt: & in totum spodij effectus prabet, nisi quod non obducit crustas. Sympserum plumbum affricatu, mariti scorpionis, draconisq; plagis auxiliatur.

Plumbum vstum. CAP. LVI.

Vritur plumbum sic. Super quam tenuissimas plumbi laminas, & fictili nouo inditas, sulphur inspargito: additisq; alijs rursus laminis, interiecto semper sulphure: vsque diu explerueris, succendito. flagrante aut plumbo, ferrea rude versato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilq; e plumbo non hustum haerit. tum demum obstructis naribus eximito, alioquin halitus plumbi noxius sentitur. Aut elimatam
plumb

plumbi scobem in olla sulphure vrito. Alij laminas in fictili crudo, vt dictum, est, imponūt for naci, aut foco: & circumlinentes operculum, dato exili spiramento, vrunt. Alij pro sulphure cerussam, aut hordeum inspargunt. Alij integras laminas imponentes, acri igne vtuntur, & radica ferrea continuè mouent, dum in cinerem soluantur. Sed difficilis huiusmodi vstio, & si vehementius vratur, contrahit spumæ argenti colorem. Magis tamen nobis placet prima vrendi ratio. Plumbum vstum lauatur vt cadmia, & recon datur. Eosdem effectus habet, quos plumbum elotum, sed multo acriores.

Recrementum plūbi. CAP. LVII.

Recrementum plumbi, quod scoriam vocant optimum est, densum, fractu contumax, cerussam planè representans, nihil plumbosi habens: quod ad luteum colorem accedit, & vrit splendorem imitatur. Eadem, quæ plumbum exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infusa aqua, & refusa summa aqua parte, quæ luteū colorem duxit: idq; sepius, dū recrementū absumatur. Dein vbi confederit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos.

Molybdoides, siue lapis plumbarius.

CAP. LVIII.

Molybdoides lapis à plumbi similitudine dictus, respondentē recremento vim habet, et eodem modo lauatur.

stibis

Stibium. CAP. LIXI.

Stimmi optimum, quod splendidissimum est, modoq; nitedularum emicat, confractu crustosum, nihil terræ, aut sordidi habens, friabile, qd̄ sibi appellant, alij platyophthalmon. Vis eius adstringere, meatus obstruere, refrigerare, ex crescentia in carne cohibere, vlcera ad cicatricem perducere, sordes, & vlcera oculorum expurgare: sistit & sanguinem è cerebri membrana profluentem. & vt in vniuersum dicatur, vis vsto plumbo similis est. Priuatim ambusta igni in pustulas crumpere non patitur, cum adipe recenti illitum. crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cera, & exigua cerussa. Torretur pinsita farina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec carbunculetur crusta exemptumq; restringitur mulieris lacte: quæ marẽ peperit, aut vetere vino. Vritur etiam carbonibus succẽsis efflatum quoad igni deflagret: si enim paulò magis concremetur, plumbum fit. Lauatur vt cadmia, & as. Sunt qui plumbi recrementum eleuant.

Molybdæna, ceu plumbago.

CAP. LX.

Molybdæna optima est flaua, argentea spuma amula, modicè splendens, cum teritur rufa, cocta cum oleo iecinoris colorem trahit. Vitiosa est quæ aërem, aut colorem plumbeum refert. Gignitur ex auro, & argẽto. Est etiã quædam

G

dam

dam fossilis, ad Sebastiam, et Corycum inuenta. Quo in genere probatur, quæ lapidosa non sit, aut recrementosa, sed nitens, & flaua. Vim habet spuma argenti, aut recremento plumbi similem. Vritur, lauaturq; eodem modo. Miscetur conuenientissimè medicamentis, quæ liparas vocant, atque emplastris minimè mordētibus. Carnem recreat, & ulcera ad cicatricem perducit: glutinantibus tamen medicamentis, aut abstergentibus non conueni.

Argenti recrementum.

C A P. L X I.

Recrementum argenti, quod scoriam vocant, aut helcysma, aut encauma, molybdæna vim habet. quare emplastris, quas phæas appellant, additur, ac medicamentis, quæ cicatricem obducunt, utpote cū adstringat, extrahatq;. Spuma argenti. C A P. L X I I.

Spuma argenti quedam gignitur ex arena, quam molybditin vocant, in fornacibus conflata donec perfectè igni incādescat: altera ex argento: tertia ex plumbo. Probatissima est Attica: secunda Hispaniensis: hæc sequitur, quæ fit Dicearchiæ, id est puteolis, Baijs, in campania, & Sicilia. plurima enim hisce locis è flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, chrysitis appellatur, omnium optima: quæ in Sicilia, argyritis: quæ ex argento calabritin. Vis autem adstringere, mollire, expleri

lana, excreſcentia in carne reprimere, ad cicatri-
cē ducere, refrigerare, & occludere.] Vritur argē-
ti ſpumas confractis partibus ad magnitudinem
iuglandium pruna ſuperpoſitis: ita accenſa falli-
bus, vt conflagret, abſtergitur inſidens ſpurcitia
& reconditur. Aliqui ter aſeto, aut vino reſtin-
guentes: rursus vrūt. et eadē proſecuti, reponūt.
Lauatur vt cadmia. Vt argyritidi nominata,
aut, ſi deſideretur, alteri candor detur, ea in par-
tes magnitudine fabarū cōfracta, chœnicis At-
tica menſura, ſiſtili nouo ſuperſuſa aqua, addi-
to candidi tritici pari pōdere, priuatimq; pugillo
hordei, linteolo puro, raro anſulis vaſis alligato,
coquitur, donec hordeū fractum diſſiliat, deinde
omnia in nouum craterem oris ampli trāsfun-
duntur, triticū abijcitur, ſpuma argenti vehe-
mēter manibus affricādo, inſuſa aqua lauatur,
aſſiccataq; in Thebaico mortario teritur, aſſuſa
feruente aqua, donec ſoluta fatiſcat. Excolata
aqua, iterū tota die teritur, & vesp̄ri inſuſa
calida aqua finitur: mane colis excernitur, alia
inſunditur, atq; ter die excolatur. Id ſeptē dieb⁹
feri ſolet: poſtea additis ad ſingulas minas ſpu-
ma argēti, quinis ſalis ſoſſilis drach. inſuſa q; cali-
da aqua, ter die teritur, et addita aqua, excola-
tur: cūq; in albuſuerit, calida inſuſa, idē facito, dū
nullam proſſus ſaleedinem reſipiat. demum ar-
dentiſſimo ſole ſiccata, eiecto prius humore re-
conditur. Sin minus mina ſpuma argyritidis di-

ligenter teritur, addito sale fossilli trito, triplica-
 to pondere, in fictile nouum conijcitur, aqua in-
 funditur, ita vt superemineat: mouetur quoti-
 die mane & vespere, aqua q; superinfunditur,
 priore nequaquam effusa. hoc fit triginta diebus:
 nanque nisi moueatur, crassescit vsque ad duri-
 ciem testa. Post hac effusa leniter muria, in The-
 baico mortario spuma argenti teritur, coiecta q;
 in fictile aquam continens, manibus diligenter
 agitur, mutata subinde aqua, donec nullu sal
 suginis indicium praebeat, deinde quod ex argenti
 spuma candidum apparet, in vas aliud transfer-
 tur, & redactum in pastillos, plumbea pyxide con-
 datur. Alij spumam argenti in fabarum magnitu-
 dines confracta, in ventre suillo crudo ex aqua
 coquunt, dum viscus eliquescent contabescat, ex-
 emptam q; cum sale pari terunt, & vt supra di-
 ctum est lauant. Sunt qui salis librā vnā, & spu-
 mae argenti tantundem, in sole terant, aqua cū-
 tinuē mutata, dum candor ei detur. Alia ratio.
 Sumito quātā vis argenti spumā, vbi lana can-
 dida inuolueris, fictili nouo in dicta aqua, cum
 pugillo fabarum recentium, repurgatarum q; decoqui-
 to: cum q; faba disrupta dehiscant, lana q; non de-
 nigretur, exemptam argenti spumā, & altera
 lana inuolutam, iterum coquito, cyathum aquae
 & parem fabarum modum adiiciens. eadem ter-
 tio, quae supra, facito: in summa tantisper, dum
 lana iam non inficiatur. Insuper transfundens
 in

in mortarium, ad singulas salis fossitij libras, adijcito octogenas spuma argenti drachmas Atticas, & terito: intermittere; nitri quā albißimi cum aqua diluti drachmas quadraginta septē indito: iterum terito, donec satis candoris contraxisse videatur. Ita autē fundens eam ex alto in fictile oris ampli. adiecta largiore aqua, ubi confidere deserit, colato: tum nouā superadijciēs aquam, manibus probè versatā, finito vt confidat, ac rursus per colum traicito. Alternis eadē proseguere, dum pura aqua, dulcisq; effluat, & nullam salsedinem præ se ferat. Postremò in fictile nouum translata, colato sensim omni humore, soli quadraginta diebus sub Canicula sy-
dus exposito, & siccata vtitor. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum sceditates tollēdas, ad rugosas facies, & cicatricosas, laceratasq; & macularum plenas.

CERUSSA. CAP. LXIII.

Cerussa fit hoc modo Infuso in vrceum oris lati, aut fictile labellum quā acerrimo aceto, laminam plumbeam supra fictilis spiraculū, subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiectisq; velaminibus, ne halitum expiret acetū, ubi resoluta fuerit, defluensq; deciderit humore purū ad summa delatū colato, crassamentumq; transfundito, debet quoque sicari in sole, mox trusatili mola teri, aut alias tritum cribrari. postea, quod superest duri, in tennes partes redi-

gendam, cribrandumq; viciſſim eadem tertio, quartoq; facienda. Melior, quæ primò cribrata eſt, & medicamentis oculorum aſſumenda: Secundum locum tenet ſequens, & reliquæ ſuo ordine. Nec deſant, qui ligneas rudes in medio vaſe appendant: & deaſo ceu ſitu impoſito, ita vt acetum non contingat, inditoq; operculo circumlinentes dimittunt. Poſt dies decem laxato obturamento viſunt: cumq; reſoluta materia fuerit, reliquæ, vt ſuprà diximus, exequuntur. Si autem quis in paſtillos velit digerere, aceto attrita ſubacta, diuiditur in paſtillos, qui in ſole ſiccantur. Aeſtate tamen ſupradictum opus obeundum eſt: ita enim candida, atque efficax redditur. Quinetiã hyeme paratur: vrceis ſuprà furnos, balnea, aut fornaces impoſitis: aſcendens enim calor idem quod ſol præſtat. Laudatiſſimã fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut Lacedemone: proximam Puteolis. Torretur hoc modo. Flagrantiſſimis igni carbonibus, ſicili modo, maxime Attico, trita ceruſſam imponito, & aſidue verſato: cumq; cinereum colorem traxit, eximẽs refrigerato, & vtitor. Eſt & aliud vrendi genus. Trita patinis nouis ſuprà prunas imponitur, et ferulacea rude mouetur, donec colore ſimilis ſandarachæ fiat, extractaq; ad vſus miniſtratur. Quæ verò ita parata eſt. Sãdix à quibuſdã dicitur. Lauatur ceruſſa cadmia modo. Viſe refrigerare, ocludere, emollire, ex plere, extenuareq;

insuper excreſcentia leniter reprimere, & ad cicatricem perducere. Miſcetur ceratis, & amplaſtris, quæ lipara vocantur, paſtillisq; Eſt autem lethalis eius potus.

Chriſocolla. CAP. LXIII.

Chriſocolla laudatiſſima Armeniaca, colorem porri quàm ſimillimè reddens. Secundum locum ſibi vindicat Macedonia: & proximum Cypria. quo in genere præfertur pura: damnatur, quæ terram, aut calculos collegerit. Ratio lauandi hac eſt. Tuſam infuſa aqua, mortario expaſſa manu ad pilam vehementer ficato, & ſtatim quàm confederit, colato. Alterã infundens aquam, ruſum terito. hac viciffim proſequere, donec pura, ſynceraq; ſpectetur. dein ſiccato in ſole, & ad uſus recondito. Quòd ſi vtere volueris, ex ea terens; quod ſatis eſſe videbitur, patinis ſupra carbones adponito: et alia facito, quæ ſuprà diximus. Dos chryſocolla ad purgandas cicatrices: excreſcentem carnẽ coërcet, adſtringit, purgat, excaſcit, & modicè corpus mordendo exeſt. Inter medicamẽta intelligitur, quæ vomitiones concitant, & necem inferre poſſunt.

Lapis armenius. CAP. LXV.

Armenius lapis præfertur lauis, colore cæruleo, perquàm æquabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem, quæ chryſocolla præſtat, ſed inefficacius. Quinetiam uſum habet ad pilos in palpebris alendos.

Cœruleus lapis. CAP. LXVI.

Cœrulei origo ex ararijs metallis in Cypro. Copiosior ex arena litorali secundum quosdā sub canatos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur ut chalcitis, lauatur ut cadmia. Vim habet reprimentem, & modicè erodentē. crustas gignit, & exulcerat.

Indicum. CAP. LXVII.

Indici duo genera. vnum sua sponte nascitur, tanquam spuma, germinatione Indicis arundinibus exiens. Alterum insectoria dant officinae: et est spuma purpurea innatās cortinis, quā detractam artifices siccant. Optimum existimatur, quod cœrulei speciem prabet, succum suum sorbet, & leue. Inter medicamenta est, quae leuiter adstringunt, & inflammationes, tumoresque rumpunt. purgat, & reprimat vlcera.

Ochra. CAP. LXVIII.

Ochram leuissimam, & omnino luteā eligere oportet, saturatam, non lapidosam, friabilem, natione Atticā. Vritur hac, & lauatur cadmia modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiones & tubercula dissipare. Excrescentia in carne reprimat, cana cum cerato explet, et articulorum tofos comminuit.

Cinnabaris. CAP. LXIX.

Hallucinantur quī cinnabarin minio eandē esse existimant. Minium enim in Hispanijs

ex lapide quodā argētea arena permisto, tēpera-
 ri solet, alioqui non dignoscitur. Fornacibus au-
 tem in florentissimum, flagrantissimumq; co-
 lorem permutatur. In metallis verò strangulan-
 tem halitum eructat. itaque facies incola vesti-
 cis obuelant, vt per illas spectent, nec respiran-
 do noxiū aërem attrahant. Eo pictores ad sum-
 ptuosa parietum ornamenta vtuntur. Cinna-
 baris verò ex Aphrica desertur, & magno con-
 stat. hætenus inuenitur, vt vix versicoloribus
 pictorum lineis satisfaciat: intento colore, nec di-
 luto præditum: quare quidam sanguinem esse
 draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris
 hamatitæ lapillo eandem. Cōuenit ad oculorum
 medicamenta, verūm efficacius: magis enim ad-
 stringit, & sanguinem cohibet. Ambustis igni,
 & papularum eruptionibus, cerato excepta
 medetur.

Argentum viuum. CAP. LXX.

Argentum viuum fit ex minio, quod abusi-
 uè cinnabaris dicitur, patinis fictilibus im-
 posita, ferrea concha cinnabarin continente, &
 calice coopera, argilla superlita, carbonibus suc-
 cendūt. siquidem deteresa fuligo, quæ calici insi-
 det, refrigerata in argentū viuū coit. Quinetiā
 inuenitur in argenti fodinarum tectis stillatim
 concretū. Alij per se in metallis inueniri tradūt.
 Seruatur in vitreis, aut plumbeis, aut stagnéis,
 aut argenteis vasis: siquidem aliam materiam

G § omnem

omnem excedit, & defluere facit. Potum vim pernicialē habet: suo enim pondere interna est. Remedio est lac multum subinde potum, & vomitionibus reiectum, aut vinum cum absinthio, aut apij decoctum, aut semen homini, aut origanum, aut hyssopum cum vino. Auri limata scobs, id est, ramētum quā tenuissimū epotum mirabili ost auxilio.

Rubrica sinopica. CAP. LXXI.

Rubrica sinopis maximè probatur graui, densa, ad iecinoris imaginem vergens, calculorum expers, concolor, cum diluitur, impediens fusilis. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdā, expurgataq; desertur in Sinopē urbē, in qua venditur: vnde cognomentum accepit. Vim habet exiccatoriam, quasi inducēdo obstruentē, & adstrictoriā. quapropter vulnerarijs emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictorijs commisceri solet. Atū sistit, in ouo sumpta, aut clystere infusa. datur iecinoris vitio laborantibus.

Rubrica fabrilis. CAP. LXXII.

Rubrica fabrilis ad omnia Sinopide inferior est. Optima Aegyptia, & Carthaginensis, lapidum expers, friabilis. Gignitur etiam in Iberia, quae ad occidentem spectat, ochra exusta, & degenerante in rubricam.

Lemnia terra. CAP. LXXIII.

Lemnia terra cuniculoso in specu nata, ē Lemno insula, palustri loco desertur, inibi
elo

electa; & caprino sanguini permista, quam incolacogit in pastillos, & imagine capra signat: unde & sphragida agos, hoc est, sigillum caprae appellauere. Vim antidoti habet contra pernicio-
sa venena singularem: pota cum vino, & praesumpta euomi venena cogit. Contra ictus mor-
susq; animalium, quae exitiale virus eiaculantur,
prodest. Antidotis familiaris. Sunt qui hanc ad
sacrificia vtantur. est & dysenteriae vtilis.

Acramentum sutorium.

CAP. LXXIIII.

Acramentum sutorium genere quidem vniū
& idem est, molle, & concretum: sed in spe-
cie differētiās tres habet. Vnam nānque humo-
ribus stillatim in cuniculos quosdam colatis, con-
crescit: quare ab ijs qui Cypria metalla confi-
ciunt, stillatitium appellatur. Petesius ipsum
pinarion vocat: alij stalacticon, id est, stillatitiū.
Alterum simplici ratione fit in speluncis, postea
transfusum in excavatos scrobes, concrementū
capeſcit, quod peſton, id est cōcretitium, propriē
nominatur. Tertiū dicitur coſtile, & in Hispania
fieri solet: sed inutile, ac inualidiſſimum eſſe
conſtat. Ratio parandi haec eſt. Aqua madesa-
ctum decoquunt, mox in piscinas transfundūt,
& reſidere patiuntur. Hoc certis diebus coale-
ſcit, in cōplures formulas digeſtum, teſſerarum
ſpeciem reddentes, quae racematim inter ſe coha-
reſcunt. Optimum eſſe creditur cœruleum, gra-

ne, concretū, translucens: cuiusmodi stillatitium est, ab alijs lonchoton nominatum. Proximum concretitium. Coctile verò ad insectus, & denigrationes, aptius ceteris esse compertum est: sed ad medicinae vsum inualidius esse, experimenta docent. Valet adstringere, calfacere, & crustas inducere. latices vetricis tineas necat, drachmae pondere deuoratum, aut cum melle linctum: vomitus ciet. aduersus hausta fungorum venena, ex aqua potum auxiliatur. purgat caput aqua dilutum, & in vellere naribus instillatum. Vritur, ut paulo post in mentione chalcitis ostendemus.

Chalcitis. CAP. LXXV.

Chalcitis praefertur similis ari, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, intercurfantibus oblongis venis, splendentibusque. Huic abstersoria vis inest, excalfaciens, & crustas ulceribus obducens: purgat, quae oculis, & eorundem angulis haerent. In genere leuiter erodentium est. Ad ignem sacrum, & ulcera, quae serpunt, efficax est. Sanguinem ex vulua, & naribus erumpentem, cum succo porri sistit. Gingivarum vitia, depascentia ulcera, tonsillasque eius farina coepescit. Vsta, & cum melle trita oculorum medicamentis longe utilior redditur. Callum genarum, & scabritiam absument, abstergetque. Fistulas tollit, collyrii modo in eas adacta. Fit ex chalcite medicamentum, quod Psoricon vocant, duabus eius partibus, cum vna cadmia additis, & ex aceto tri-

tis. oportet autem in fictili obruere fimo diebus quadraginta, per Caniculæ ardore: sic enim fit acrius. idem quod chalcitis potest. Alij pares vtriusque portiones in vino terunt, & eadem prosequuntur. Vritur chalcitis fictili nouo, vini carbonibus superposito. Modus autem vstionis in humidioribus est, dū ipsa chalcitis bullas excitare desierit, & perfecte inaruerit: in reliquis verò, dum mutata in floridum colorem fuerit, & sanguineum aut miniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda est. Insidēs autem spurcitia flatu expellenda, mox reponēda. Torretur etiānum perflatis carbonibus, vsque dū luteo colore palleſcat: aut fictili subditis candentibus prunis, subinde versata, donec igni conflaret, & colorem mutet.

Misi. CAP. LXXVI.

Misi assumendum natione Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet, & vstionem, cum chalcitide eandē, praterquā quod psoricum ex eo non conficitur, excessus, defectusq; ratione tantū differens. Aegyptium autem ceteris præstat, vtpote quod efficacius habetur, sed ad ocularia medicamenta multò superdicto inferius.

Melanteria. CAP. LXXVII.

Melanteria gemina est originis. quadam in faucibus cuniculorū, quibus as eruitur

tur, salis modo cōcrefcit. Alia verò in summa fa-
tie fupradictorū locorum coit, qua terrena eft.
Quinetiam inuenitur in Cilicia, & alijs qui-
busdam regionibus, foſſilis quadā. Preſtat qua
ſulphuris colorem trahit, lauis, pura, aquabilis,
& qua contactu aquæ confefim nigrefcit. Vim
cauſticam eam obtinet, quam & miſy.

SORI. C. A. P. L X X. V. I. I. I.

Sori exiſtimarunt aliqui melanteriam eſſe,
ſaberrantes: ſiquidem ſui generis eſt ſory, ei nō
abſimile. verum ſorei virus ineſt graue, & nau-
ſeam mouens. Inuenitur etiam in Aegypto, &
alijs quibusdā regionibus, vt in Libya, Hiſpa-
nia, & Cypro. Praefertur Aegyptiū, quoq; friatū
nigrius apparet, in multa foramina dehifcens,
ſuppingue, inſuper adſtringens, & olfactu deno-
rationeq; magnum virus olēs, ita vt ſtomachus
in vomitiones effundatur. Quod autē friatum
ſcantillas miſyos modo non emittit, & alterius
generis eſſe, & inualidū, cenſendum eſt. Vim, &
vſtionem ſupradictis ſimilem habet. dolori den-
tium cauernis inditum medetur, eosq; labantes
firmat: iſchiadici ex vino infuſum auxiliatur:
illitum cū aqua, varos extinguit. Medicamentū
admiſcetur, qua capillos, denigrant. Hac autem
ferè omnia, & alia, qua vſtionem experta non
ſunt. peruſtis validiora, eſſe exiſtimantur: pra-
ter ſalem, & vini ſcēm, nitrum, calcem, & con-
ſimilia, qua cruda remiſſiora ſunt. cōbuſta enim

viribus efficaciora redduntur.

Diphryges. CAP. LXXIX.

Diphrygis tria genera esse creduntur. Quoddam enim metallicum est, quod in Cypro sola gignitur: luto sum nanque extrahitur, ex luto cuiusdā inibi specus: extractū sole siccatur, mox circumpositis sarmentis vritur. diphryges ideo vocatū est, quod & à sole, & à sarmentis vratur, arescat, & ferme torreatur. Alterum perfecti aris quasi subsidens fax est: siquidē post frigida aqua offusionem, vt supra retulimus, cū de flore aris differeremus, sublato are, fornacum ima parte coherens id genus inuenitur, & adstrictionem, & gustū aris habēs. Tertium sic fit, Lapidem pyriten, vt calcem multos dies cremāt in camino: cumq; colorē rubricæ contraxerit, eximētes recondunt. Quidam tradūt hoc ex solā materia, quæ lapidem aris gignit, fieri: quando in dictis areis assata, & in scrobes tumulata perurit. tunc enim ambientem scrobis locū cōprehēdit, & exēptis lapidibus nihilominus inuenitur. Præfertur, quod saporem aris reddit, æruginisq; adstringens, & vehementer exiccās linguā: quod sibi exusta ochra nō vēdicat, quæ cremata diphrygis vice vanit. Vis eius adstringere, perpurgare, extergere, siccare, excrescentia consumere, vlcera serpentia, & quæ cacoëthe vocant, ad cicatricē perducere. Suppurationes terēbinthina, aut cerato exceptum discit.

Aurip

Auripigmentum. CAP. LXXX.

Auripigmentum in eisdem metallis, quibus sandaracha gignitur. Optimum existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materia permistum, in squamas fissile: quale in Mysia Helleponti nascitur. Huius duo genera fluxerunt. vnum supra dictum est. Alterum gladiis effigie, pallidum, & colore sandarachæ imitans, glebosum ex Ponto, & Cappadocia defertur: quod etiam secundum locum tenet. Torretur in testa noua, viuis carbonibus subiectis, assiduoq; versatur, donec igne fragret, & mutet colorem: deinde refrigeratum, tritumq; reconditur. Vim habet adstrictoriam, & erodentem. Crustas cum vehementi vredine, & violento mursu excitat. reprimit quæ excrescunt, & capillos euellit.

Sandaracha. CAP. LXXXI.

Sandaracha probatur rufa, & saturatior, & aliena materia vacans, friabilis, cinnabaris colore, sulphuris virus redolens. Dos eadem, & vsus, quæ auripigmento. Explet alopecias, resina excepta: & scabros vngues cum pice eximit: contra phthiriasin ex oleo efficax est: tubercula cum adipe discutit. Prodest ad narium, orisq; vlcera, & ceteras papularum eruptiones cum rosaceo: item condylomata. Datur ex mulso, perulenta extusientibus. Suffitur quoque cum resina, aduersus veterem tussim, rapit per fistulam

nidore: vocem expedit cum melle delincta: suspiriosis cum resina in catapotio optimè datur.

Alumen. CAP. LXXXII.

A Luminis omne ferè genus in Aegypto, et in eisdem metalis inuenitur: etenim scissila quoddam, quasi flos glebosi intelligitur. Gignitur & in alijs quibusdā locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygia, Aphrica, Armenia, & plerisque alijs regionibus, sicut, & rubrica. Plurimæ eius species: verū ad medendi vsum scissile, rotundum, & liquidum expetuntur. Optimum est scissile, præsertim recens candidissimum, gustu per quā adstringens, graue olens, calculorum expers, nec glebulosè aut assulosè compactum, sed sigillatim in capillamenta quadam canescentia dehiscens: quale est, qđ trichites, quasi capella re nominatur, in Aegypto natum. Reperitur quoque lapis huic alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, quod non adstringat. Damnatur in rotundi genere, quod manu confictum est, sed ex figura deprehenditur. Asumendum autem suapte natura rotundum, bullis turgens, albo proprius, atq; validius adstringens, præterea nōnihil palloris cū quadā pinguitudine præ se ferēs, sine arenis, friabile, natione Aegyptium, aut ex insula Melo. Liquidī probatio, vt sit lymphidū. lacteum, æquale, & semper succomadens, sine lapidibus, atque quendam coloris igniculū expi-

H rans.

rans. Vim habent excafaciēdi, strigendi, & ex-
 purgandi, quæ caliginem pupillis oculorum of-
 fundunt. generum carnē, ceterasq; excrescentias
 extenuant. Scissile rotundo efficacius intelli-
 gitur. Vri, & torrerī chalcitidis modo debent. Pu-
 trescentia vlcera compeſcunt: sanguinis fluxio-
 nes inhihent: gingiuas humore pregnantēs cō-
 primunt: motus dentium cum aceto, & melle fir-
 mant. Proſunt cum melle vlceribus oris, eruptio-
 nibus papularum, & fluxionibus aurium, cum
 ſanguinalis herbæ ſucco. Lepriſ conueniunt cum
 braſſicæ folijs, aut melle cocta: item pruritus,
 & vnguinum ſcabritijs, pterygjs, & pernioni-
 bus, aſperſa cum aqua. Valent cum aceti face, et
 galla, pari pondere cremata, ad phagedanas vl-
 cerum: et cū ſalis duabus partibus, ad vitia, quæ
 paſcunt. ſurfures, cum eruo, & pice illita abſter-
 gunt: ad lendes, pediculos, ambuſta, cū aqua illi-
 ta auxilio ſunt. Contra tumores, & graue ala-
 rum, inguinumq; virus illinuntur. Ex Melo au-
 tem aduectū, mulieribus præſtat ne concipiant,
 ante coitum ori vuluæ inditum: partus quoque
 extrahit gingiuis, ſi caro excreuit, vniſ ac conſil-
 liſ accommodantur: ori, auribus, & verendis: cū
 melle illinuntur.

Sulphur. C A P. LXXXIII.

Sulphur optimū exiſtimatur viuum, quod
 Sapyron vocant, mitedulæ modo ſplendidum,
 perlucens, minimè lapidoſum. Probat in gene-
 re ſul

re sulphuris ignē experti, quod viret, ac prapin-
gue spectatur. Plurimū in Melo, & Lipara gi-
gnitur. Supradictum sulphur calfacit, discutit,
& celeriter concoquit. Prodest tussibus, suspirio-
sis, purulenta extussientibus in ouo sumptum,
aut suffitum: praterea partus vsti nidore extra-
hit. Lepras lichenas, scabros vngues, cum resina
terebinthina: mistū aufert: cū aceto autem illi-
tum, ad lepras efficax est: vitiligines tollit. Scor-
pionis icibus, addita resina, medetur: cum ace-
to verò, draconis marini, scorpionisq; plagas sa-
nat. Pruritus toto corpore erumpentes, cū nitro
detersum sedat: regum morbum emendat, in-
sparsum fronti cochlearis mensura, aut in sorbi-
li ouo sumptum. Facit ad grauedinem, & destil-
lationes: subdores quoque cōpersum inhibet. po-
dacricis cum aqua & nitro illitū, conducit. gra-
uitatem auditus, suffiti nidore raptim per fistu-
lam hausto, sanat. Lethargicos suffitu excitat:
erumpentē vndecunq; sanguinem sistit. Contu-
sis auribus, cum vino & melle illitū, medetur.

Pumex. CAP. LXXXIII.

PVmicis probatio, vt magnopere levis, spon-
giosus, subtilis, nec arenosus, item teri facilis,
& candidus. Crematur flagrantissimis carboni-
bus obrutus, & vbi canduerit, extractus, vino
restringitur odorato: iterumq; incesus, restrin-
guntur: & tertia vstione exemptus, & p se resi-
gerat⁹, ad vsus cōditur. Vis eius astringere, gin-

H 2 gum

ginas abstergere. purgat cum calfactione, quæ populis caliginē offundunt: explet vulcera, & ad cicatricem perducit, excrementia cohibet. Fit ex farina eius dentifriciū. Corpori crustā obducit: auelendis capillis aptus. Theophrastus author est, si quisquam in bullientem vrceum vini punicem iniecerit, feruorem statim sedari.

Sal. CAP. LXXXV.

SAl fossilis efficacior est. communiter, si est cæli dus, calculis vacans, & perspicuus, densus, æquali compage. Peculiariter Ammoniacus natione laudatur. si modò findi faciliè possit, & in recta segmenta diduci. In marino sale eligendus est candidus, æqualis, densus. Probatissimus in Cypro fit, & Salamine Cypri, & Megaris, in Sicilia, & Aphrica. Sed inter dicta salis genera lacustris præfertur: sed multò validissimus est Phrygius nomine tapeus, aut trit⁹ aut gnate⁹. Salis natura in cōmune per quàm utilis est: adstringit, absterget, expurgat, dissipat, reprimit, extenuat, & crustas inducit. sed hoc interest, quod aliis alio sit præstantior. Quin & à putredine vindicat. Admiscetur medicamentis pforas abstergentibus. excrementia in oculis reprimit, & pterygia consumit, cæterasque carnis extuberationes tollit. Clysteribus infunditur: discutit lassitudines ex oleo illitus. Contra hydropicorum tumores auxiliatur: dolores in saccis fotu mitigat: & pruritus sedat ex oleo & aceto infriculus ad ignem

ignem, donec sudent: item lichenas, lepras, psorasq;. Anginam ex melle, aceto, & oleo illitus lenat: tunfillis, vnaq; cum melle tostus. Vlceribus in ore manantibus, gingiuis, quas humor vexat, & phagedanis vlcerum, cum polëta crematus illinitur. Aduersus scorpionum ictus cum lini semine: contra serpentium morsus, cum origano, melle, hyssopo: aduersus cerasien cum pice, aut cedria aut melle auxiliatur: contra scolopendra morsus, cum melle, & aceto: aduersus vesparii ictus, & teredines, albidasq; capitis pustulas, thymos, & tubercula, cum seuo vitulino: furunculos, cum vua passa, aut suillo adipe, aut melle discutit: testium tumores, cum origano & fermento maturius concoquit. Crocodilorum morfibz auxiliatur, trictus in linteolo, et intinctus aceto, ita vt vinctis loca constringantur. Prodest ad bestiarum morsus, & ad sugillationes in facie ex melle. cōtra haustum opii, & fungos, cum aceto mulso bibitur. Luxatis imponitur cum farina, & melle. ambustis igni cum oleo impositus postulas erumpere nō patitur. Podagricis itidē imponitur, & aurium doloribus, cum aceto. ignes sacros, & vlcera, quę serpunt, cum aceto, aut hyssopo illitus sistit. Vritur fictili, diligenter opertus, ne exiliat, conditusq; prunis, vsquedum effervescat. Aliqui fossilem subactō polline obliniunt, & carbonibus subiiciunt, vsquedum eius crusta exuratur. Solet & sal com

munis hoc modo vri. Aqua semel abluitur, & siccatus in ollā coopertā mittitur subdito igne, moueturq; donec iam non exiliat.

Salis spuma. CAP. LXXXVI.

Spuma salis spumosi maris lanugo, siue ramen stum est, in exilibus petris inuentum, cui vī eadem, quæ salis.

Muria. CAP. LXXXVII.

MVria effectus salis præbet, abstergitq; dysentericus, infunditur etiam si nome intestina corripit, & ischiadicis veteribus. Ad sotum, aqua marina vsum præstat.

Flos salis. CAP. LXXXVIII.

Flos salis flumine Nilo defluit: lacubus tamē quibusdā innatat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, ceu gari, interdū longē magis virus olet, gustuq; mordatior, & pinguitur lentus. Fumatus autē rubrica, aut scrupulosus, improbatur. Præterea syncerus non nisi oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte, etiam aqua, diluente facilius colorem. Ad vlcera, quæ cacoethe vocantur, & phagedanas, genitalium nomas, & purulētas aures, efficax est: oculorū hebetudines, cicatrices, albuginesq; tollit. Emplastris, vnguentisq; coloris causa, vt rosaceo, miscetur. Sudorem cit, aluum turbat, in vino aut aqua sumptus: stomachum malē habet. Additur acopis. & smegmatis, quæ albandi capilli gratia componuntur. Et in vniuersum

acris est, & feruentis naturæ, vt sal.

Nitrum, spuma nitri. CAP. LXXXIX.

PRæfertur nitrum leue, roseo colore, aut candido, in foramina dehiscens, perinde quasi spongiosum quiddam, quale ex Bunis adfertur. Humores euocat, qui in alto concreuerunt. Spuma nitri optima esse putatur leuissima, globosa, friabilis, colore penè purpureo, aut spumosa, & mordens, qualis ex Philadelphia Lydia defertur. secunda est Aegyptia. quin & in Magnesia Carie gignitur. Vim, & vstionē salis habet, tam nitrum, quàm spuma eius. Præterea nitrum tormina sedat, si tritū cum cumino bibatur in hydromelite, aut sapa, aut aliquibus, quæ inflationes discutere possunt, vt ruta, vel anetho. Febris circuitu redeuntibus illinitur, ante suspectā accessionē. Miscetur emplastris, quæ extrahunt, & discutiunt, extenuāt, & lepræ abstergūt. Cum aqua autē calida, aut vino infusum, inflationes, purulētas aures, & sonitus earundem sanat: sordes expurgat, cū aceto instillatū. Canū morfibz ex asinino adipe, aut suillo medetur. resinæ terebinthinæ admistū furunculos aperit: aqua inter cutē cū fico illinitur: oculis ad claritatē visus cum melle succurrit: & venenis fungorum, ex posca potum: aut si buprestis momorderit, ex aqua: ūs verò qui taurinum sanguinē biberint, ex lacerpio: ūs q; qui cibum non sentiunt, vtiliter obducitur: opi-

sthotonisq; iam remissioribus, et luxatis cū cera
to in lingua resolutione, pani commode permisce
tur. Aliqui supradicta carbonibus vrunt, su
biecta prius testa noua, donec incandescent.

Fæx. CAP. XC.

ELigenda Fæx maximè à vino vetere. Itali
co: sin minus, ab alio consimili. Fæx aceti vi
ribus longè acrior est. Crematur, vt alcyonū, an
tè diligenter succata. Sunt qui noua testa igni
largo vrant, vsquedum penitus incēdatur. Alij
vuis carbonibus facis glebam obrunt, & idem
opus prosequuntur. Experimentum est legitime
vstionis, vt aerio nitore inabescat, linguamq;
tactu vrere videatur. Eadem vrenda facis ace
ti ratio. Vis ei super modum vrens, & astergēs,
vlcera ad cicatricem perducit, adstringit, rehemē
ter exest, siccātq;. Sed recenti vtendum est, quo
niam celeriter examinatur: proinde non nisi in
reconditorio, & vase aliquo reponi debet. La
uatur vt pompholyx. Quæ vstionem experta
non est, tumores & per sese, & cum myrto cohi
bet. ventris, stomachiq; fluxiones illita sistit: mu
liebre profluiū imo ventri, aut genitalibus im
posita mittigat: panos discutit nondum exulce
ratos, & tubercula: rigentes mammas, sui q; la
elis impatientes, cum aceto peruncta extinguit.
Cremata verò, vngues scabros cum resina au
fert. Addito lenticino oleo, illita nocte tota, ru
fat capillum. Elota oculorum medicamentis,
vt spo

vt spodos, adijcitur: cicatrices eorum, & caligin-
es eadem abstergit.

Calx viua. CAP. XCI.

CAlx viua hoc modo fit. Marinorum buc-
cinorum testis igni condito, aut feruenti
clibano, nocte dimittito: postera die, si candidissi-
ma fuerint, extrahito: sin aliter, iterum vrito,
vsquedum vehementer inalbuerint. Dein vbi
in aqua frigidam demersa fuerint, in fictile no-
uum conijcito, & exacte pannis operiens, nocte
vnam conquiescere finito: mane eam extrahens
vbi perfecto omni opere elaborata fuerit calx re-
condito. Fit et e litoralibus calculis igne crema-
tis, necnon e vili, & fusaneo marmore, quae cate-
ris praefertur. Vis omni calci in commune ignea,
mordens, adurens, & crustas inducens: quibus-
da alijs immista, vt adipi, oleo, concoquedi vim
assumit, mollit, & dissipat: vlcera ad cicatricem
perducit. Efficacior existimatur recens, nec asper-
sa aquis. Gypsum. CAP. XCII.

GYpsum vim habet adstringendi, obstruen-
di: sanguinis eruptiones, sudoresq; cohibet,
sed potum, strangulationis modo ingulat.

Sarmentitius cinis. CAP. XCIII.

SArmentorum cinis vrendi vim habet: cum a-
sxungia autem, vel oleo illitus, fractis nervis
articularum collisionibus: & nervorum nodis
prodest: cum nitro, & aceto excrescentias carnis
in scroto reprimat. Serpentium, canumq; morfi-

H 5 bus

bus illitus ex aceto medetur. crustas obducen-
tibus medicamentis admiscetur. Fit ex eo lixi-
uium cōtra precipitationes, & fungorum vene-
na, cum aceto, sale, & melle.

Alcyonium. C A P. XCIII.

Alcyoniū quinque esse genera compertū est.
Vnum enim spissum, acerbi saporis, spon-
giosa facie, item tetri odoris, ponderosum, & pi-
scem olens, quod plurimum in litoribus inueni-
tur. Alterum pinnula oculorum, aut spongiae si-
mile, fistulosum, & laue, odorem algæ referens.
Tertium vermiculi forma, & colore magis pur-
pureū, quod Milesium quidam vocant. Quartū
succidis velleribus non dissimile, multis inanita-
tibus hians, leue. Quintū figura fungi, sine odo-
re, asperum, parte interna quodammodo pumi-
cosum, foris laue, acre, quod plurimū in Propon-
tide iuxta insulam Besbicon appellatam gigni-
tur, patrio nomine alos achnen vocāt. Duo prio-
ra in fœminarū smegmata assumuntur, contra
lētigines, lichenas, lepras, vitiligines, nigritias,
& maculas in facie, reliquoq; corpore. Tertium
q; qui difficili vrina vexantur, aut arenulas in
vesica colligunt, idoneū est: item renibus affectu,
aqua inter cutem, linei. Vstum autem, & ex vi-
no illitum, alopecias replet. Postremum deaban-
dis dēribus aptum est. in alia smegmata, psilo-
thraq; assumitur, cum sale mistum. Si quisquā
alcyonium cremare velit, cum sale in crudum fi-
ctile

Etile mittat. & oblinēs vasis spiraculo luto, ita fornaci mandet, et cū siglinū percoctum fuerit, extrahēs ad vsus recodat. Lauatur vt cadmia.

Adarces. CAP. XCV.

FIt in Capadocia, quod adarces appellatur. Est autem tanquam concreta falsilago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & arundinibus, ac herbis agglutinata. colore flori lapidis Asij similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantū cauo droxima, aut videri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & vitia cutis in facie, & similia, accommodatur. Et in summa vis ei acris. Humorem euocat, qui in alto cōcreuit, & ischia dicis prodest.

Spongiæ. CAP. XCVI.

ESpongijs alias mares appellauere, tenui fistula, spissis, quarum duriores tragos nominarunt. Fœminas autē, quæ contrarias dotes habent. Vruntur eæ, vt alcyonium. Recentes sine pinguitudine vulneraria sunt, & tumores reprimunt. recentia vulnera ex aqua poscāve conglutinant: veteres sinus ex decocto melle iungūt. Vetustæ autem inutiles. Arida ligata ligno, si penicilli modo adiungātur, occulsi vlcera, callosq; laxant. Sicca recentes, & vacua, senilia vlcera, & q̄ fluxiōe laborāt, aut cuniculatim exedūt impositu siccant. sanguinis pfluuiū sistunt. Crematarū cinis ex aceto arida lippitudini auxiliatur

liatur: & ubi quid abstergere, aut adstringere opus est. Vtilius in oculorum medicamentis laua-
re cinerem. Omnium cinis cum pice crematarū,
profluentē sanguinem sisti. Candida cura sunt,
ē molliſſimis recentes per astus tinta salis spuma
qua petris coheret: insolantur in uersa, hoc est,
parte caua sursum spectante, & qua abscissa
fuerunt, deorsum. Si verò aestiu a serenitate ad lu-
nam sternantur, perfusa salis spuma, aut maris
aqua maximum candorem referent.

Corallium. CAP. XCVII.

Corallium, quod aliqui lithodendron ap-
pellarunt, marinum esse fruticem cōstat,
qui alto extractus, duratur statim atque emer-
git, tan quā offuso aere protinus concreſcat. Plu-
rimum inuenitur ad Syracusas, in promontorio
cui Pachyno nomen est. Laudatiſſimum rubēs,
colore antherici, aut sandycis saturata, nec secus
terenti facile cedens, æquabili vsque quaque cō-
cremento, rursus algæ, aut phuci marini odore,
quā ramosiſſimum, forma fruticis, cinnamomi
æmulum. Quod autem in lapidis duritiam coit,
scrupulosum, inane, & lacunosum, vitiosum, e-
xiſtimatur. Adstringit, & refrigerat mediocri-
ter: ex crescentia coercet, oculorum cicatrices ab-
stergit: vlcera caua, & cicatrices explet. Con-
tra sanguinis reiectiones magnopere efficax est:
vrina difficultati auxiliatur. quin & potum
ex aqua lienem absumit. Quod antipathes vo-
cant

cant, coraliū esse arbitrantur, specie tantūm distans. Est autem colore nigro, arberis figura, ramosum magis. Vires supradicti habet.

Lapis Phrygius. CAP. CXVIII.

Phrygius lapis, quo insectores in Phrygia vtuntur, à qua nomen accepit, nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non solida corporis compage, intercedentibus albis segmentis, vt in cadmia. Vritur autē vino optimo perfusus, viuisq; carbonibus obruptus, persatur assiduè follibus, donec mutato colore rufescat: rursus extractus eodem vino restingitur. Hoc iterum, et trinis vicibus faciendum attendendum tamen ne minutim confringatur, et in fuliginē euanescat. Vis crudo, vstoq; adstrictoria, expurgans: vlceribus crustas quadātenus inducit: ambustis cū cerato medetur. Lauatur, vt cadmia.

Lapis Asius. CAP. XCIX.

Asius lapis assumi debet pumicis colore, leuis, fungosus, item friabilis, scissiles venas lutei coloris ad imum actas habens. Eius flos salugo subflaua est, summo lapide insidens, compagetenui, colore in aliquibus albo, in alijs pumici simili, ad luteum vergente: admotus linguae aliquantū mordet. Vim habet vterque adstrictoriam, & modice erodentem. admistus liquidae pici, aut terebinthinae tubercula discutit. Longè validior flos existimatur. De cetero siccatus flos

vetera vlcera, & cicatrici repugnantia sanat. ex crescentia cohibet: tetra vlcera, & fungi similia, cū melle expurgat: vlcerum caua explet, & expurgat cum melle: depascentiaq; cum cera to sistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto faba lomento: & lienosis ex aceto, & vina calce. Prodest flos ex melle phthysicis linctu. Podagriti iuuantur, pedibus in folio ex eo lapide exanato inditis. Fiunt quoque ex eo oculi, qui corpora erodunt: & luxuriantem carnem, & corporum crassitiē absumunt, cū vice nitri in balneo sparguntur. Si lauare libet, cadmia modo lauatur.

Lapis pyrites. CAP. C.

PYrites lapidis genus est, à quo as conflatur. Eligi debet aris similitudine, facile scintillas edens. Vritur sic. Melle irrigatus, molli pruna cōtinuē flatur folliibus, donec rufescat. Alij in multos carbones igni candentes, lapidem copioso melle perfusum deiiciunt, & vbi ad fuluum colorem verge cepit, extrahūt: efflatoq; cinere, rursus in defactum cremant, donec aquabiliter assiccatus, friabilis reddatur: siquidem saepe facies summa solum vritur. ita crematus, siccatusq; reconditur. Si eloto opus sit, lauari debet, vt cadmia. Tam crudi, quā vsti vis est excalfacere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, duritias concoquere. & concoctas discutere. Resina exceptus ex crescentia in carne cohibet. sed calorem quendam, & astrictionem parit. Ita vstum non
nulli

nulli diphryges appellant.

Lapis hæmatites. CAP. CI.

Hæmatites optimus habetur friabilis, saturato colore niger, durus, & suo pte ingenio equalis, nulla sorde admista, nulloq; & onarum discursu. Vim habet adstringentem, & ex calsactioriam aliquatū, extenuantemq;. Oculorum cicatrices, & scabritiam cū melle purgat: cum lacte autem muliebri, lippitudini, fractis, et oculis cruore suffusis conuenit. Bibitur contra difficultatem vrinae, & fluxiones mulierum in vino: & ab ijs, qui sanguinem reiecerunt, cum succo punici mali. Fiunt ex eo coticula, & collyria oculorum vitijs apta. Vritur vt Phrygius, sine vino duntaxat. Modus vstionis est, vt modicè leuis fiat, & bullis quibusdā intumescat. Sunt qui hæmatiten ita adulterant. Densam glebā, rotundamq; schisti lapidis, cuiusmodi sunt, quæ eius radices vocantur, in vricum figlini operis, qui feruentem cinerem contineat, condunt: paucaq; interiecta mora eximunt, experimunturq; sitria ad cotem hæmatitæ colorem reddat. quod sita res se habet: reponunt: sin minus, iterum obruunt: & subinde conspicientes, periculum faciunt: siquidem in cinere diu dimissus, colore mutato diffunditur. Coarguitur malè confictus, primum scissilibus venis: quippe in rectos venarum discursus refringitur. At hæmatites longe secus se in colore habet: nanque hic floridū reddi

dit, hematites verò saturatiorem, atque cinnabarin imitantem. Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & è magnete lapide, vehementer am busto. In Aegypto sponte natura cum metallus nascitur. Lapis schistus. CAP. CII.

Schistolapis in Iberia Hispania gignitur. Pro batur maxime, qui croci colorem amulatur, friabilis, suapte natura fissilis, concremēto, & al terno coherentium venarum discursu, pectinū modo. Ammoniaco sali similis. Vin exhibet ha matita, sed ad omnia infirmiorē. quin & cana replet muliebri lacte perfusus. ad procidentia, ru pta, item genarum crassitiem, & vnas oculorū, magnopere efficax est.

Lapis gagates. CAP. CIII.

INgagatarum lapidum genere, preferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit. Niger est plerūque et squalidus, crusto- sis, perquam levis. Vis ei molliendi, & discutiē- di. deprehendit fonticum morbum suffitus: recre atq; vuluæ strāgulationes: fugat serpentes nido- re. podagricis medicaminibus, et acapis additur. In Cilicia nasci solet, qua influens amnis in ma re effunditur, proximè oppidum, quod Plagio- polis dicitur. vocatur autem & locus, & amnis Gagas, in cuius faucibus ij lapide sinueniuntur.

Lapis Thracius. CAP. CIIII.

Lapis Thracias dictus, nascitur in flumine quodā Scythiæ, cui Ponto nomen est. Vn ei

gagata. Traditur aqua accendi, & oleo restin-
gui: quod in bitumine accidit.

Lapis magnes. CAP. CV.

Magnes lapis optimus est qui ferrum faci-
lè trahit, colore ad caruleum vrgente, dē-
sus, nec admodum grauis. Datur cū aqua mul-
sa trium obolerum pondere, vt crassos humos
eliciat. Sunt qui magnetem crematum pro hæ-
matite vendant.

Lapis arabicus. CAP. CVI.

Arabicus lapis maculoso ebori similis. Is
tritius illitus emorrhoidas exicat. Eius ci-
nis dentificio optimus.

Lapis galactites. CAP. CVII.

Galactites appellatur, quod lacteum succum
resudet: cinerei tamen est coloris, & gustu
dulcis. Ad oculorū fluxiones, & vlcera cōuenien-
ter illinitur. Oportet autem in aqua tritum, py-
xide plumbea recondere, propter vim glucini,
quod ei obhæret.

Lapis melitites. CAP. CVIII.

Melitites omnia galactitæ similis, hoc tan-
tū interest. quod dulciorem succum remit-
tit. Eiusdem vt Galactites effectus.

Lapis morochthus. CAP. CIX.

Morochthus lapis, quem aliqui galaxiam,
aut leucographida vocauerunt, in Aegy-
pto nascitur. quo, vtpote molli, & facilè lique-
scente, linteones dealbandis vestibus vtuntur.

I Spiracn

Spiracula corporis obstruere videtur: conueniens
ijs, qui sanguinem expuunt, coeliacis, & vesicae
doloribus cum aqua potus. itidem fluxionibus
vuluae, & impositus velleri. Mollibus oculorum
collyrijs miscetur: explet enim caua, atque dela-
crymationes sistit. Idem cerato exceptus, vlcera,
quae sunt in teneris partibus corporis, ad cicatri-
cem perducit.

Lapis alabastrites. CAP. CX.

Alabastrites vocatus onyx, crematus, resi-
na aut pice exceptus, duritias discutit, sto-
machi dolores cum cerato leuat: gingiuas compri-
mit. Lapis thyites. CAP. CXI.

Lapis nomine thyites, in Aethiopia gigni-
tur, sub viridi colore iaspidem imitatus,
cum diluitur tamen, lacteum succum reddit. Ve-
hementer mordet: tenebras, quae pupillis obuer-
santur, expurgat.

Lapis iudaicus. CAP. CXII.

Iudaicus lapis in Iudaea nascitur, glandis effi-
gie, candidus, scita admodum configuratione,
lineis aequaliter inter se distantibus, quasi indu-
stria detornatis. Solutus nullam qualitatem ma-
nifestam gustui representat. Potest ciceris ma-
gnitudine tritus ad cotem, vt collyrium, cum ca-
lida aqua cyathis tribus, potu difficultati uri-
nae auxiliari, & calculos in vesica comminueri.

Lapis amiantus. CAP. CXIII.

Amiantus lapis in Cipro nascitur, scisse ala-
rio

mini similis. quo, utpote flexili, telas & vela tantum spectaculi gratia texunt, quæ ignibus iniecta ardent quidem, sed flammis inuicta splendiora exeunt.

Lapis saphirus. CAP. CXIII.

Saphirus lapis percussis à scorpione, potu prodesse existimatur. Contra intestinas exulcerationes bibitur. Excrescentia in oculis, vnasque & pustulas inhibet, & ruptas membranas cogit.

Lapis memphites. CAP. CXV.

Memphites in Aegypto iuxta memphin inuenitur, calculorum magnitudine, pinguis, versicolor. Tradunt trito, et illito, quæ vrenda, aut secanda sunt, sine periculo obstupescere, ita ut non sentiant cruciatum.

Lapis selenites. CAP. CXVI.

Selenites lapis, quem aliqui aphroselemon appellarunt, quoniam noctu inuenitur luna imaginem reddere, qui cum ea quidem augetur, & decressit. Nascitur in Arabia, candidus, translucens, levis. Huius ramenta comitialibus in potu dari iubent. Eo ceu gestamine ad amuleta mulieres vtuntur. Arborea adalligato eodem frugifera redduntur.

Lapis iaspis. CAP. CXVII.

Iaspidium quadam smaragdum imitatur: alia crystallum, colore similis pituitæ: alia non dissimilis aeri, ob id vocatur aerix. usæ: alia veluti fumo infecta, quæ capnas ex argumeto voca-

tur. quædam lineis albis resplendentibus præsignitur. Assyrios appellata. alia terebinthina similis, quæ terebinthiæ usæ dicitur alia colore cal-
lida gēma amulatur. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partu femoribus appensa.

Lapis ætites. CAP. CXVIII.

AEtites lapis est veluti prægnans, cū quat-
titur, alio in vtero sonante. Gravidis con-
tinet partus, cū lubrica sunt vuluæ, & parū
tenaces, sinistro brachio adalligatus: sed partu-
rientibus è brachio admoueatur, & fœminibus
alligetur, vt sine doloribus pariant. Furem de-
prehendit, si quis in pane conditum offerat: fur
enim mansum deuorare non poterit. Quinetiā
concoctus furem coarguit: quippe decocta cū eo
deuorare non poterit. Tritus, et cerato exceptus
cyprino, aut glaucino, aut alio excalfaciente, co-
miciales magnificè iuuat.

Lapis ophites. CAP. CXIX.

Ophite genera multa. quidam ponderosus
& niger, alter cinereo colore spectatur, pū-
ctis distinctus. tertius lineis quibusdam candidis
intercinctus est. Omnes alligati contracapitis do-
lores, & serpentium ictus prosunt. Feruntur,
qui lineas habent, lethargo, & capitis doloribus
auxiliari.

Lapides in spongijs. CAP. CXX.

Lapides in spongijs inueniuntur, qui vesica
calculos rumpunt, in vino poti.

Litho

Lithocolla. CAP. CXXI.

Lithocolla glutinum, quo lapides coniunguntur. conflatur autem ex marmore, lapide Pario, & taurino glutine. Potest candente specillo admotum, incommodos oculis pillos replicare.

Lapis ostracites. CAP. CXXII.

Ostracites teste similitudinem habet, crustosus, & in laminas fissilis. quo mulieres ad detrahendos pilos, pro punice utuntur. Menses drachmæ pondere potus ex vino sistit. Si quatuor diebus à purgatione bibatur sicilici pondere, feminis præstat ne concipiant. Cum melle autem impositus, mammarum inflammationes lenit & nomas cohibet.

Smyris lapis. CAP. CXXIII.

Smyris lapis est, quo annularij sculptores lapides expurgant, ad erodendum, & vrendum utilis, gingiuis, quas humor vexat, prodest, dentificio commendatur.

Arena litoralis. CAP. CXXIIII.

Arena è litoribus sole feruèsa facta, hydropicorum tumores exugit, si capite tenus in ea obruantur. Torreri solet ad aridos fotus, pro milio aut tale.

Lapis naxius. CAP. CXXV.

Ecote Naxia, quod ex acuendo ferro deteritur, illitum alopecias ad pilum reducit. virginum mammæ cohibet, nec increfere patitur. Potum ex aceto lienem absomit, et comitialibus prodest.

Lapis geodes. CAP. CXXVI.

Geodes lapis adstringit, siccatur, caligines oculorum discutit. Illitus autem ex aqua testium, mammarumque inflammationes sedat.

Terra omnis. CAP. CXXVII.

Omnis terra, ad medendi usum recepta, summam & primam vim habet refrigerandi, meatusque obducendi, occludendique; sed specie distat, cum alia adiunctis quibusdam ad alia sit utilis.

Terra eretria. CAP. CXXVIII.

Eretriades duae sunt, una vehementer alba est, altera cinericia. Optima habetur ad cinereum colorem vergens, per quam mollis, quasi per aramenta tractim ducatur, lineam violaceam refert. Lauatur, ut cerussa, aut hunc in modum. Teritur seorsum, & cum aqua, & ubi pressum ierit, humor leuiter excolatur: siccata solibus, iterum teritur interdum, adiecta aqua, ut vespere confidat: antelucanis color excernitur, & demum in sole trita, si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desideretur, pastilli magnitudine ciceris in fictile perforatum coniunguntur, oreque vasis diligenter obturato, supra carbonem candentes continenter foliis persuantur: ubi vero cinis in fauillas se conuertit, aut aereum colorem contraxit, exempti reconduntur. Vim habet adstringentem, & refrigeratorem, leuiter mollientem: cana explet, & sanguinolenta conglutinat.

Terra samia. CAP. CX XIX.

Samia praefertur candida, leuis, tangenti lingua glutinis modo adhaerescens, mollis, succosa, friabilis: cuiusmodi est, quam aliqui collyrion vocant. Duae enim species eius: vnam antea diximus: altera aster appellatur, crustacea, & cotis modo praedensa. Vritur, ac lauatur, vt eretria, vimque consimilem habet. Sanguinis reiectiones sistit: foemina fluxione vulua laborantibus, cum flore syluestris punica datur. Testium, & mammarum inflammationes, illita ex rosaceo, & aqua, refrigerat: sudores arctet. contra serpentium morsus, & venena pota ex aqua auxiliatur.

Lapis samius. CAP. CXXX.

Samius lapis in Samia terra inuenitur, quo sacrifices vtuntur polliendo auro, vt respiciat. Probaturn cadore, & duritia. Vis ei adstrictoria, & refrigerans. prodest stomachicis potus. sensus hebetat: verum ad fluxiones oculorum, & ulcera, cum lacte efficax est. Partus, vt tradunt, adligatus accelerat, & coconceptus foeminarum custodit.

Terra chia. CAP. CXXXI.

Chia eligi debet candida, vergens ad cinereum Samiae similis. Est autem crustosa, albaque, sed fictitius formis differens. Vis eadem, quae & Samia. extendit faciem, & erugat, atque splendidam reddit: colorem in facie, & corpore toto commendat. in balneis pro nitro deterget.

Terra selinusia. CAP. CXXXII.

EAdem praestat Selinusia. maximè laudatur, quæ vehementer resplendet, candida, friabilis, & humore dilui celerrima.

Terra cimolia. CAP. CXXXIII.

Cimolia duo genera, candida, & ad purpureum inclinās. Optima existimatur, quæ innatam habet pinguitudinem, tactuq; frigida sentitur. Vtraque aceto diluta, parotidas, & alia tubercula discutit. Ambusta igni, si statim cimolia oblinantur, pistulas non sentient: testium duritias, & totius corporis collectiones cohibet: igni sacro imponitur. In summa, vtraque multum in medicina comendatur, si incorrupta originis, nec spuria assumatur.

Terra pnigitis. CAP. CXXXIII.

QUæ pnigitis dicitur, colore ferè eretria similis est, gradioribus tantum glebis: manū si quis admoveat, refrigerabit: tactu linguae vique ad eò glutinosa, ut pensilis hareat. Cui effectus idem, qui cimoliae, paulò tamen infirmior. Hanc aliqui pro eretriade vendunt.

Testæ fornacæ. CAP. CXXXV.

Fornacæ testæ vehementer tostæ, crustas ulceribus obducunt: quare prurigini, & papularum eruptionibus, medentur. Podagricis prosunt: strumas discutiunt, cerato exemptæ.

FTerra fornacum. CAP. CXXXVI.
Fornacum terra, quæ retorrida fuluescit,
eius

eiusdem cum testa effectus.

Terra melia. CAP. CXXXVII.

MELIS colore cineream eritreā imitatur, aspera tactu: ea digitis friata, deraſi pumicis modo crepitat. Vim habet aluminosam, sed remissiusculam, id quod gustu deprehenditur: modicè linguam siccatur: purum corpus reddit, & colorem commēdat: pilos extenuat: vitilignes, & lepras abstergit. Pictoribus vsum prabet, vt colores diutius perennent. Emplaſtris viridibus, quæ chloræ dicuntur, efficaciter inseritur. Ex omni melia terra, & omni alia in vniuersum, eligi debet recens, mollis, nō lapidiosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit, faciliè resoluatur.

Terra ampelitis. CAP. CXXXVIII.

EX ampelide terra, quæ pharmacitis nomine in Seleucia Syria nascitur, laudatur in primis nigra, picæ longos carbones referens, modicè assulosa, æquabili splendore, quæ detrita, accepto, oleo, statim eliquescit. Vitiosa censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem non resoluitur. Vim dissipandi, & refrigerandi habet. ad calliblephara additur, tingendis capillis idonea. Vſus eius ad illinendas vites, sub germinationis tempus, vt pote cum innascentes vermiculos enecet.

Fuligo pictoria. CAP. CXXXIX.

FULIGO, qua pictores vtuntur, ex vitrarijs officinis colligi solet: siquidem ei palma tribui-

tur. Vis ei ad adstringendum, & erodendum
efficax. fracta, cum rosaceo cerato ad cicatricem
perducit.

Atramentum librarium.

CAP. CXL.

Atramentū, quo scribimus, fuligine è te-
dis cocta colligitur. In singulas libras gū-
mis, terna fuliginis vncie adijciuntur. Fit etiam
è resinarum, & pictoria fuligine, de quo paulo
antè diximus. Assumitur autē fuliginis mina,
gummi sesquilibra, glutinis taurini, atramenti-
futoris, singulorū sescuncia. Additur conuenien-
ter erodētibus medicamentis, ambustis, ex aqua
commodè crassius illinitur, sed non antè solua-
tur, quàm cicatricē induxerit: sanatis siquidem
vulneribus, sua sponte decedit. Caterū habes,
amicissime Aree, serè quæ tradēda duximus pro
operis modo, quem destinaueramus, & mate-
ria, auxiliorumq; medicinalium copia.

LIBRI QUINTI
FINIS.



P E D A C I I

DIOSCORIDIS

ANAZARBEI, DE

Medica materia,

LIBRI SEXTI.

Præfatio.



Superioribus, amicissime
 Arce, libris tradidimus
 de aromatibus, oleis, un-
 guentis, arboribus, &
 earundem frutibus, lacry-
 misq; item animalibus,
 melle, lacte, seuo, frumen-
 tis, oleribus, herbis, radicibus, liquamentis, vinis,
 metallisq;. In hoc verò totius operis vltimo, fa-
 cultates medicamentorum recensebimus, quæ
 prodesse nobis, aut officere possunt. Vitata igitur
 orationis prolixitate, opus institutum prosequamur.
 Huiusmodi autem tractatus cum bifaria distributus sit,
 in partem venena præcauentem,
 ita ut ne fallat sumētes, aut si quando per impru-
 dentiam dētur, ut tū quoq; innoxia fiāt, irritaq;
 & in

Et in rationem ipsius succurrendi, qui iam noxam
 sentiunt: primum differam de praecavendi modo,
 quem esse difficillimum plerique maiorum arbi-
 trantur, quod dantes clam venena ita insidias
 temperant, ut peritissimum quenque decipiant.
 Siquidem venena sua amaritudine, permixtis dul-
 cibus, spoliant, & graue odoris virus mixtura
 odorum eximunt. Aut medicamenta
 immiscunt, quae tuenda sanitatis gratia dari pu-
 tantur, & praesertim in valetudine, ut absin-
 thium, tragoriganum, satureiam, aut hyssopum,
 quinetiam thymum, irim, origanum, abrotonum,
 castorium, aut si quid medicamenti purgatorij
 cognatam habere qualitatem videatur. Aut po-
 tionibus inserunt, ut vinis asperis, iuribus, passis,
 mulse aquae, musto: succis, ut in cremore lentis,
 polentis: aut medicaminibus, aut alijs, quae assu-
 muntur, edulij speciem referentibus. Quare qui
 in ea suspitione sunt, conditos cibos vitare de-
 bent, omniq; intenso sapore dulcium, aut salso-
 rum, aut acidorum abstinere: nec sitibundi assa-
 tim bibere, aut esuriētes voraciter comesse, sem-
 perq; ad saporem horum diligenter attendere,
 praesertimq; potu frigidam aquam praesumere.
 Satiato enim appetitu, qualitates agerrime
 postea concoquuntur. In agris quidem facile ca-
 uemus potiones auxilij prae-textu dari solitas,
 quas offerunt improbi veneficiorum artifices: itaq;
 ab eis laborantes morbo non perinde audentium

iniurijs patēt. Et hæc quidē ne faciliē incauti seductiq; homines capiantur dolis veneficorum, ratio est, & facultas. Sed alia supereſt expeditior, vt ſuſpicioſi aliqua præſumāt, quæ venenorum vires hebetent, & ineſſicaces irritasq; reddant: cuiusmodi carica ſunt cum iuglandibus nucibus manducata, & quæ cedromela vocit̃, id eſt citria, ſeminuq; napi drachma cum vino. Item folia calaminthæ, aut creta, quæ Lemnia ſphragis appellatur, pondere pari cum vino: aut ruta folia, et nucis iuglandis nucleū: aut caricas duas, & ſalis callum ieiuni ſumant, & nullo veneni genere ledentur. Antidota ex vino ſumpta, eūdem effectū præbent: inter quæ intelligitur magnum Mithridatium, & quod ſcinco, & quod ſanguine tēperatur. Quin & ſæpe venenis obſiſtunt peculiareſ quidam corporum affectuſ certo quodam modo conſtitutorū, cum quadam cibi, potuſq; qualitate, tum vini copia ita temperatorum, vt cum venenis diſſentiant. ſiquidem ingeſti veneni vires frangunt, atque iam priore alimento ſarctis, præcluſisq; meatib; obſtant, ne membratim per digeſtionem inſinuetur. Verū enimvero, quoniā fortuna neceſſitas interdū ſimilia diſcrimina peregrè agentibus adſert, aſque vllis inſidijs hominum, nonnihil diſſerendum mihi de hac re neceſſarium ducō. Iam primum igitur culinam apparare loco ſubdiali conuenit, cibosq; et potuſ in huiusmodi loco ſtrue-

re. Si id fieri commodè nequit, secunda erit conditio hæc, apparendi, apponendiq; sub tecto. Sed tum diligenter laquearia animaduertenda: frequenter enim à superioribus cõtabulamentis animalia decidunt exigua quidem, sed quæ non modicam perniciem moliantur, vt phalangia, stelliones, & alia quadã reptilia. Porro vinaria vasa diligenter intueri oportet: nanque reptilia odore vini illiciuntur, quæ interdum sorbendo, noxium virus eructarunt, interdũ verò delapsa immersaq; expirarũt, & exitij causas haurientibus attulerunt. Sed hæc hæcenus dicta sint, ne cauti, & providi insidijs pateant. Quod si qui sua sponte, aut ex quorũdam insidijs sumperunt, auxiliari primo quoque tempore oportebit, siquidem dum comites singulorum venenorum notæ expectantur, immedicabile fit venenum, & paup̃sser neglectum, medicamentis ægrè cedit. Quare si qui pro cõperto se virus sumpsisse intelligunt, & fateantur, aut eorum, qui aderant, testimonio constet, protinus ad idonea remedia transeunt, facillè peculiari, nativãq; constitutioni restituemus. Neque enim ijs assentimur, qui prorsus auxilia in huijcemodi frustra adhiberi contẽdũt. Quo enim modo morbi, quorum causa caca, latentẽsque corporibus insident, medicinam admittunt. & quæ fornicem incurrunt venena, medendi rationem asperantur? Aequè vero omnes morbi pro causarum in-

gruen

gruentium magnitudine, proq; antecedentibus affectionibus, qualitatibusq; quibus sit opportunum corpus, vel medicabiles sunt, vel nullis cedunt medicamentis. Quod si qui forsau obmutescunt, aut tremuli, aut nolentes alioqui venenum à se egeri, nullam nobis eius cognitionem præbeant, tum protinus accedendum ad ea, quæ communiter epotis quibuscunque venenis opitulari consueverunt. Atqui nullum magis in omnia valens auxilium dari potest, quam vt proximo loco virus foras exhauriatur, priusquam inualeseat. Quare sine mora, calidum oleum ex aqua, aut seorsum, vt vomitare cogantur, dari conuenit. Aut si oleum natura loci negat, butyrum cum aqua calida, aut malua, aut lini semine, aut tragog, vrtica, feno græco, aut balica decoctio, vicem eius exhibebit. Hæc enim non modo vomitionibus exigent vi illa sua laxatrice, aut nauseam ciente, sed aluum quoque subducent, & corporum inanitione ita aduersabuntur, vt acrimonias venenorum hebetent. Id quod euidenter huiusmodi argumento deprehendere licet. Esto, vt quisquam vina calce, vel face, aut cantharidibus, aut alio quouis acri, corpus exulcerare statuerit, is si ipsum oleo leniter illinat, exulcerationem non accipiet. Atqui neque vehementer adstringi corpus, neque refrigerari poterit si antea perungatur. Quinetiam vomitus non ob id modo, quod vacuet, & noxium humorem exernat, in-

uamen

uamentum adfert, sed quod assumptum virus nonnunquam odore, coagulatus grumis, aut colore prodatur. quippe cum odore, & amaritudine, meconiam: colore, cerussam, gysumve: grumis, lac aut sanguinem animalis recens ingulati ostendat. Nam grauis odor regestorum, leporis marini, aut rubet & veneficia deprehendit: ita ut nonnulla ab ijs remedia peti possint, ad idonea singulorum auxilia transeuntibus. Olco etiam malum decoctum admiscetur, aut glaucium, aut adeps anserinus, aut pinguium carnum iura, aut lixiuium lignorum cinere factum. Vbi vero vomitus diligenter citatus fuerit, ne quid in ventre coierit, quæ hæserunt intestinis reliquæ, clystere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum cum hydromelite sumptum, & vina vetera liberalius epota, gallinacea iura, prapingues pisces, vetusta carnes pinguesque, & quæ adipe aut recti butyro parantur. Aluum nanque subducit, ut diximus, & stomachum resoluentia, proniorem ipsum ad vomitum reddunt: & venenorum acrimonias hebetant, atque meatus obstruentia, celerem virium penetrationem inhibent. Quinetiam medicamenta dantur, quæ communi dote prosunt, ut Lemnia terra, agaricum, abrotonum, irio, radix eryngii, semen pastinacæ, & calamintha, nardum Gallicum, castorium, ferula virentis medulla, flos rhododendri, succus marrubii, laser, aut laserpitium, sagapenum, pencedani

succus

succus, aut panacis, & radix, quam magudam appellarunt, aristolochia longa, sylvestris ruta semen, & betonica, quam cestron nominant, folia. singula cum vino drachma pondo sumi debent. Effectum prabet polij decoctum, & seseli, & liquida pix. lincti. Magnifice ferunt opem antidota, quae in calce operis scripta reliquimus. Communis ratio praestandi auxilij ita se habet. Caterum ab ijs, quae consueuerunt euenire, communia remedia sumptitari possunt. Ferè enim vires venenorum quam plurimorum in affectus consimiles corpus tandem redigunt. Quam ob causam plerisque communia conducunt auxilia. varia etenim sunt venenorum genera, communes tamen, nec multi iidem affectus oriuntur. Neque fieri potest, ut omnes concurrentesque casus, quae symptomata vocant. vnum venenum sequantur. alioquin superuacanea fuisset venenorum singulorum traditio, cum suis remedijs ab authoribus descripta. Neque verò in vno eodemque proptum est inuenire, ut quis stomachi, alui, intestinorum, iacoris, renum, & vesica dolore vehementer crucietur, ut singultiat, erodatur, contremiscat, refrigeretur, obmutescat, conuellatur, pulsus elanguscat, spiritus difficilis fiat, veterno prematur, vertigo obuersetur, caligent sensus, straguletur, sitiatur, sanguis erumpat, febre conflitetur, agere lotium reddat, torminibus vexetur, crebro vomitet, nausea pre-

K matur

matur rubescat, liuore sugilletur, pellescat, despiat, stertat, viribus deficiatur, & pleraque alia faciat, patiaturq; singula enim in generales affectus deducta, pauca numero, & communia ea demonstrant, quae euenire consueuerunt. Quare in singulis, quae supra diximus, facile fuerit deuoratum virus cognoscere. Nam oris & linguae erosio, stomachi, ventris, vesicae ac renum inflammatio, vehemens vrinae difficultas, & interdum cruoris cum eo exitus, lancinatio, & in pluribus partibus quidam adustionis sensus, non in cantharidibus modò potius reperiuntur: sed in erucis quoque pinorum, & bupreste, & salamandra. Porro non modò eos, qui meconium hauserunt, veterno, aut sopore premi, stertere, liuore sugillari, torpere, refrigerari, stupefcere, toto corpore pruritum sentire, sensu priuari constat: sed eos etiam, qui mandragorā, aut cicutē deuorarunt. Delirium non hyoscyamus tantum infert: verū etiam, quae toxica appellantur: itidē aconitum, & mel, quod in Heraclea Pontica gignitur. Strangulatio nō minus in fungis, quam in sanguine taurino, lacte, aconito, serissa, gypso conficitur. In summa difficile vnum vni veneno proprium inkenire signum, quod ausum, gestatumq; virus prodere possit: maxime, quod haec ceterorum etiam vitiorum, quae in corpore exoriuntur, communia sequi solent. Caterum in his, quae celeriter enecant, noxam signis forsi-

tan indicare possis, si ad ea respexeris, quæ sum-
mus dicturi. Sed in ijs, qui ad longas ægritudi-
nes spectant, nihil ad medendi rationem diffici-
le, duntaxat quod pertineat ad indicia noxæ,
utpote cū venena statim, atque presentaneam
vim illam perdiderunt, transmutata in lōgos af-
fectus, communia reliquorum, vitiorum reme-
dia, compositionesq; flagitent, cū veneficia pro-
prietas non amplius insit. Si verò longa sit affe-
ctio, in aliquod diuturnorum merborum genus
residet. à quibus facile fuerit medendi rationem
assumere. Sed de ijs, quæ generaliter auxilian-
tur, hæcenus. Consequenter quæ priuatim sin-
gulis prosunt, scriptis mandabimus, si prius sigil-
latim exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus
exitialem, aut maleficam vim sortiuntur, ut
medicinæ studiosi ea cautè obseruent, quæ ad ra-
tionem salutis scripta inueniuntur quòd nōnul-
la eorum, quibus vtuntur, venenis sint commi-
sta. Iniuria enim magnas adfert noxas, et sæpe
continuo vsu eorum, homo in perniciem agitur.

Proinde animalia, q̄ exitiosam vim habet, hæc
sunt, citharides, buprestis, salamandra, pinorū
eruæ, lepus, marinus rubeta, et rana palustris
muta, denorata hircines. Semina sunt hyoscy-
mus, coriandrum, cicuta, gith, psyllion. Ligua-
menta, meconium, opocarpasum, thapsiæ succus, e-
laterium, mandragoras. Radices, quas mittit
chamcleo, aconitum, thapsia, veratrum, ixia,

agaricum nigrum, ephemerum, quod aliqui Colchicum vocant, quod in Colchide nascitur. Arbores, herbe, oleraq; , smilax, quam aliqui tithymalum appellant, Romani taxum: solanum manicum quod & dorycnium dicitur sardonias herba, quae ranunculi genus est: corniculatum papaver, pharicum, toxicum, ruta sylvestris, fungi. Ab animalibus, taurinus sanguis recens, lac intus coagulatum, mel Heracleae in Ponto genitum. Metalla, gypsum cerussa, calx, auripigmentum, duo sandarachae genera, spuma argenti, adarce, plumbum, & quod argentum, vinum dicitur. E liquoribus domesticis, vinum abunde post balneas potum, aut passum, & frigida aqua similiter.

Cantharides. CAP. I.

Quibus datae sunt cantharides. signa eveniunt gravissima. Ab ore enim ad vesicam usque cuncta erodi sentiuntur: picem, aut simile quiddam cedriae respiciunt: dextra praecordia inflammantur, urinam agre reddunt, & subinde cum lotio sanguinem emittunt: strigmenta non secus atq; dysentericis, aluo deferuntur: fastidia urget: animo linquntur, oborta q; vertigine cecidit. Postremo mente abalienatur. Ergo antea quam tale nonnihil accidat, dato oleo, aut supradictorum aliquo, vomere cogantur. mox ubi vomitione plurima reiecerint halicam aut oryzam, tragum aut ptisanam cremor, aut decoctum malvae, aut
sem

seminis lini, aut fœni graci, aut radium althææ,
quam Latinus sermo ibiscum appellat, clystere
infundatur. Præterea nitrum eisdem dan-
dū, ex hydromelite, vt q̄ stomacho adhuc, aut in-
testinis adherent, eluendo excernantur, ac descē-
dāt. Quæ nisi sic discutiantur, ingesta in aluum
ex nitro aqua mulsa, vacuari debēt. Detur de-
inde vinum, aut passum, in quo pineoli nuclei,
aut cucumeris semina cōtrita sint, aut ex lacte,
aut mulsa, aut anserinus adeps in passo liquefa-
ct⁹. Inflāmata autē partes, hordei farina cū mul-
sa decocta perungantur. Ab initio admota cata-
plasmata nocent, quod citatus ab eis calor, illa-
psum virus ita remoratur, vt in principes se par-
tes insinuet: ipsa tamē interiecto tempore, mole-
stissimis inflūmationibus opitulantur, vt pote
quæ dolores & permulceāt, & leniant. Tū vbi
corpus calfaciente oleo inunctū fuerit, in solium
descendere oportet, ac lauare, vt per cutem sum-
mam, quæ corpori noxia inhaerunt, etiā excer-
nātur. Et deiectiones multifariā molieri opor-
tet. ne affectus infigatur, & stabilitatem ca-
peßsat. Gallinaceis carnibus, & hadinis, aut suis-
lis catulis, maximè pinguib⁹, et tenerrimis, ac cū
lini semine coctis, vesci debent: siquidē aluū ciēt,
atque venenorum acrimonias hebetant. Vinū
dulce liberali⁹ ebibatur. Prodest thuris cortex,
& Samia terra, quæ aster appellatur, si qua-
terne singulorum drachmæ cum passo suman-

tur. item palegium ex aqua tritum: irinū, aut rosaceum, cum ruta decocto: recentes vitis ramuli, cū passō detriti. Longè omnium potentissimè antidota auxiliantur, cū aqua mulsā drachmī quatuor pota.

Pinorum erucæ. CAP. II.

Is qui erucas pinorum hauserint, illico dolor in ore & palato exoritur: vehemens alui, lingua, ac stomachi, inflammatio torquet: intestina dolor excruciat, ita vt pruriginem sentire videantur: corpus totum exæstuat: fastidium urget. Quibus est succurendum remedijs, quæ donatis cantharidibus dantur. Peculiariter tamē pro simplici oleo & irino, melinū, quod è cotione pomis & oleo temperatur, accipiemus.

Buprestis. CAP. III.

Qui buprestin biberunt, non dissimile nitro virus sapiūt: stomachi, ventriq; vehemēs dolor insequitur: tam venter quàm stomachus murū in modū, vt in aqua inter cutem, diffusus, inturgescit. vniversa corporis facies contenditur, vrina suprimitur. Quibus eadem, quæ potis cantharidibus auxiliantur. Priuatim post vomitus, & vacuationes, quas clysteribus molimur, arida ficus profunt: item earum decoctum, ex vino. Vbi verò iam serè pericula inclinātur, Thebaicarū palmularū cibo, aut earundem tritarum in mulsō, aut lactis potu, iuuantur. Pyrorū etiānum omne genus esse, & lac huma-

num bibere, conuenit.

Salamandra. CAP. IIII.

SI salamandram hauserunt, lingua inflam-
matio consequitur: mens, & sermo praepedi-
tur: tremor cum torpore, aut horrore quodam, ac
exultatione accedit: partes nonnullae corporis liu-
ribus circumquaque sugillatur: saepeq; diutius
immorante veneno, putrescentes defluunt. Quib;
praeftabimus cuncta, quae potis caspbaridibus.
Peculiariora uero remedia resina pinus, aut gal-
banum ex melle linctum, & auge decoctum,
quo nuclei pinei conterantur: vltica quoque fo-
lia, cum lilij & oleo decocta. Prosunt etiam
oua testudinis marinae, aut terrestri cocta: item
ranarum ius, cum quibus eryngij radix inie-
cta sit.

Ephemerum. CAP. V.

Sympto ephemero, quod aliqui Colchico, aut
sylvestrem bulbum appellant, pruritus in to-
to corpore excitatur, non secus atque ijs, qui vr-
tica, aut scilla laceffuntur: interna rosionem sen-
tiunt: stomachus cum ingenti gauintate exa-
stuat. ceterum inualecente morbo, cruor stri-
gmentis admixtus, per aluum exigitur. Quibus,
ut ijs qui salamandram hauserunt, vomitione
aut clysteribus auxiliari conueniet: sed antea qua
venenum inualescat, dandum est decoctum fron-
dium quercus, aut gladii aut malicorij: lac bi-
bere predest, in quo serpyllum sit decoctum:

item succum sanguinalis herbae, aut ramorū vitis, aut rubi, aut medullae recētis ferulae, aut myrticum vino. Bacca autem myrti tuta tritaq; & aqua macerata, vt liquor inde sumatur, opem ferunt. Media castanearum tunicula, similem effectum praebet, si cruda in aliquo supradictorū succo sumptitetur: origanum quoque cum lixiuio epotum. eximiè iuuantur asinini lactis, aut bubuli calidi potu, etiam si in ore continuāt: ita vt quibus copia lactis huius adsit, nō aliud desideretur.

Dorycnium. CAP. VI.

DOrycnion, quod aliqui manicon solanum appellant epotum, lactis sapore in gustu refert: continentibus singultus ciet, humor linguam vexat, sanguis cōfertim reijcitur: mucosa quadā perinde quasi dysentericis, aluo egeruntur. Itaque antequā aliquid ex ijs eueniat, auxilio sunt antedicta, vomitus, clyster, & quaecunq; potū venenū expellere possunt. Priuatim ijs opitulatur, aqua mulsa, lac caprilū, aut asininum, dulce vinum, quod tepidum cum aniso bibatur, amygdala amara, gallinacea pectora decocta. quinetiam conchilia omnia, tam cruda quā tosta esse, salutare est. cōueniunt & locustae marinae, et gāmari, et pota eorundē iuscula.

Aconitum. CAP. VII.

AConitum statim in lingua inter bibendū, cum adstrictione quadā dulcescit et subin

de, potissimum cū exurgere conantur, vertigines offundit: lacrymas ciet: gravitatem pectori, & precordijs adfert, simulq; crebri spiritus deflantur. Quare venenum vomitione abigi, aut clystere per aluum egeri opus est. utimur inter propinandum, origano, ruta, marrubio, vel absinthij decocto, cū vino absinthie, vel semperuino, vel abrotono, vel chamelæa, aut aiuga. Prodest etiāmnū opobalsami drachma, cū melle aut lacte, cum castorio, pipere, & ruta, æquis ponderibus ex vino. coagulum hædi, leporis, aut hinnuli cum aceto: ferri quoque stercus, item vinū in quo aurū, ferrū, argentūmve cādens restinguatur, potum: liciniāq; cum gallina, & vino decocta, aut carniū bubularum præpinguium iura, cum vino sumpta. Fertur & aiuga priuatim ipsi obuenire.

Mel heraclia. CAP. VIII.

Melin Heraclia Ponti, vbi aconitum gigni solet, inuenitur, quod qui edunt, bibūntve non secus affligantur, quā qui aconitum ebiberūt. Iis eadem, qua poto aconito conueniūt. Adiuuātur in primis continuo vini mulsi potu, cui ruta folia sint adiecta.

Coriandrum. CAP. IX.

Coriandrum ob odorem latere non potest. Cepotum autem vocem exasperat: insaniā adfert à temulentijs non abhorrentē. qui sumpserunt, pudenda dictu blaterant, totiusq; cor-

poris odore, venenū fatentur. Quibus post vomitionem irino oleo concitata, vt retulimus, merum & per sese, & ex absinthio potum auxiliatur: item oleum: nec secus oua in eodem exinanita, si liquefacta in muria sorbeantur: & epota muria, & ius salsum ex gallina, & anser: passum quoque cum lixivia sumptum.

Psyllium. CAP. X.

Psyllion epotum, corpori toti frigus, & torporem cum exolutione, & calore quodam adfert, ita vt animum despondeat. Cui omnia, quæ exhausto coriano auxiliantur.

Cicuta. CAP. XI.

Cicuta pota vertiginem excitat, oculiq; caliginem offundit, ita vt ne minimū ceratur: singultus ciet, mentem turbat, extremi artus gelantur: denique conuulsi, suppresso arteria spiritu, strāgulātur. Quare inter initia, vt in reliquis, cicutā vomitu, exentiemus: postmodū deuotionem moliemur, vt quod ad intestina prolapsum sit, excernamus: tū demū in meratā potionem, quæ maximo est auxilio, deueniemus. repetendum per intervalla, in quibus proderit, lac asininum, aut bubulū potui datū, vt absinthiū cū pipere & vino, castorio, ruta, mentha cū vino, aut amomi, cardamomi, aut styracis uncia, aut piperis, cū semine vrtica et vino, aut laurifolia. Item laser ex oleo, & passo, & passum per sese largius potum proficit.

TAXUS. CAP. XII.

SMilax, à quibusdā tithymalū, à Latinis taxus appellatur. frigus vniuerso corpori, strāgulatus, & celerē interitū insert. Cui eadēq; cicuta cōueniunt. Carpassi succus. CAP. XIII.

EPotus carpassi succus saporem, citamq; stragulationem adducit. Adiuuantur autem qui hauserunt, epota cicuta remedijs.

Sardonio herba. CAP. XIII.

Sardonio ranunculi herba generi assignatur, qua rescentibus mentem adimit, & quadam neruorum distentione labia in risum contrahit, vt risus speciem praebeant. à qua quidem affectione, de Sardonio risu adagium in vulgus infausto ominis manauit. Post vomitum peculiariter conuenit aqua mulsa & lac, liberaliūse pota: irrigatio, perunctioq; à pinguibus medicamentis, totū corpus excalfacientibus: in callidam aquam, oleumq; descendant. sed tum multum perfricare, & iungere expedit. & in summa, curam omnem, qua conuulsioni neruorum adhibetur, exequi oportet.

Hyoſcyamus. CAP. XV.

Hyoſcyamum potum, aut comesum, simile Hebrjs ab alienatione mouet: sed facile medicamenti cedit. Auxiliatur aqua mulsa copiose data, lacq; praesertim asininum: si id desideratur, caprillum, vel bubulum, vel aridarum ficuū decoctum. Faciunt ad id etiam nuclei pinei,

aut cucumis semen ex passo sumptum, et vinum falsum, cum adipe suilla recenti, passoq; itidem vrtica semen, aut nitrum ex aqua, & intubus erraticus, & sinapis, et nasturtium, radix, cepa, & allium: & hac singula cum vino sumantur. Postea sinendi quiescere, quemadmodū qui vinū biberunt, vt excoquant.

Mandragora. CAP. XVI.

M Andragora si bibatur, confestim sopor insequitur, exolutio, ac vehemens veternus, nihil temerè distans à lethargo. Cui, antequàm aliquid ex ijs accidat, vomitus & aqua mulsā proderit: postea nitrum, & absinthium, ex vino dulci, aut passo sumantur. caput rosaceo, & aceto perfundatur. Proficit excitatio, et motus corporis, & olphatus eupatori, & piperis, sinapis, castori, & ruta, tritorum in aceto: & liquida picis, & odor è lucernarum exustione, & ex tinctu. Quod si agrè ijs reuocetur, sternutamenta mouere, alijsq; cōmunib⁹ auxilijs vti conueniet.

Meconium. CAP. XVII.

E Poto papaueris succo, quem meconiō vocant, consequitur veternus cum perfrictione, & pruritu vehementi, ita vt saepe inualecente veneno, tanta erumpat prurigo, vt hominem excitet: corpus id medicamentum olet. Post citatam oleo vomitionē, acres clysteres auxiliantur, acetumq; mulsum cum sale potum, aut mel cum rosaceo calido: merum cum absinthio aut cinnamo

mo copiosum, aut calidum per sese acetum: nitrū ex aqua, & origanum cum lixiua aut passo: & ruta sylvestris semen cum pipere, vino, & panace: piperq; cum castorio, & aceto mulso, vel cū satureia aut origani decocto cum vino. Hi olfactilibus excitandi, & ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foveantur. Post lauacrū prodest iuriū pinguium vsus, cū vino, aut passo: medulla etiam ex oleo pota.

Papauer corniculatum. CAP. XVIII.

QUod corniculatum papauer appellant, et potu, & cibo eadem inferre cōsuevit, quæ papaueris succus: nec alijs expugnatur auxilijs.

Pharicum. CAP. XIX.

QUod pharicū vocāt, sapore sylvestre nardū imitatur. Resolutionē neruorū potum adfert, conuulsione & delirio. Oportet autē post vacationes vinum absinthiten potui dare, cum cinnamomo, aut myrrha, aut nardo gallico, qđ serinen aliqui vocauerunt: aut spice nardi duas drachmas, & myrrhæ totidem obolos, cum passo: aut irim cum croco ex vino: dera sumq; caput illinire hordeacea farina cū aceto, et trita ruta.

Toxicum. CAP. XX.

TOxicum ex eo nominari videtur, quod barbarorū sagittæ eo illinebantur. Qui biberint, labiorum & linguae inflammationes torquentur. Incoercitus furor varias ijs imagines obue-

obuersat. quare vix medicina locus est, raroq;
 qui hauserint, euadēt. Vinculis ergo cohibēdi, aut
 vinū dulce cum rosaceo bibere, & remouere cogā
 tur: rapi semen bibendum cum vino. Priuatim
 ijs conuenit quinquesolij radix, & hircinus san
 guis, aut capillus, eodē modo sumptus: roboris,
 fagi, aut illucis cortex cū lacte tritus: malaq; coto
 nea trita esse, aut cū pulegio, et aqua bibere cōue
 niet: amomū & balsami semē ex vino. Sed qui
 periculis defuncti sunt, diu lecticis decūbūt: et v-
 bi surrexere, stupidi reliquum vitæ tempus de-
 gunt.

Ixia. CAP. XXI.

IXia quæ vlophonon appellatur: inter potan
 dum aliquid ocimo simile gustu & odore re-
 dolet: vehementem linguæ inflammationem exci-
 tat: mentem mouet: omnes excrementorum exi-
 tus suppressit: strepitum cū animi deliquio ciet:
 ijsq; intestina latrant, nec egeritur quicquam.
 Post vomitionem aluūmque resolutam: auxiliū
 præstat aqua, in qua absinthium maduerit, ex
 vino largiore, aut aceto mulso pota: rutæque syl-
 uestris semen, aut laseris radix. item tragoriga-
 ni decoctum, cum aliquo supradictorum, aut la-
 cte, aut r-sina terebinthina, aut nardo, aut casto-
 rio, aut laserpitio, quorum singuli oboli conue-
 niunt, quin & nuces iuglandes ex vino cum resi-
 na, castorio, & ruta trita, ita vt singula drach-
 ma pōdus æquent. Itidem chamelæ, aut iapsia,
 aut

aut absint hij succi scilicet cum aqua mulsā, & acetum calidum potum.

Cerussa. CAP. XXII.

Cerussa suo colore proditur: sumpta enim, mox palatum, gingiua, lingua et commissura dentium: candore quodam insciuntur: singultus, tussim, ac lingua ariditatem excitat: quæ extrema frigescent, mens lubet, membra torpescunt. Quibus dare conuenit aquam mulsam, aut ficum, aut malum decoctum, aut lac calidum aut sesamam ex vino tritam, vel lixiuam ex salmentis factam, amaracinum oleum, aut urinum, persicorum ossa cum hordei decocto: columbina oua cum thure, aut hordei decocto, aut prunis, aut gummi, quod vlmus plorauit: aut humor, quem vlmæ folia reddiderunt, cum tepida aqua sed tamen quoque vomant. Conuenit etiam tapsia succus, aut scammonia, cum aqua mulsā potus.

Fungi. CAP. XXIII.

Fungorum alij genere, alij copia lædunt: omnes tamen strangulatus suspendio similes committant. Quibus confestim succurrendum: communiter ex oleo vomere cogendi: mirifice iuuat lixiua ex sarmentis, aut pyrastris surculis, epota cum sale, posca, & nitro. fructus, aut folia pyrastricum singulis decocta, strangulantem illam vim auferunt. esitataque eisdem auxiliantur. Aduersus fungos gallinacea oua cum posca proficiunt, adiecta aristolochia drachma: item absinthium

cum

cum vino melleq; sumptum, & ex aqua: potum
 apiastrum ex nitro: panacis radix & semen in
 vino: sex vini cremata, cum aqua: atramenti
 sutorium ex aceto: radix, vel sinapis, aut nastur-
 tium esu profunt.

Gypsum. CAP. XXIIII.

L Apidescens gypsum strangulationē creat.
 Quare eadem proferenda sunt, quæ man-
 sis fungis, auxilia: & ad hæc malvæ decoctum,
 quod etiam olei vicem pensat: utpote cum pin-
 gue sit, euomēdo lubricas vias, & faciles reddit,
 deradique corpora non sinit. quod ubi duratur
 in lapidem, gypsum efficit. Quinetiam prodest
 oleum ex aqua mulsā, aut flicorum decocto: &
 lixiuia è ficulneo cinere, aut sarmentis facta, cum
 vino copiosiore pota: & origanum, aut thymū
 cum lixiuia, aut aceto, aut passo: hiq; decocto
 malvæ praluendi.

Sanguis taurinus. CAP. XXV.

T Auri recens iugulati sanguis epotus, spiran-
 di difficultatem, strangulatumq; concitat:
 faucium, tonsillarumq; meatibus cum nervorum
 distentione præcludit: lingua rubescit: dentes in-
 ficiuntur, & quædā concreti sanguinis vestigia,
 inter eorum commissuras restant. Quare vom-
 itum vitabimus, sanguinis enim globi attractu
 illo in sublime relati, magis gulæ inculcantur.
 Dari ergo opus est quæ concretum sanguinem
 discutiant, & alium subducant. Grossi lacteo succo
 turgenti

turgentes ex posca, & nitrum per sese, auxiliatur: nec secus coagulum omne cum aceto, & laserpitij radice, aut lascere: itidē & brassica semen, & è cinere ficulneo lixivia: conyzæ folia cum pipere, & rubi succus ex aceto, aliis resoluenda. Is qui seruatur, stercorosa, & fluida per sedem egeri cōsueuerunt. Stomachum, aluumq; hordeacea farina ex aqua mulsā perungere oportet.

Lac intus coagulatum.

CAP. XXVI.

Eos qui coagulatum lac hauserunt, frequens illico strangulatio inuadit, quod in globulos quosdam lac coalescat. Quibus iuuandis pro antidoto, coagulum ex aceto damus, & bibere sapius cogimus. Damus & calamintha folia arida, item succum: aut laserpitij radicem, aut laser cū posca: thymumq; ex vino, & cū luto suo lixuiam. Sed nulla falsilago obijciatur: quoniā magis lac coiret, & in caseum densaretur. Neque illos vomere conuenit: siquidem concretum lac sese in gulæ angustia insinuans, strangulat.

Argenti spuma. CAP. XXVII.

Spuma argenti pota stomacho, ventri, & intestinis grauitatē cum magnis torminibus adfert, & nonnunquam podere suo intestina vulnerat, vrinamq; supprimit: corpus intumet, plumbeamq; deformitatem concipit. Quibus subuenit secundum vomitionem, potum syluestris hormini semen, myrrha drachma octo. ab-

L smith

finthium, hyssopum, apij semen, aut piper, aut ligustri flos ex vino: aridum palumbis finum, cum uardo & vino.

Argentum uiuum. CAP. XXVIII.

Argentum uiuum potum eadem qua spiritus ma argenti infert, eidemque; utendum auxilijs. Lac copiose potum auxiliari constat: sed postea euomant, qui hauserunt.

Calx, sandaracha, auripigmentum.

CAP. XXIX.

Calx, sandaracha, & auripigmentum, pota aluum, & intestina cum relementi exofione excruciant. Præbenda cuncta, qua suo admistu illorum acrimoniam hebetant, ac soluant, & facilem lubricamque; aluum reddunt, cuiusmodi ibisci, & malua succus est: natura enim utriusque per lubrica. Dandum decoctum seminis lini, vel semen tragi herba, vel orixa, lacque; cum aqua mulsæ copiosum, iura pingua, & boni succi.

Lepus marinus. CAP. XXX.

Qui leporem marinum biberunt, piscium virus olent: procedente tempore, aluus dolore afficitur, & urina sistitur: & si quando eam reddere contingat, purpureum calorem referet. omne piscis genus aduersantur, & odio habent: foetido, ac graui sudore manant: biliosus vomitus, interdum sanguini promiscuus, subsequitur. His dandum lac asininum, vel passum continuè aut radices malua foliorumque; decoctum, aut tri-

ta cyclamini radix cum vino, aut veratri nigri, aut scammonij succi drachma, cum aqua mulsa, puniciq; mali acinis: Cedria contrita cū vino efficax est: anserinus sanguis, vt tepebit, potus. Sed cū pisces omnes respuant, aspernenturq; solis fluuia libibus cancris vesci possunt, bibūtq; eos admisto vino, aiutiq; ab his percoquant. cumq; appetere & commesse pisces cœperint, suæ salutis indicium habent.

Rubeta, & palustris rana.

CAP. XXXI.

Rubeta, aut rana palustris assumpta tumores ciet: palor corpus vehementer decolorat, vt planè buxum spectetur, spirandi difficultas torquet: & grauis halitus oris, singultusq; inuita interdum genitura profusio consequitur. Adiuvantur secundū vomitionem multò meri potu, & arundinis radicis binis drachmis, aut cyperi cotidē. Breuiter, cogendi sunt vt vehementi ambulationi & cursui se credant, ob torporem, quo corripuntur, quin etiam quotidie lauandi sunt.

Hirudo. CAP. XXXII.

Deوراتæ cum aqua hirudines, si orī ventriculi adhiarent, tractatione partium, nōnullam succionis imaginem præbent: eo enim argumento hausta hirudo deprehenditur. Has muria sorbitione excutit, et Cyrenacius succus, aut laſerpiij folia, aut betæ, cū aceto, aut pota nini.

glebula, cum posca. nitrum ex aqua gargarizatur, aut atramentum sutorium aceto dilutū. Si faucibus hereant, in aquam calidam ingressi, aqua frigida ore contineatur, & ad eam hirudines exilient.

Veratrum album, thapsia, elaterium, agaricum nigrum.

CAP. XXXIII.

Prouidendum etiam ijs, quæ etsi ferendi auxilij gratia tradantur: non minora tamē ceteris venenis pericula sapius adferunt. Qualia sunt albū veratrum, thapsia. elaterium. agaricum nigrum: siquidem ea strangulatus cōcitāt, aut immodicas deiectiones mouent. Quibus ea medentur, quæ in fungorum mentione, & similibus retulimus. Nimios autem deiectionum impetus, medicamentis, quæ excrementa supprimūt. coercebimus. Neq; negligenda quæ parum quidem nocere videntur, interim verò vitam in discrimina agunt. Quo in numero sunt sylvestris ruta: gith, nouæ glacies, pappi recentes: flores autem sunt eius spina quæ cactos dicitur. Eos qui sumpserint, sola vomitio recreat.

Domestica nobis. CAP. XXXIIII.

Aqua frigida abunde pota, aut meracum vinum liberaliū epotum, aut passum, præsertim à balneo, aut cursu, aut vehementi exercitatione, strangulatus, & dolores infert. In quibus sanguinis missio protinus, & vacuatio, immunē

tia

tia solvunt pericula. Sed de notis veneficiorum, ac remedijs, & cauendi modo, haecenus dicta sint. Subiungeremus etiam antidota necessaria, quae praeclare auxiliantur; quibus vimur, quae le Mithridatium est praesertim, & quod sanguine, et quod scinco temperatur. Verum quoniam alijs in locis diligentissimè scripta sunt, hic ab eorum descriptione super sedemus.

De venenatis animalib.

Venenata. CAP. XXXV.

DE bestijs, quae virus eiaculantur, & exitialibus venenis, ideo adscribere aggredimur, ut tota curationis remediorumq; ratio ad umbilicum perducatur. Siquidem pars haec non minus quam cetera alia, necessaria est ijs, qui artem medicam exercent, utpote cum adminiculo eorum, quae inibi trahuntur, doloribus, periculis, & cruciatibus, plurimisq; alijs malis homines liberari conveniat. Haec autem in summa fastigia duo, sicuti ab initio relatū est, distribuitur. Nam qui de feris virus inspuentibus sermo disse-rit, theriacus dici solet: qui verò de amolientidis veneficijs, Alexipharmacus: quo prius tradito, simul quae sequi signa consueverunt, praemonstrabimus: tum quae nonnulli auxilij ferunt. Omnia autem in promptu, & ad manum habere arti-

ficem oportet, propter urgentem sapientum numero necessitatem. Siquidem pauca è venenis & virulentis animantibus, tarda & grassantia sensim pericula cient, ita vt dilationem admittant: pleraq; verò presentaneam perniciem afferunt. Minimum autem partim malè alijs cogitantes, ingenta prauitate maleficium ita temperant, vt spatium curanti liberum non relinquunt: partim sceleris admisci conscientia, aut tristi aliquo euentu oppressi, hausto. s. fonte veneno, mortem sibi consciscere conantur. qui postea deprehensi, aut resipientes, & vita cupidi, presentaneam opem poscunt. Non desunt qui hostiles sagittas illinentes, aut fontes aquasq; puteanas hac labe polluētes, certā & ineuitabilē aduersarijs perniciē molliuntur. In quibus ipsis etsi maleficiū nō subito, sed aliquātō post grassari natura sua comparatū est: tamen nisi primo quoque tēpore coercatur, & remedijs subinde, excipiat, frustra tandem succurritur, occupati iā corporibus exitiali vi veneni. Proinde non vulgari industria diligentiaq; in ea re vtendum est, vt quod in alijs incommodis ars consuevit, in his quoque salutem mortalibus prabeat. Quin & apud priscos genus hoc vnum existimabatur esse erui partim, qua medicamentis pugnat: sed recēiores id ipsum discreuerunt, nominantes precautionē, & modū precautionē, salubris sanantiq; medium statuētes, parua et leui supramodum persuasione decip

decepti. Siquidem tres in humanis corporibus constitutiones esse contendunt. vnam, qua sani degimus: alteram, qua sinistra valetudine corpora laborant: tertiā, qua medium inter vtraque locum sibi vendicat. In qua positi, sanitatē specie mētuntur, facileq; in morbos, & pericula concidunt, ob vim corruptricem, qua corporibus nostris incombis: quemadmodū in ijs videre licet quos ex candescens rabie canis momorderit, necdum tamen aquam horrent: in ijs quoque qui cantharidas hauserunt, sed nondum vrinae tormento cruciantur. Tripartitō igitur artem digerī, tripliciq; corporis constitutioni meritō respondere tradūt. Salubrem partem esse volunt, qua sanitatem tuetur: praeualem, eandemq; prohibentem, qua obstat, quo minus in morbos incidunt: & sanantem, qua vitia discutiuntur.

Quibus ita responderi potest, quod primū ex ista ratiocinatione non tres corporis tantū, sed quatuor haberi constitutiones fatendum esset. quippe vt aliqui sunt, qui necdum morbo laborant, morbo tamen maximē ob impendentē causam sunt obnoxij: ita sunt, qui iā priore morbo defuncti, nōdum tamē secundae valetudini restituti sunt: id quod in ijs qui à morbo proximē sese recolligunt, cernere licet, qui virium recreationem & robur desiderant. Sed quemadmodum curandi ratio ad partem medicamentarium pertinet, ita praeualem eidem subijci par

est. Ad arcendas enim valetudines vehementibus
utimur auxilijs, altiore sacrificatu, vstionibus,
amputatione, derodentibus epithematu, potio-
nibus pernicipi occurrentibus, & plerisque alijs.
Verum enimvero sunt vsque eò rudes nonnulli,
vt ne remedia quidem appellēt, quæ morbos ar-
ceant. Cuius sententiæ inire rationē haud prom-
ptum est: etenim cum verbum ipsum, precau-
re, tum agendi modus, omnino auxiliarem reme-
diariamq; vim præ se ferunt. Mirum verò nisi
etiam sua illa distributione partium eos comple-
ctuntur, qui in pestilentis cœli statu morbo non-
dum correpti sunt: pesti tamen, propter obuer-
santes aëris occasionem, opportuni, & in morbus
proni redduntur. Dicere forsitan quis posset, sa-
lubris institutionis præcepta nō aliud esse, quàm
arcendorum morborum rationem: quippe cum
firma reddere corpora. & minus vitijs obnoxia
nitamur, vt inoffensa valetudine degant, nec
morbis conflictentur. Neque id silentio prætereun-
dum, quòd maximè præcipuum, & tanquā ca-
put rei est, non oportere medicinæ partiū distri-
butionem, totidem corporis constitutionibus re-
spondere, sed naturas singulorum suis notis seor-
sum scrutari, ac explorare, vt suis locis ostendi-
mus. Cum ijs igitur non pluribus agendū. Illud
magis adnotare cōuenit, affectus, qui à virulen-
tis animalibus, venenisq; contrahuntur, vocari
cacos, id est, quorum ratio minimè iniri potest.

Quin et ea, quæ eisdẽ auxiliãtur, nulli pariter sunt addicta causa. quapropter quæstionibus obseruatoriæ artis, & eius qua ratione fulciatur, annumerari solent. Neque prorsus verũ deprehenditur, affectus huiusmodi cacos esse. nam quod semper se protrahit, et nullum in quibusdam necessarijs vsum exhibet, haud facili coniectura colligi potest: etsi natura proprietate prorsus cacos affectus concedimus, qui ab exitialibus venenis, & animantibus, quæ virulento morsu sauiunt, contrahũtur. Nam quod ad opus nonnullum vsum præbet, datq; medendi occasionem, neque imperceptibile, neque cæcum, nullivæ causa obnoxium reputatur: sed magis ab ipso quis impulsus, demonstrationem se habere, & opinionem de abditorum cognitione confirmare poterit. Nam etsi sæpe minora sunt, quàm vt sensibus percipiantur, euidenter tamen ex ipsis inter se collatis deprehenduntur. Diocles autem in eo commẽtario, quem Plistarcho dicauit, satis modos perstrinxit, ad verbũ ita scribens. Nosse quis hoc potest cùm in alijs non paucis, tum in viperis, & scorpionibus, et reliquis id genus, secũ animo reputans, vt quamuis exiguo sint corpore, vixq; conspetui subijciantur, magnorum tamẽ discriminum ac dolorem causas inferũt: quorum nihil præter quandam corporis exiguitatem, vimq; præ cæteris animantibus datam illis, facile fuerit spectare. Quanta enim ea moles corpo-

vis est, quæ à scorpij ictu, & aliorum id genus venenatorum, quæ nos morsu conficiunt, attingitur? quorum aliqua vehementer cruciatus excitant, alia erodunt, & putredines cient, nec desunt quæ præsentaneam perniciem moliantur. Aut quantum est quod à phalangij morsu ingeritur, & uniuersum corpus excruciat? neque enim quæ magnitudinem ipsorum deprehendere posset, cum prorsus exigua mole constet. Ergo quod hæc ad affectus referantur, constitit inter omnes. Verum quod exactè deprehensum sit, vim quandam ipsis inesse mortiferam, quæ insinuata corporibus, molestiarum, quæ exoriuntur, nobis causa sit, in confesso est, & omnium consensu persuasum. Nec quisquam inuenietur usque adeo contentio- nis studio flagrans, qui aliunde exoriri molestias assueueret, quam à materia mortifera partem corporis attingente. Porro id erat, quod inter utilia artis opera in omni opere dicere oportuit, quam res opus hoc efficiat, ut nihil prorsus nos la- dat, incomprehensa communis causa quæ proprijs inest ratio: quandoquidem tum euidenter indicari possit, cum deprehensa est. Ideo Erasistratus empiricorum pertinaciam graui cauillatione incessans cæcis affectibus causas assignauit inficiatus his communem, & supremam morborum causam incomprehensibilem esse: & hæc in eo, quem de causis scripsit, commentario aptissime produ- cit, candido signatam lapillo. Nec ferendos eos

esse censuit, qui se dicant in quibusdam, vt in venenis, serpentium ictibus, et ceteris id genus trita medendi ratione contentos esse. neque satis fluctuam sibi obseruationē eam, quæ à causarum comprehensione separata est: primū enim genere comprehendere facile possunt. Quod autem sit lethifera vis, corporaq; permutans, ita vt perimat, ex ijs quæ per genus, nō per speciem vagatur, curationem indicat, quæ hac hebetare, & prorsus expugnare liceat. Cū verò subiungit, Ad aquam dulcē, & potui idoneā venit quis, & ante obseruationem ad vomitum, ad vulneris dilatationē, ad demorsa partis suculum, cucurbitulas adfixit, partem incidit, vrentia medicamenta, aut ea quæ vim eandē adipiscuntur. ad-mouit, postremò partē amputauit: secum reputauit medicamina, quæ per summā cutim ferre, & applicari solita, immissa ad intima perniciē repugnaret. Hæc itaque disseruit Erasistratus, veritati consentanea sunt, nec arti refragantur. Sed methodicos demirari licet, qui mortiferam vim corporibus illapsam negotiorum, quæ ipsa facessit, esse causam diffiteantur: verū rudiusculē nomini attendunt. Nam apud ipsos palam immissa vis φθοροποιός, id est mortifera, nominatur: φθοροποιός autem nullius officij alius esse potest, quam in causa. Aiunt hæc nomina, μάστιγος, & ἀνακαλύπτειν, esse reliquis omnibus similia, in quibus partes quadā dictionū non pro

virtus

virtute, sed nuda enuntiatione comprehenduntur. Enimvero quemadmodum in his vocibus μάροισιν, & ἀνακαλύπτειν, partes neque certos, neque principes retinent significatus: sic in hoc verbo φθοροποιεῖν, partes productionis gratia, non pro virtute coaluerunt. Hinc ad causarum differentias transeunt, affirmantque; causarum aliquas evidentes esse, quae dum aduersam valetudinem creant, separantur: cuiusmodi sunt frigus, labor, aestus, & similia. quasdam continentes, quae permanent, postquam morbum excitarunt, hoc est, quibus praesentibus, & effectus eorum adsunt: incrementibus, affectus augentur: decrescētibus, minuuntur: & cum desinunt, iidem finiuntur: quibus solis ac per se manentibus, effectus quoque ipsi manent. Talia quidem receptissima sunt causarum discrimina, quorum nulli phthoropæon subijci potest. Evidens enim causa non est, quoniam morbus ipse permanet, nec ipsa à corpore separatur. Nec continens causa dici potest, cum magna ex parte hic adsit: quemadmodum accidit ijs, qui à rabioso cane sunt demorsi. Quod si neque evidens causa, neque continens fuerit, neque per se, neque alterius consortio causa erit. Quod si à nulla causarum differentia phthoropæon deducere possumus, consequitur, ut neque causam esse fateamur. Quod autem asserunt, vocabula quaedam in se non habere partes rerum significatrices, sed nuda & simplici pronuntiatione fi-

ēla esse, fateri necesse est. Verūm non omnia, sed
per pauca talē nancisci cōditionem existimandū
est: neque enim ποιεῖν in hoc nomine φθοροποιόν,
perinde atque assumptitia profertur, sed longē
principem obtinet significationem. Quemadmo-
dum enim φθoγās, id est corruptionis, nomen mu-
tationē in peius significat, sic hoc verbum ποιεῖν
sumi debet, vt nihil amplius ex eo quod hanc di-
ctiōnem φθoγὰ secum habeat, declaret. neque
prorsus id significat, quod omnes palam audiūt,
& huic simile redditur, παυλὶ ἔχειν αἰψός. Si
dant à corruptione sanis fieri morbum, conce-
dūt utiq; vim in huiusmodi verbo ποιεῖν sub-
esse: siquidem aliquid est, quod corruptionem effi-
ciat. Omne autē quod aliquid efficit, ostenditur
per singulas, causas quæ corporibus subiiciūtur
idq; tam in lethalibus venenis, quàm in ijs quæ
corporibus ingeruntur. Verūm nonnihil subia-
cere causarum differentijs produnt. Quinetiam
aberrarunt, non exactam diuisionem assumen-
tes. Qui verò se dogmaticos profitentur, cau-
sam esse partim praparam, partim continen-
tem asserūt, vt inguinum vlcus, & inguinariā
febrim, & quæ effectui tum assistat, tum etiam
separetur, vt à fractis precipitatio. In summa
quoties quidpiam suapte natura causa fuerit,
nec vlla diuisione cōprehēditur, vitiosum est, ne-
que causa adscribitur, eorū quæ idem genus for-
uiūt. Sed quòd phthoropæon causa sit, nomen
ipsū

ipsum argumento est, & in ijs quæ contingunt, apertius ostēditur. Quid aliud causæ arbitrantur esse post impressum à serpētibus ictū, quàm ex animāte vim, & illapsum in corpora virum? Neque enim frigus, neque æstus, neque sectionē corporis, neque cruditatem, neque aliud quicquam simile causari possunt. Verūm quoniam causarū differētis gaudent, & aliquas continētes, alias euidentēs appellant, ipsis dicendis, utroque istorum modorum euidentem quidem causam esse, quod affectum præcedit, & quod corporis substantiam præoccupat: continētē verò, quod morbis præsentibus adest, quæ separata recedunt, quæ cum ipsa euenerant. Sed de ijs hæc lenus. Statuendum itaque mortiferā vim intrinsecus manifestissimam esse causam, ipsamq; principem facere scopum oportet. Et antequam ad ima decumbant morbi, varijs modis est certandum, donec vis tota corporibus excutiat. Modò enim renocari debet ea parte, qua pestis intrauerit: modo aliqua alia, præsertim principatū non obtinente, antè coërceatur, quàm altius irrepens viscera tangat: aut eius perniciēs eluatur, retundaturq; cum iam mēbratim peruagatur est. Itaque venena si hausta sint, crebris vomitionibus: si morsu impressa, scarificatione, affixis cucurbitulis, exuētu, carnis circumscriptione, nonnūquam amputatione extrema partis, euocantur. Retinentur verò infusione, & impositu
medic

medicamentorū acriū colibētur. hac simul utiq;
arcere virus, & eluere possunt. Restringuūtur,
& euincūtur meraciore potu, aut passo nulla a-
qua diluto, vel contrariorū esu, quæ acrimonia
sint prædita. Postremò deiectio alui, euocatus su-
dor, & alia quædam in commune, quæ mēbra-
tim demonstrabimus, auxiliātur. Verū enim-
uerò non lethiferam modò materiam, sed & ma-
gnitudinem, & tempus, pro scopo considerare
oportet. etenim ab ijs remedia quàm plurimū di-
scrimen capeſſunt. A magnitudine quidem, cūm
nonnulla ex venenis, & virosis animalibus pe-
ricula minantur: alia putredines altas, aut ex-
teriores excitant: alia vehementissimos dolores,
aut cecos cient: alia vix medicamenti cedūt, &
magis minūsve molestias excitant. Oportet an-
tem ea, quæ pericula ferunt, perniciosioribus au-
xilij expugnari: & minus infesta, mitioribus.
Quippe absurdū fuerit in grauioribus, segnio-
ribus medicamentis homines in discrimen addu-
cere: in minoribus verò, vehementium auxiliorū
iniuria corpus laceſſere. Finitio à temporibus in-
promptu est: hoc enim subito in pericula, & præ-
sentes molestias adducit: illud verò sensim, & di-
latis in diem longam, aut breuiorem producit.
Itaq; in acutis quidem cōfestim multa simul au-
xilia repræsentari oportet: reliquis, paulatim.
Hac quædam artis formula breuiter definita
sunt. Iam membratim rem prosequamur.

Signa

Signa rabiosi canis, & demor-
forum ab eo.

CAP. XXXVI.

DE rabiosi canis morſu ſermonem alijs præpoſuimus, quòd id animal domeſticum, ac frequens eſſe conſuevit, & in rabiem ſapius agitur, ac perit, ab eoq; cauere difficile. inde periculum ineuitabile hominẽ manet, niſi multis uitatur auxilijs. Canis plerumque flagrantiffimis æſtibus in rabiem efferatur: interdum quoties frigora inceſſerunt. Rabioſus autem potum & eſcam auerſatur: largam ſpumantemq; pituitam naribus, & ore proijcit: toruẽ & ſolito triſtius intuetur: in omnes paſſim ſine latratu irruit, & aquẽ ſeras hominẽſque, tam familiares, quàm ignotos mordet: nec protinus infeſtum quicquam infligit, niſi, vt vulnus, dolorem: exinde morbus ille, qui ab aquæ metu hydrophobicus Gratia eſt voce appellatus, cõtrahitur. Euenit autem cum diſtentione neruorum, totiusq; corporis rubore, præſertim faciei, cum ſudore, & languore quodã. Aliqui auræ ſplendorem fugiunt: alij ſine vlla doloris intercapidine vexantur. Sunt etiam qui canum more latratus adant, & obuiam factos morſu adoriuntur, ac mordendo ſimili vitio labefactant. Proinde ex ijs, qui hoc vitium ſenſerint, neminem ſeruatum vidimus, niſi forſitan ex hiſtoria vnum aut alterum euafiſſe audiamus. ſiqui-

dem Eudemus superasse quendam affirmat. Themisonem aliqui demorsum in hunc furorem incidisse, & euasisse fatentur. Alij ipsum cū amico aquā expaue senti morem gereret, & officium exhiberet, quadam naturarū concordia, si milem contraxisse affectum: sed post multos tandem cruciatus seruatum extitisse. Molestissimū itaque genus morbi, à quo multos, ante aquam ipsum experirentur, vindicauimus, & complures ab alijs medicis seruatos nouimus.

Remedia demorforum à cane rabioso.

CAP. XXXVII.

Ratio medēdi duplex. vna communis, quæ uiendum in omnes morsus, quos virulentæ animantes impræsserunt: alia peculiaris priuataq; , eorū duntaxat quos rabiosi canes mororderint: quæ nonnullis quidē summā opē ferre consuevit: alijs verò inutilis, maximè qui ex multo iam tempore ictum acceperūt. Quæ ad hęc pertinent, primū exponemus, deinde cursum perstringemus, quæ ad communem medēdi rationem pertinent. Cancros itaque fluuiatiles in sarmentis albæ vitis cremare oportet, & cinerem eorū, quā minutissimè tritum habere reconditum: ut dem gentiana radicem tusam, cribratamq; reponere. Quoties autem canis rabio-

sus morsum intulerit, in quaternos chyathos
 meraci vini, bina cineris cancrorum coeliaria,
 vnumq; gentiane conijciatur: hac in polëa di-
 lutioris modū subacta, quatrinduo bibatur. In-
 ter principia medicamentū hoc modo detur. At-
 quisi ab illato morsu bini ternive dies fluxe-
 rint, curationē asperabimur à triplicato pōde-
 re, supra id quod ab initio retulimus. Optimum
 hoc aduersus rabioſorū morsus auxiliū, quod et
 plerisq; vnum satiſfecit, eoq; cū fiducia vti licet.
 Sed vt alijs etiā vnum auxilijs cōtra ineuita-
 bile periculū muniamur, nihil ceteris vti prohi-
 bet. Satiū autē multo fuerit, etiā si in vanū reci-
 dat, medicamentorum in humanos tolerare cru-
 ciatus, quā per inertiam, ac desidiam in discri-
 men adduci. Nec ita in demorsis à rabioso ani-
 māū maiora vulnera vereri oportet, vti mino-
 ra, et vlcusculis cutis similia: quippe maiori vul-
 nere confertim copiosus sanguis emanans, potest
 nonnihil virulenti liquoris exhaurire: quod in
 minoribus non accidit, quā à maioribus abſce-
 dentes carnes hinc auferre, & labia acie scalpel-
 li circumscribere, & prehensam hamulo aut vul-
 ſela carnē amputare oportet. In vtiſq; circun-
 ſtantijs loca altioribus vlcusculis ſcanſicanda, vt
 copioſior ſanguinis vacuatio arceat, ne venenū
 membratim inſinuetur. Cucurbitula cum multa
 ſ. amma agglutinata id iuuamenti praſtant, vt
 veneni viſ extrahatur.

Vstio demorsorum à cane rabioso.

CAP. XXXVIII.

Contra virulētos ic̃t⁹, vstio expeditissimū est auxiliū, vtpote cū ignis cetera viribus præstet, simul quòd virus domet, et ferrī penitus nō patiatur: simul quòd pars ignē experta, postea non vulgare fundamētum curatione futura prabeat manēte diutius exulceratione. Animaduertendū ex eo tēpore, cū crusta decidēt, ne vlceris ora coalescant, & cicatrice induantur, sed si fieri potest ad multū, idq; præstitutum tempus, vlcerationes, & sordidas adhuc & inflammationē minantes prorogari conuenit. Quod inditum. ijs falsamentum optimè præstabit, & syneestre allii detritum, itē cepa, succūs ve, præsertim Cyrenaicus, aut qui Medicus, aut Parthicus appellatur. Tritici grana tā māsa, quā non māsa imponātur: siquidem subacta pistāve à perfusione vulnera dilatant. Sunt qui à mandentū ieiunio, sibi aliquid asciscere arbitrentur quod suapte natura resistat: verū id, certū nō est ceterū tempestiuus eorum vsus minimè est cōtemnendus. Si verò, quod per sepe accidit, ante dies præfixitos cicatrices coirēt, cōmitterenturq; manū postulabūt: nanq; eas diducere, carnemq; scalpello circinare, aut iterū murrere expediet. Vbi verò propositum tempus præterijt, vlcus ad cicatricem ducendum, & emplastro, quod è salibus conficitur, locus comprehendendus, nec

multò, pòst sinapismo vtendum.

Ratio victus in morfu rabiosi
canis. CAP. XXXIX.

QUæ ad partem istam pertinent præsidia, ita se habent. Caterùm victus rationē ex ijs, quæ veneno aduersantur, coniectura quadā colligere oportet, simul vt veneni vires hibeat restringuatq; simul vt arceat, quò minus ad intima perniciēs illabatur. Etenim assumpta perniosarum viriū penetrationi resistūt. Quorum utrūque præstare potest vini meracioris, passi, & lactis potus, quippe qui hæc omnia capiūt ad curam, nonnihil veneno obijciunt, quòd omnem eius acrimoniam obtundat. Simili modo alliorū, porrorum, ceparumq; cibis: quòd ea difficulter conficiantur, vixq; oboleantur. Nam multos dies huius cibi qualitates remanent, quo tempore nec euincuntur, nec permutantur à mortifera vi, sed cōtrarijs illa vis expugnatur. Cui rei antidoterum vsus accommodatur, & theriaces. Mithridatq; & eius quod eupatorio temperatur, denique omniū quæ magnam aromatum partem sibi vendicant. quippe aromata omnia viribus & substantijs agrè permutātur: quare in corporibus euincunt. Victus ratio hoc modo se habet. Nossē conuenit, pauorē aqua non stato, desinitoq; tempore exoriri: plurimum tamen ad quadragesimū vsque diem neglectis disferri consuevit: pòst semestre etiam nonnullos in-

tradit: quendam post annū aquam horruisse cō-
stat. quæ nobis visu comperta fuere. Narrant et
aliquos post septennium aqua metu fuisse
tentatos. Inter principia demorforum à cane ra-
bioſa curandi ratio talis eſt. Verū enim uero ſi
ea qua retulimus auxilia, primis diebus præter
miſſa fuerint, nec ſcalpro carnem circinare. nec
uſtionem experiri operæpretium eſt, non enim
quod pertransijt, ſatis euocare poſſent. Nul-
la utique iſtius rei occaſio aut utilitas, ſed in caſ-
ſum corpora doloribus ſternentur. Alter verò cu-
rationis modus accedat. Deiectione magnum præ-
bet iuuamentum, utpote cū mouendo, corporis
habitum tranſmutet: & quæ colocynthidem re-
cipit hiera. item lac ſchiſtum, quod ſimul deie-
ctionem moueat, & venenum domare poſſit. ci-
bi acres, & meraculi potu, quibus vis veneni ve-
hementer retunditur, quotidie ſumi debent. Ca-
terū ſubdoreſ ante cibos, & poſt etiam ciendi.
Dropaciſmi ſinapiſmiq; alternatim per corpus
totum adiſcendi. Sed longè omnium efficacissi-
mum auxilium helleboriſmus cognoscitur: quo
cum fiducia non ſemel atque iterum, ſed fre-
quentius ante quadrageſimum diem, vel poſt
hoc tēpus uti licet. Tantam enim vehementiam
hoc auxilium habere fertur, ut quidam qui
iam aquæ metum ſentirent, ſumpto helleboro,
ſimul ac primū morbi impetū experirētur. fue-
rint ſeruati. nā et iam vitio tentatos nemo vn-

quam seruare potest. Itaque primam curam contra rabiosi canis morsus breui sermone exposuimus. iam ad alia, quæ venenatis morfibz sanire consueuerunt, transeundum. Notas vno contextu, deinde communem medendi modum, qui omnibus conuenire possit, explicabimus. Cursum deinceps subiungemus ea, quæ sua proprietate nonnullis auxilium præstare possunt. Postremò subnectentur etiam venenata, quæ nullis cedunt remedijs.

Communis curatio in omnes ictus virulentos. CAP. XL.

ADuersus quidẽ omnẽ animalis ictũ, quod venenum vibrat, oris suctio conuenit. Surgentem verò oportet ieiunum non esse, sed cibum sumpsisse, & vino os abluisse: postea exiguum olei in ore continens plagam exugat. Locus ipse spongia fouendus, deinde sacrificandus: sed vlcuscula altius imprimere æquedit, quò virrosa materies profundo euocetur. Circinatio autem carnis, & sectio, scarificatione longè potentius opitulatur: nanq; ad ijs duo peculiaris præsidia sunt, vnũ quod virus è loco tollitur: alterũ, quòd eius veneni pars, quæ ad interiora grassatur, cũ multo copiosoq; sanguine excernitur. Quod si locus sectionem non admittat, cucurbitula cũ largiori flamma adfigenda sunt. Sed id de vstione supra in rabiosorum morsu disseruimus. Si verò icta pars, utpote extrema, eam sectionem

Elionem cōmodè nō respiciat, praesertim in omni-
 bus serpentium ictibus, vt aspidis, cerastæ, simi-
 lumq; procul dubio amputanda est. Conue-
 nientiora suprā dictis auxilia sunt, quæ epithe-
 mata vocāt. Imponatur sarmētitiis cinis, aut fi-
 culnus, cū lixinio stillatitio subactus, garo, &
 acrisalsamento: porri, cepæ, & alia modo minu-
 tissimè contrita illinuntur, modò cremata vul-
 neribus inijciuntur. Quinetiam dissecti gallina-
 rum pulli, cū maximè tepent, percusso loco ap-
 plicentur. Nec desunt qui hisce tanquā discordia
 quadam naturali pugnātibus vtātur: verū hu-
 ius rationē inire facillimū fuerit. Gallinæ enim
 calida natura pradiæ sunt, argumēto, quod de-
 voratum insigne virus cōficiunt, & aridissima
 quæque semina cōsumāt: item nonnunquā are-
 nas lapillosq; ingluvie sua deuoratos, dissolunt.
 Itaque animantis admoti calore adiutus spiri-
 tus, ab icta parte impetum capeffens exiliensq;
 secū venenum exigit. Nec me fugit, quid in Ae-
 gypto fieri soleat. Cū spicas Aegyptij metūt,
 ollam picis paratam habent, & appensam fa-
 sciam: tunc enim maximè serpentū iniurias ex-
 pavescūt, tū propter spicilegij tēpus, tum quod
 opacis simul abdita speluncis, & cauernis, den-
 soq; aruorum cespite delitescunt. Molestissima
 enim animalia, et virus eruclātia. Aegyptus in
 campis ferre consuevit. Vbi ergo aut in pedem,
 aut partem aliam morsum intulerunt, qui ad-

sunt, faciam in ollam picis coniiciunt, & semel aut iterū brachiū aut crus paulū supra vulnus obligāt & arctissimè duo è presentibus distringunt, locumq; sequantes qua circumactus est laqueus, picē instillāt: cūq; satis vulnus excepisse videtur, laqueū resoluunt, & cepis alijsq; supra memoratis illinūt. Præterea pix liquida cū sale trito & feruente illita, præsentaneo est auxilio, si iugiter innouetur. Cōuenit & cedria, et fīmū caprarū ex vino decoctū. Locū aceto, calido, calamintha in lotio, maris aqua, aut acida muria decocta, foveri salutare est. Quinetiam nō desunt emplastra vehemētissima, et calidissima, q̄ venenū elicere, expugnare, & discutere possunt. Cuiusmodi sunt q̄ ex sale, aut nitro, sinapi, et cachrye cōponūtur, de quibus cōsequenter erit tractandū. Erasistratus autē non iniusta reprehensione eos incesit, qui incognitas ad hūc vsum facultates cōscripserūt, vt elephātī fel, crocodilīve sanguinē, oua q; testudinīs, et cōsimilia. Nā cū inuātia qdā literis tradidisse videntur, planē in hæc sola incidētib⁹ imposuerūt. Quare talia dinitāda sunt, cū difficilē, nisi regia facultate puestigari possint: neq; quò nostra fides ijs obstringatur, siquēti obseruatione; sufficiens experimentū pstitierint. Qua autē ad communē omniū vsum pertinet, quæq; facile suppeditari, & omnibus à serpente percussis auxilium ferre queūt subiungēda videtur. Intubus itaq;

Erica, & astragalus, cū aceto pota, contra omnes serpentium morsus auxiliatur. Itē bitumē, & virentes platani pilula in vino diluto cocta, & paliuri decoctū: radix aristolochia, & eryngij: decoctæ etiam lauri bacca, & deuorata, piperq; largius esitatur, ruta, anethū, & cyclaminus: coma' porrorū priuatim ex pane, aut alliū, aut cepa, salsamentaq; quā acerrima: origani decoctū cū vino potū, fœniculi, pulegij, calamintha, porrorūq; succus cū melle desorptus. hac quidem à plantis cōquiruntur. Ab animantibus verò quadā vtiliter peti solēt, galinaceorū cerebella in cibo, leporinū coagulū cum vino, itidē castorei sextās: testes marina testudinis sumpti multū prodesse traduntur: mustela sale inueterata inter auxiliaria medicamēta est. Commēdatur in primis exēterata, q̄ sale siccescens inueteratur ex qua binas drachmas cū vino bibisse satis est. Sed de simplicib⁹, q̄ dari solēt, hæc ten⁹. Percussis à serpente pdest alui deiectio, disfluēs sudor, vrina copiosè reddita. Sūt & cōposita quadā potionesqua mira remedia polliceri traduntur, vt et opij & myrrha singuli oboli, piperis sicilicū: ea melle excipiūtur, & instar Aegyptiac faba dantur cū vino. Itidem syluestris ruta seminis, gith, cumini Aethiopini, aristolochia, galbani, singulorū pares portiones trita, & cū eruce succo subacta digeruntur in pastillos, qui drachma pondus aquent. dantur ex ijs terni cyathi cū vino.

Hac habui de cōmunibus auxilijs quæ dicerem.
De peculiaribus remedijs contra bestias, quæ
vena vibrant, consequenter est dicendum.

Vespæ, & apes. CAP. XLI.

INter ferientium venenatorum notas, nihil de
vespīs, & apibus articulatim digessimus,
quod cōspiciæ omnibus sint, & nihil excellēs, aut
notatu dignum in his obseruetur: inter remedia
tamen earū meminisse nō fuit alienum. Igitur
aduersus vtrarunq; ictus pdest illita malua, et
hordeacea farina cū aceto, ficulneū lac in vuln⁹
instillatū, & muria, aut aquæ marinæ fots.

Phalangia. CAP. XLII.

DEmorsis à phalangijs locus quidem ipse,
quasi ab impacto aculeo rubet, non intumescens,
nec per ambitum calidus est, sed medio
criter humescit: vbi verò contrariorum occurſu
refrixit, consequitur corpore toto tremor, disten
tiones poplitum, & inguinum, conuulsionibus
nō dissimiles. in lumbis collectio exoritur, et per
petua vrinæ libido lacescit, multaq; reddēdu ex
crementis colluctatio. vniuersa cute frigidus su
dor emanat, coliacrymant oculi, offusisq; nebu
lis caligant. Horum ictibus ficulneum cinerē ad
iecto sale trito, & vino imponere oportet: aut
radicem sylvestris punica quā tenuissimè tri
tam: aut aristolochiam cū hordei farina, & ac
eto subactam. Vlcera aquæ maris proluēda, aut
apiastri decocto, foliaq; eiusdem illinenda. La-

uacris perpetim vtendū, & propinandum a bro-
toni semen. anisum, aristolochiā, cicer syluestre,
cuminū Aethiopicū, cedrides tritas, platani cor-
tiem, & trifolia herba semen: priuatim autē,
singulorū ex ijs binas drachmas dare cum vini
hemina cōuenit. itē myricæ fructus, & chama-
pityos, & viridium cupressi pilularum decoctū,
admisso vino. Sunt qui fluuiatilis cancri expres-
si succum cum lacte, assumpto apij semine, cōse-
ssim molestijs liberare prodant.

Scolopendra. CAP. XLIII.

SI scolopendra, aut dicta ophioclene, morsum
intulit, locus per ambitū luore sugillatur.
& cōputrescit: interdumq; licet raro, faculen-
tus, atque ruber cernitur. A morsu ipso exulce-
rari locus incipit, vlcusq; id negotium exhi-
bet, ferē remedijs inuictum: preterea toto corpo-
re prurigo sentitur. Hac vbi morsum infixit,
sal quā leuissimē tritus, ex aceto vulnere in-
spargendus, aut ruta sylvestris superponenda.
Locus acida muria fouendus, & danda in potu
aristolochiæ cum vino, aut serpyllum, aut cala-
mintha, aut ruta sylvestris.

Scorpio. CAP. XLIIII.

Scorpionis morsu inflamari statim incipit lo-
cus, & indurescit, ac intentus rubet, vicif-
simq; dolore premitur: modò siquidē exastuat,
modò frigore occupatur. Labor repentē fati-
gat, & aliquando meliusculē habet, aliquādo

recredefcit. Confequitur fudor, horroꝛis fenfus
 & tremor, extrema corporis partes refiꝛgefcunt
 inguina extolluntur, per fedem flatus exeunt,
 capilli eriguntur, palor membra decolorat, &
 dolor tanquam expũꝑgente acu, per vniuerfam
 cutẽ fenfitur. Percuſſis præſenti eſt auxilio ficul-
 neũ lac in vulnus inſtillatum. Scorpius ipſe, qui
 iẽctum vibrauit, tritus, et percuffo loco impoſitus
 ſua plaga remedium eſt, ob cacam quandam na-
 turarum (vt conſtat) diſcordiã, qua antipathia
 appellatur. Preterea tritus & impoſitus cum
 ſale, lini ſemine, & althæa, ſcorpius conue-
 nit. Sulphur ignem non expertum, reſina tere-
 binthina exceptum, & emplaſtri modo adiectũ
 auxiliatur. Itidem garbanum ad ſplenũ formã
 ductum, & calamintha. qua trita illinatur, &
 farina hordei in vino parata, in decocto ruta.
 Semen, trifolia herba tritum, et vulnere iniectũ
 opitulatur. Hac ad effectum locum pertinent.
 Poſt hac quã efficaſſimis potionibus vtendũ
 cuiuſmodi ſunt ariſtolochia, præſertim corticis bi-
 na drachma cum vino, tuſa gentiana, & pule-
 giũ decoctum, & bacca lauri pauco numero tri-
 ta, & calamintha cum poſca, in qua magnope-
 re diſcoqui debet: cupreſſus cum vino, & ruta,
 nec ſecus ficulneum lac: laſerpitium, ſi adſit: ſin
 deſideretur, peucedani ſucco vtendum. efficaꝑ eſt
 potum trifolij, & ocimi ſemen. Horum autem
 omnium vicem penſat iugis lauacri uſus, euoca-

mus sudor, & diluta vini potiones.

*Pastinaca marina, Scorpio & Dra-
co marini.*

CAP. XLV.

SI marina pastinaca percussit, protinus accidunt molesti dolores, assidua conuulsiones, lassitudo, & imbecillitas. mens percussis labat, postea obmutescunt: oculi caligant. Percussus autem locus in ambitu cum vicinis partibus denigratur, & ita obstupefcit, vt tangentem non sentiat. hunc si quis premat, atra sanies, crassa, & male olens excernitur. Et qui marina pastinaca ictur, omnia, quæ de viperarum morfu paulò post referemus, simili modo conueniunt. peculiariter autem ictus à marino scorpione, & dracone inferuntur, qui molestos cruciatus cient: interdum autem, sed rarò, nomas excitant. Quibus absinthij, saluie, aut sulphuris ex aceto triti potio subuenit. Ipsi etiam dissecti, vulneribusq; impositi, sui cuiusque ictus remedio sunt.

Mus araneus. CAP. LXVI.

AMure araneo percussis, circa morsum in orbem inflammatio exoritur, nigraq; pustula, diluta sanie turgens, exurgit: proxime partes luët. Rupta pustula, depascens vlcus, non est dissimile, quod serpit, occupat. intestinorū quoque tormina, difficultas vrinae, & frigida asperginis offusio consequuntur. Huius morfibz auxiliatur ex galbano splenium, per se vulnere exte-
rino.

rius impositum, vt medicamenti modo aceto tritum, & hordeacea farina cum aceto mulso illita. Quinetiam mus ipse, qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus sui veneficia luit. Resistant quoque acini dulcis punici decocti, & illiti: item porri, & alia contrita, necnon aqua calida fctus: sed hac ad locum pertinent. Prodest potum abrotani decoctum, maxime si in vino detur. praterca serpyllum, & galbanum, & eruca vino madesacta: recentes cupressi pilula cum aceto, & cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrum cum vino, & chamaeleonis herba radix. Nec desunt, qui literarum monumentis tradiderunt, tritum murem araneum contra suos ictus commode bibi. Quam historiam apud alios inuenta, digna duntaxat censuimus. qua adnotaretur. Alij asseuerant, demorsum non alijs exulcerari, nisi pragnans mus araneus fuerit: tum sane auxiliari ferunt.

Vipera. C A P. XLVII.

SI vipera momordit, corpus intumet vehementer arefcit, subalbidumq; colorem concipit. Sanies a vulnere profunditur, primum suppinguis, mox cruenta, pustule adustis similes erumpunt: & antea depascens vlcus, quod in proxima repens, non summa modo corporis: sed intima quoque corripit. Gingiua ijs cruore suffunduntur: inflammatio circa iecur erumpit: tormiua, & biliosi vomitus sequuntur. Sopor, tremor

mor, & vrina difficultas accedit. & frigidus sudor offunditur. Vbi verò vipera morsum impressit, simum caprinum cum vino, studiosè impositum opitulatur, item laurus et abrotonum, & galbanum splenij loco superiectum, & organum viride inditum. pulli gallinarum disierpti: & confestum amoti: terni farina vino subacta: radicis cortex vsque eo tusus, vt in puluerem solutus abeat, & scilla tosta: detritum chamamelum, hordeacea farina cataplasma in aceto mulso paratum, sed locus antè eo calido foueatur. hæc loco imponuntur. Cōtra viperinos ictus rubus cum vino prodest. Aliqui anchusam tenui folio constantè auxiliari produnt. Leporini coaguli in vino terni oboli bibuntur, & porracei succi hemina in mero, & foliorum apiastri succus, & syluestris ruta, hæc in vino potari debent. Vinum frequenter bibendum, alia mandenda, & cape, & porri recentes salsamenta acerrima, & opipara simplicia hæc sunt. percussis à vipera præclarè auxiliatur medicamentum, quod myrrha. piperis, castorij, floris portulacæ seminisq; dimidio acetabulo cōstat: hæc omnia in Cretico passo teruntur, aut in alio probato. Erasistratus in eo libro, qui περὶ ἀνδράκων, id est de viribus, inscribitur, pleraque alia tradidit, quæ ictis à vipera auxilium ferre possunt: interq; talia maximè laudatur. Gallinacea cerebella cum vino pota, semē sativæ brassica tritum, et acetabuli mensura

cum vino potum. Quinetiam bonum est digitum in liquidam picem intingere, deinde vinum quo digitus fuerit elutus, bibere. Hac sunt quæ contra vipere ictus auxiliantur.

Cæcilia, & amphibæna.

CAP. XLVIII.

Consimilia suprâ dictis in vipera eueniunt. Quis qui à Cæcilia nomine, & amphibæna demorsi sunt, eademq; ferè auxiliantur. quare hoc venenum priuatam descriptionem sortitum non est, neque visum est dignum, quod alio genere comprehendatur. De ijs autem mentionē hoc loco fecimus, quoniam ferè remedijs ad viperas scriptis, percussi ab eis adiuuari soleant.

Drynus. CAP. XLIX.

ADryno morsis pustula, molestiq; dolores incidunt, præsertim qua diluta sanies emissarium subest: quinetiam erosio, torminaq; consequuntur. Ab eo ictus conuenit aristolochia cum vino pota, trifolium herba, radix hastula regia similiter assumpta, & fructus ex omni glandisferarum arborum genere: & tussæ illicis radices, & illa parti ictæ auxiliantur.

Hæmorrhous, & dipsas. CAP. L.

AB hæmorrhoi ictus vehementes cruciatus accidunt, quæ angustæ, contractaq; corpora ex continuo dolore reddūt. Ex plaga copiosus sudor effluit, & quacunq; parte corporis cicatrix vlla fuerit, ea sanguine manat. Extremæ

per aluum cruentà eijciuntur, profluensq; sanguis in globo coit. A pulmone sanguinem extus sunt, & in vomitiones effusi sine remedio commoriuntur. Quos verò dipsas percussit, solutus ac non constrictus tumor premit, sitisq; vsque eò pertinax, vt satiari nō possit, ac sine vlla intercapedine excruciet: et si potum pleno ore affatim trahant, illico in eādem sitim relabuntur: proinde toto habitu similes sunt ijs, qui antea potus nihil hauserint: quare propter continuam sitim, & præster, et causer, aut dipsas appellatur. Haemorrhoi, dipsadusq; morsus velut immedicabiles à plerisq; maiorumq; deplorati relinquebantur. quare si peculiaribus contra dipsadem remedijs egeamus, cōmunia experiri operepretium erit.

Protinus autem safrificatione vtī, vstionem facere, & si locus patiat, extremorum amputatione opus erit, consequenter quā acerrima, cataplasmata ad mouere, de quibus saepenumero diximus. Nec me fugit, acres cibos, maximè à salsa mentis, vtilis esse. Meracæ potiones, & lauacra prosunt, quæ subinde interiecto breui spatio assumenda sunt, prius quā morbi genus emerferit. quo semel erumpente opem ferre non potest vlla medici opera. In ictu hæmorrhoi eadem prosunt. Insuper quæ in commune opitulantur, vt scarifcationes, vstiones, acres cibi, meraci potus, & quæ nūc in dipsade definiuimus. Quæ etiam decocta vitis folia, & cum melle trita.

Natrix. CAP. LI.

AB natrice demorsis vlcus dilataatur, & li-
uidum, ac ingens euadit. Sanies ex eo mul-
ta, & atra, & male olens, non secus atque ijs q̃
serpunt vlceribus, expuitur. Si ergo morsum na-
trix adegit, prodest origanum tritum, & aqua
subactum: lixiuia cum oleo indita, aut aristolo-
chia cortex: aut querna radix minutim contri-
ta, & hordei farina cum aqua, et melle colliqua-
ta. Bibuntur etiam binæ aristolochia drachma
in potione poscæ cyathis duobus, deinceps marubij
succus, vel decoctum alterius cum vino, sanius
recens datur in aceto.

Cenchrus. CAP. LII.

Cenchri morsum, qui viperino ictui similis est
putridum vlcus sequitur. carnes antea, vt
in aqua inter cutem, prætumida desuunt, le-
thargo corripuntur, & veterno pressi somnos
captant. Erasistratus eos iecinore, in testino iei-
nu, coloq; confluctari author est. quippe dissectis
ipsis omnes ferè partes corruptæ reperiuntur.
Morsis à cembro auxiliatur lactuca fructus cū
lini semine illitus, & satureia trita, et syluestri-
ruta, & serpyllum, cum duabus hastula regia
dracmis, & tribus vini cyathis, aut aristolochia
radix, item cardamomum, & gentiana.

Cerastes. CAP. LIII.

ACeraste percussus locus attollitur, cum duri-
tia pustulosus. è plaga sanies p̃fluit, modo
atrat

atra, modò pallidior: sed toto concretu varicosus intumescit: genitale intenditur, mens labat, & oculorum caligo exoritur: denique rigore nervorum distenti commoriuntur. Si ceras tes percusserit, cita partis aputatio suffragatur, quare sine mora iclam partem amputare, aut scalpro confestim circuncidere, & ijs similia prosequi oportet. Vrentia insuper reliquijs admonenda: siquidem virus hoc veneno basilici simile est.

Aspis. CAP. LIII.

AB aspidē iclis vulnus exiguum prorsus, quasi ab adacta acu citra tumorem cōspicitur: sanguis exiguus ille quidem, sed ater distillat: caligo velox oculos obnubit: labor in totum corpus multiplex, omnino levis, & non sine voluptate consequitur. Ideo Nicander perpulchrè cecinit. At vir perit absque labore, virens, atq; discolor. mediocris Stomachi dolor afficit: frons perpetuò reuellit: gena contremiscunt, quasi si ne sensu in summo vacillant. hos mors tollit, ad diei trientem non dilata. Caterum ijs, qui ab aspidē feriuntur, quæ de ceras te scripta sunt, auxilia dari debent. Nam venenum hoc quemadmodum basilici aut sanguis bubulus, celerrimè in alterijs sanguinem cogit.

Basilicus. CAP. LV.

ERastratus in libra, quem de medicaminibus, & venenis condidit, deuocato basilisco. scutè ita refert. Cū basiliscus momorderit, vultu

ad auri colorem efflauescit. itaque in plurimis,
quæ virus ei aculantur, comites notæ ita se ha-
bent. Ad basilici morsum, ut idem erasistratus
author est, auxiliatur castorj drachma in vino
pota: item papaveris succus. Ictuum remedia ita
se habent.

Libri sexti & vlti-
mi finis.



NOTHA ET DIOSCORIDI

FALSO ADSCRIPTA,

quæ vt facile, si quis ita velit, suis
singula locis applicentur, nu-
meris notantur: quo-
rum primus Diosco-
ridis paginam,
secundus ver-
sum si-
gnat.

6.12. *Iris ab aliquibus Illyrica. ab alijs thel-
pide, ab alijs vrania, à nonnullis catharon aut
thaumastos, à Romanis marica radix, à qui-
busdam gladiola, ab alijs opertritos, ab alijs cõ-
secratrix, ab Aegyptijs nar appellatur.*

8.10. *Aliqui choron aphrodisias, Romani
veneream, aut radicem nauticam, Galli piper
apium vocant.*

9.15. *Romani iunci radicem aut iuncum.*

14.12. *Magi sanguinẽ Martis, Latini per-
p̃sam, alij bacchar, Osthanes thesam, Aegyptij
cerea, alij nardum rusticum, Galli bacchar, He-
trusci succinum: odorata herba est, qua in coro-
namentis vtuntur.*

16.7. *Quibus odor inest cinnamomo proxi-*

Prus: asperum siccumque solum amat. Eius radix, ruptis, cōuulsis, in tussi vetere, & spirandi difficultate, & si vrina agrè redditur, opifera est: menses ciet, contra serpentium ictus, eā in vino bibere salutare est. Folia, vt quæ adstringant, illa capitis doloribus, oculorum inflammationibus, incipientibus agylopijs, mammis tumentibus à partu, ignibus sacris auxiliantur. Odor sumnu gignit. Crateus herbarius de eo ita scriptum reliquit: *Afarum*.

25.12. Alij sphanon, alij phasganon, Syridia xylon vocant.

27.28. Ab aliquibus castor, ab alijs cynomorphos, à magis Herculis sanguis appellatur.

29.18. Symphyton aliqui vocant, alij persicam, alij medicam, alij prestium, alij nectarion, alij cleoniam: alij idacabaton, aut phlomu idcu, Latini terminalium, aut enulam campanam, Aegyptij lenen.

74.2. Iuniperu paruum Græci arceuthida, aliqui mnesitheum, alij acatalidem, Aphrixuorinsipet, Aegyptij libyum, Galli iupicellum, Romani iuniperum vocant.

74.9. Iuniperus magna. Cap. Iuniperus magna, quam aliqui syluestrem cupressum appellant, alij mnesitheum, alij acaterā, Romani iuniperum, vulgò cognita est, cupressò assimili: asperis maritimisq; locis plerunq; nascitur, easq; quas supradita vires habens.

74.20. Brathy, alijs baryton, alijs baron,
Romanis herba Sabina appellatur.

81.28. Rhamnū alijs persephonio vocāt, alijs
leucacantham, Romani spinam albam, aut cer-
nalem spinam, Aphri atadim.

82.13. Halimum alijs damasoniū vocant, alijs
erymon, alijs britanicā, alijs rhabdio, alijs basilio,
Magi Mercurij basim, aut Osiridis diadema, a-
lijs elystephanon, aut sacrum caulem, Pythago-
ras anthenoros, Aegyptij asontiri, alijs asphen,
alijs ascaluri, alijs asariphen, Latini albuciu aut
ampeluciam.

91.25. Agnon aliqui agynon, alijs lygon vo-
cant, alijs amistomianon, alijs tridaclylon, Magi
seminon, alijs hamaideos, Aegyptij sum, Roma-
ni salicem marinam, alijs piper agreste, alijs le-
tristicum.

131.28. Eorum venter sale conditus, & in
ymbra siccatus, cōtra eximias vacuationes me-
dicamentorum, trium drachmarū pondere, pra-
senti est auxilio: quandoquidem protinus deie-
ctiones cohibet. Teri autem debet in farinam, et
aqua subactus dari.

169.5. Telin, alijs carpon, alijs luteron, alijs e-
goceron, alijs cerastiden, Latini senningracum
appellant, Aegyptij itasin.

169.22. Aliqui linocalamin vocāt, alijs an-
non, alijs linon agrion, Romani linum, Panni
xeraphoës.

175.13. Thermon, Romani lupinum, Aegyptij brechon vocant.

176.9. Gogylen satiuā, alij gongylida: alij golgosium, Romani raptum vocant.

177.8. Alij polyides eryngium, Aphrithor-
phat.

177.29. Sylvestris rhapbanus, quam Romani armoraciā vocant, alij montanum raphanum, alij apium, alij ischada, alij chamabalanum. Romani etiam radicem sylvestrem: ramulos tenues, iunceaos, duos siue tres spargit, rubentes: folijs ruta sylvestris, oblongioribus, & angustioribus: semine paruo: radice albuci, rotundiore, turbinatiore, pyri figura, candido cortice. Ea lacteo succo madet. Pars radice superior vomitione bilem pituitamq; extrahit, inferior per alui, tota susq; de que purgationes mouet. Quod si tibi in animo est succum extrahere, radix tusa in fictili mergitur, & qui supernatat succus pinna eximitur. Is sesqui obolo potus, vtraq; parte purgat.

179.24. Romani napium dicunt.

179.28. Aegyptij echloteripam appellant, alij riplam, Romani blitum, Daci bles.

180.2. Pythagoras anthemia vocauit, Zerastres diadema, Aegyptij chocortem, Magi lienem capra, aut muru vrinam.

180.27. Atraphaxin, Romani atriplicem, Aegyptij ochi vocant.

180.29. Crambrez Romani brassicam vocant.

182.2. Romani rusticam appellant.

183.5. Portulaca sylvestris. Cap. Sylvestris portulaca, quam aliqui axion sylvestre vocant, alij telephion, Romani illecebram, aliqui portulacam, Aphri mæmoen, Daci lax, Aegyptij mochmudum, folijs pusillis, ad satiuā accedentibus, hirsutis, latioribus: nascitur in petrosis, nonnunquam in hortis, folia oleæ habet, minora multò, plura & tenere, rubentes cauliculos, ex vna radice multos, in terra sessiles, qui manducati bonum succum pariunt, viscosi, & aliquantum salsi. Vis ei excalfactoria, acris, exulcerans: discutit strumas, cum axungia illita.

183.25. Aliqui petraeon, alij myacathan, alij myon vocant.

185.2. Arnoglosson alij arnion vocant, alij probation, alij cynoglosson, alij heptapleuron, alij polyneuron, Magi eurechnemona, Aegyptij asonth, Romani plantaginem, Hispani thesari cam, Pæni atyrcon.

186.14. Syri ius plantaginis, & calamintha, cum melle prodūt ijs mederi, quos vires defecerunt, datum die secunda, & quarta, & parasceue: id est, Veneris die. Hoc autem velut arcanum accipito, quod veraci experientia compertum est.

186.19. Aliqui aquatilem anagallida, alij

DIOSCORIDIS

Areneion, alij *lauer*, alij *schinon aromaticum* vocant.

186.29. Alij *Veneris coronam*, Romani *veneream*, aut *eusteralem*.

188.2. Aliquibus *ammonos*, alijs *astrion*, *Pœnis atirsite*, Romanis *caciatrinx*, alijs *stilago*, alijs *sanguinaria* ducitur.

188.8. *Sonchon asperum* aliqui *cichorium* vocant, Romani *cicerbitam asperam*, Aphri *ga-thuonen*.

189.2. Alij *picrida* appellât, Aegyptij *agon*, Romani *intubum*.

191.14. *Thridaca hemeron*, Romani *lactucâ fatiuam*, Aegyptij *embrosi* dicunt.

191.26. Magi *sanguinem Titani*, Zoroastres *pherumbrum*, Romani *lactucam sylvestre* appellant.

192.13. Romani *bisacutum*, Aegyptij *dorisatrum*, Syri *adorium*, Aphri *tiriçta* appellât.

192.21. Romani *herbâ scanariam*, aut *aculam* nominant.

192.26. Alij *caucum*, alij *myitin*, Democritus *brion*, Romani *pedem gallinaceum*, aut *pedem pulli*, Aegyptij *jeselin* vocant.

193.4. *Euxomon* Romani *Erucam* vocant, Aegyptij *ethrericem*, Pœni *asuric*.

194.5. Alij *cynomorion* appellant, à similitudine canini genitalis, alij *leonē*, Cyprij *thyrfinem*, communiter *lycon*.

197.9. Crommyon aliqui polyidos vocant,
Magi calabotim. Romani capam.

198.9. Græci scorodon, alij geboscon, alij elaphoboscon vocant.

199.21. Romani sinape vocant.

200.21. Cardamon alijs cynocardamō, alijs iberis, alijs cardaminaca, Aegyptijs semeth, Romanis nasturtium dicitur.

201.8. Aliqui thlaspidion, alij sinapi Persicum, alij myiten, alij syluestre synapi, alij das-mophon, alij myopteron, alij bitron, Aegyptij suitepsum, Romani scandulatum, alij capsellam, aut pedem gallinaceum vocant.

202.9. Aliqui chamaclion, Magi Herculis alphita, Aegyptij erethmon.

205.23. Ab aliquibus cerdō, ab alijs catharsis, ab alijs struthocamelus, à quibusdam chamarrhytō, à Magis callirrhyton, ab Aegyptijs tano, à pœnis syris, à Latinis lanaria herba, aut radícula appellatur.

206.7. A quibusdam cissanthemon, ab alijs cissophyllon, ab alijs chelonion, ab alijs ichthyotheron, ab alijs silene, à Zoroastre triumphantes, ab Osthane aspho, à Magis miaspho, Aegyptijs thesee, à Romanis rapum terræ, aut terræ umbilicus, ab alijs arcar vocatur.

208.2. Dracunculus. Cap. Draguntium magnum aliqui aron, alij isaron, alij iaron, alij hieracin, alij biaron, alij armiagrion, alij ciperida
vocant

DIOSCORIDIS

vocat: in vmbrosis sepibus gignitur. Caulē ha-
bet rectum, leuē, duum cubitorū, baculi crassi-
tudine, versicoloribus draconum maculis, purpu-
reis tamen euincentibus: folia rumicis, inflexa:
frutum summo caule facit, racemosum, coloris
primū cineracei, mox per maturitatem in cro-
cum & purpuram vergentis: radicem pregran-
dem, rotundam, candidam, cortice tenui vesti-
tam. Colligitur, & dum maturescit, succus ex-
primitur, siccaturq; in vmbra. Radix quoque
mensibus effoditur, elotaq; particulatim concidi-
tur, & funiculo transfixa siccatur in vmbra.
Cum diluta potione, crudam coctā mve, cū melle
delingi prodest, contra orthopnceas, rupta, con-
uulsa, tuſſim, & destillationes: pota cum vino
venerem stimulat: vlcera quæ cacoethe vocan-
tur atq; phagedanica, expurgat, praesertim cū
vite alba: ex ea & melle collyria ad fistulas &
partus euocandos componuntur: ad vtiligines
cum melle, efficaciter illinitur: polypus & cari-
nomata absomit. Succus ad oculorum medica-
menta: item contra nubeculas, caliginem, albugi-
nesq; effectum prabet: herba radicisq; odor, te-
neros conceptus abortu vitiat: item si triginta
grana eius in posca bibantur. Sunt qui eius suc-
cum cum oleo aurium doloribus insudare: quin-
etiam folia, vtpote quæ adstringāt, vulneribus
recentibus imposuere, & cocta in vino pernioni-
bis. Qui folia manibus affricuerit, aut radicem

exemerit, posse à vipera ferri inficiantur.

210.15. Aliqui alimon, alij thymon, alij dracontiam, Cyprij colocasion dicunt.

211.5. Gracia sphodelon, alij narthecion, Romani albucum vocant.

212.6. Floret mēsisibus albucū. Quare equinoctio verno, antequā semen adoleuerit, demetendum. Radicem aiunt potam, Veneris cupiditatem inhibere, quod herbarius Crateuas assuevit: addiditq; sanare podagræ dolores, si drachmæ pondere bibatur.

213.2. Cocti cū polenta, & ex suillo adipe impositi, tumores ac tubercula velocissimè ad supurationem perducunt, & rumpunt.

214.27. Aliqui cynosbaton, alij capriam, alij corui malum, alij ophioscorodon, alij phylloclaphylon, quidam thalliam, aut petream. alij olophyton, alij ionitem, nonnulli oligochloron aut acontion, aut hippomanes, alij trichomanes, Magi potera: alij pentheron, aut cor lupi, alij alochorodon, alij crinon, alij thlaspin, Romani persicum synapi aut inturim, Aphri herbicathon.

216.11. Ranunculum aliqui sylvestre apium vocant.

217.2. Anemonen, alij agriam: aut nigram vocant, alij anemonen phenicam, alij enemion, nonnulli meconion, alij tragoceros, alij terræ parinē, aut barbylam, Osthanes berilion, item or-

nios ceranion, Pythagoras atractilida, Magnici agrii, Aphri chusfit, Romani orci tunica,

218.10. Aliquibus ænone vocatur, alijs anthemis, alijs homonœa, aliquibus flos cæpestrus, Romanis concordialis, aut pergaltia, alijs liburnia, Gallis corona.

218.15. Ea, ut herbarius Crateus author est, confusa cum axungia, strumias discutit. Cribrata eius farina cum nitro, & sulphure igne non experto contra vitilignes efficax est: easque sicco linteo antea confictas in balneis sanat: facit & ad scabiem.

Alter a argemone. Cap. Altera est Argemone, quã artemonem aliqui, alij arselam, aut sarcocollam vocant. Romani argemoniam. Ea folijs sylvestri papaveri similis est. Recens trita intercisiones impositu sanat: oculorum inflammationes mitigat: pota cum aqua dysentericis auxiliatur: vulnera cõglutinat: cõuulsis, & vellicatibus imposita medetur, inflammationibus utilis, contra serpentium morsus cum vino bibitur.

218.18. Anagallis purpurea, quibusdã æritis aut ægitis vocatur, alijs sauritis, Magis oculi sanguis, aut chelidoniõ: Romanis macia, Hetruscis masytipos, Gallis sapana, Dacis cerceraphrõ. Anagallis communis, quibusdam corchoron, alijs halicacabon, alijs xeliaurus, Magis nycterritis, Aegyptijs meciq, Romanis aneciaton, Aphris asirriq.

218.19. Aliquibus citharon, alijs cissaron, alijs chrysocarpus, alijs poetica, alijs corymbetbra, alijs cysio, alijs dionysia, alijs ithytherio, alijs persis, alijs cemos, alijs asplenos, Romani sylva mater, alijs hedera, Galus suibites.

221.5. Chelidonium magnam nonnulli pœoniam vocant, alij crataegi, alij aubii, alij glauciam, alij pandios radix, quidam philomedion, alij othomon, Romani fabium, Galli thonan, Aegyptij mohoth, Daci crustana.

222.11. Auricula muris. Cap. Myosota alij myrtō, alij anthyllion, alij alsinen, nonnulli myrthocon, alij myrthosplenon, Latini muris auriculam vocant, Aphri labatholabat. Nomen ideò accepit, quòd musculorum aures folijs imitetur. Lucos & sabulosa loca amat, ideò alsine dicta est. Ea helxinx similis, sed humilior, ac folijs minor. Vini refrigeratorem habet, oculorū inflammationibus cōueniēter expolenta illinitur. Succus eius aurium doloribus instillatur: ut totum eadem potest, quæ helxine.

222.22. Isatis sativa aliquibus augiō, alijs egne, Magis arusion, Romanis gluta aut glastum dicitur.

223.6. Sed sciendum est, ne tradita errorem pariant, sativum glastum, luteū florem, tenuiores, multifidōsq; ramulos proferre: in cacumine autem folliculos linguae speciem representantes, in quibus semina continetur melanthio simile,
canelm

caulémq; supra binum cubitorum altitudinem
attolli: sylvestre verò nigriora ferre folia, cau-
lem minorem, sed crassiorē: florem purpu-
reum, aut cœruleum, fructum cruciformē, aspe-
rum, in quo semen, folijs exilibus quinquepar-
tito diuisum.

223.8. Aliqui sylvestre semperuiuū, alij por-
tulacam sylvestrem appellant, Romani illece-
bram, Aegyptij anoth, Aphri atirtopurin.

226.7. Aliqui rhiam vocant.

227.5. Aliqui centauriā radicem, alij aloen-
Gallicam, alij narcen, alij chironion, Dardani
aloitim, Romani gentianam aut cicendiā, alij
ciminalem vocant.

228.6. Alijs melocarpos, alij teuxinon, La-
tinè aristolochia.

229.13. Appellatur à quibusdam ararisa, et
melecaprum, epheistios, lectitis, pyxionyx, Dar-
danion, iontitis, Gallis theximum, Aegyptijs,
sophoepl, Siculis chamamelon, Itali malum
terre, Dacis absynthium rusticum: nascitur in
montibus, & calidis locis, aut campestribus, &
petrosis. Ad grauem febrim efficax est, si nido-
re subditis carbonibus febricitās sufficiatur, fe-
bris leuabitur: vulnera impositu sanat: carcino-
matis narium, cum cypero, & dracunculi semi-
ne, & melle prodest: rigoribus medetur, cocta in
oleo aut adipe suillo, illitaq;. Crateuas herba-
rius, Gallus, eadem de hac tradiderunt, & pre-

terea podagricis eam auxiliari.

229.13. Glycyrrhizam aliqui ponticam, alij glyceraton, quidā symphyton, alij leonticam, alij glycyphyton, aliqui scythion, alij adipson, alij sylithram, alij libiestason, alij homænomæon, alij peenthaomæon, Latini dulcem radicem appellauere.

230.2. Aliqui narcem vocant, alij limnesion, alij maronem, alij plectroniam, alij chironiam, alij limnestum, Magi Herculis sanguinem, Romani phieri, & vneseram, & fel terra.

230.27. Panacia appellata est, quoniam omnia mitigat vitia, quæ inflammationem minantur, plurimisq; scateat remedijs: pulsationes vulnerum, vrinae stillicidia, calculosorum cruciatus, dysstere immissa sedat, Legitur matutinis, sole ad ortum spectante, hora diei pura, cum omnia lumine complentur.

230.28. Aliqui limnesion, alij belleboriten, alij amaranton, Magi Herculis sanguinē, Latini febrifugiam, alij auram, multi radicem, Dacii tulbelam appellant.

232.9. Quibusdā chrysisepton, alijs ixia, Romanis carduus varinus, Aegyptijs epher dicitur, alijs eptthofechin.

233.2. Pancarpon aliqui, alij vlophonon, alij ixiam, alij cynomaxon, alij ocimoides, alij onidion coccon, alij cynoxylon, latini carduum
nigrum

nigrum aut vernilaginem, Aegyptij sobet vocant.

234. 6. Aliqui crocodilion vocant, alij chameleonem, alij onocardion, alij veneris lauacrum, Romani labrum Veneris, alij carduū Veneris, Aegyptij seseneor, alij chir, alij meleta, Daci sciarum.

234. 23. Aliqui agriocinaram, alij donacitin, alij erysiceptrum vocant, Romani spinam albā aut regiam, alij carduum ramptarium.

235. 9. Quae acanthis aliquibus dicitur.

235. 15. Alias pherusa, alias pyracantha nominatur, in Aegypto cnius.

235. 24. Aliqui phryniō, alij acidoton.

236. 8. Acantham aut herpacantham, quidā melamphyllon, alij topiariam, alij mamolariam, quidam crapulam vocant.

237. 18. Quidam polygonaton, alij phyllon, alij ischiada vocant, Romani spinam albam.

238. 12. Aliqui eryngen, alij eryneren, alij caryon, alij gorgonion, alij hermion, alij origanū, chlounion, alij myracanthon, alij moly, Aegyptij crobyson, Magi systerion, Romani capitulū Martis, Daci sicupnoex, Hispani cētumea pita, Aphricherdam, alij oriam chloem, alij chida appellant.

239. 3. Aloē aliquibus amphibion, alijs herminion, alijs eryngion, aliis tragoceros, Romanis aloa, Barbaris aloē dicitur.

240.27. Aegyptii somi, Romani absynthium.

242.6. Latini Sandonicum vocant.

242.23. alii abutonon, alii absynthiū, alii heracion, alii cholopæon, alii absynthionenō, alii thelythorion, alii procampylō. Magi æuraphæicos, Alii cynanchiten, Romani absynthium ponticum, nonnulli thelythamnium, alii glycyrrhiza vocant.

243.19. aliqui later vocant, alii cassialam, Aegyptii psaleam.

244.8. aliqui syncliopa, alii alcibiadem, alii pancration, nonnulli styphoniam, Aegyptii syphlo, Magi pythons oculum, Romani sciolebinam vocant.

246.12. vers. vlt. Glicona alii blechroon, alii arsericanthum, Latini pulegion vocant, Galli aluolum, Aphriapoleium, quidam galisopsim.

247.2. alius embaciron, alius elonacos, alius artemedeion, alius cretica, quibusdam ephemeron, nonnullis eldia, aliquibus belotocos, aut dorcidion, aut helbunion, Romanis vstilago rustica.

248.9. alii elaphoboscon, aliqui phacon, alii ciosmin, alii phagnon, Aegyptii bection, Romanis saluam vocant.

248.23. Hediosmon sativum alii mintham, alii calamintham, Latini mentham vocant, alii nepetam, Aegyptii tis, alii pherthrumertthumōthū, alii perxo, alii maceto.

249.14. quidem cephaloton, alij epithymida, alij thyrson, Latini thymum, Aegyptij Stephanem, Daci mosulam.

251.7. aliqui Zygin sylvestre, alij polion vocant, Aegyptij meruopium, Latini serpillum.

251.28. aliqui nominant amaracum, alij triphyllon, alij agathides, alij cnecon, alij acapno, Pythagoras thramben. Aegyptij sopho. Armenij myuron, Magi ichrei asinum, aut hexigonon Isidis, Latini maioranam.

253.5. aliqui origanida, aut hysobrium vocant.

253.13. alijs sylvestre basilicum, Latini oclimastrum.

254.10. ruta montana, quam aliqui rhyte montana vocant: & ortensis, quam Aegyptij epnubum, Syri harmala, alij besasa, Aphri churma.

256.11. Sylvestris ruta Cap. Rutam sylvestrem aliqui appellant hyperikon, alij androsenon, alij coron, alij chamapityn. Romani hederalem, aut tentonalem, Aphrichurma semmaced. odor seminis resinofus est, ideo chamapitys aliquibus nominatur. Frutex est surculosus, rubescens, folia ruta figura flores lutei, qui digiti triti sanguineo succo manant, unde androsenon vocitarunt. Ramuli subhirsuti, siliqua terretes, hordei effigie, in quibus semen nigrum resinam olens, gignitur in cultis & asperis. Urinam ciet, menses appositus trahit, pota cum vino quartana liberat, Folia cum

*femine ambuſtis illitu medentur, & diebus qua-
draginta epota iſchiadicos ſanant.*

256.28. aliqui ſylueſtre leucoion appellant,

260.18. aliqui ceraſcomē vocāt, Latini ruſti-
cam paſtinacam, aliqui carotam, Aegyptij babi-
byron, Aphriſicham.

261.8. nonnulli ſphagnon vocant.

261.21. Aegyptij cyonum phricem vocant.

263.15. Anethū quod eſt ur, aliqui polgida vo-
cant, alij anicethum, Magi cynocephali genitu-
ram, aut capillos, alij Mercurij ſemē, Latini ane-
thum, Aphriſiciriam, Aegyptij arachu, Daci
pulpum.

264.11. ſive cuminum ſyluaticum.

265.4. Ammi, Latini ammiū Alexandri-
num, quidam regium cuminum appellant.

265.17. Aegyptij ochion vocant, Aphri gœd.

266.2. alijs ſonchites, Romanis lampuca, Poe-
nis ſithileas.

266.10. aliqui ſonchitē, alij entimon agriō,
Romani intybum ſylueſtrem vocant.

266.28. à quibuſdā pedinon, ab alijs hydro-
ſelinō agriō, Romanis appiū ruſticū appellatur.

267.1. aliqui petroſelinon ſylueſtre appellāt,
Aegyptij a nonim.

267.16. aliqui grielon, alij agrioſelinon.

269.4. aliqua elaphicon : alij neprion, alij
ophigeniō, nonnulli ophioſtonon, aliqui herpyœ-
en, alij lymen vocant, Romani cerui ocellum. Ae-
gyptij

DIOSCORIDIS

gyptij chemin, aphri ascaucau.

270.7. hippomarathrum, aliqui marathim, alij marathrum agrion, aegyptij sampsoth. Magithymarnolion, Latini feniculum erraticum, aliqui mion, Galli sistrameor.

271.10. alijs diachysis, alijs diachytos, alijs paralyssis, alijs camarus, alijs hyacinthus, alijs delphinias, alijs nerion, alijs neriadion, aut sosandron, aut cronion, Romanis bucinus minor vocatur.

271.24. aliqui dorycnion, alij pyrinon, alij pyroton, aut pyrothron, alij arnon pyriten, Magi pyriten, Romani saluarem vocant.

272.6. aliquib⁹ xea aut capsanema appellatur.

274.2. aliqui arangē vocant, alij phalangion, alij asterion, nonnulli nesyryn aut sphondylin, quidā chorodanō, aut ananthen, Romani herbārutinalē, aegyptij apsapher, Magiosirin.

275.4. aliqui agrion vocant, alij agriophylon, Magi bonum demonem, Romani satariam.

276.14. aliqui melāthium, alij mecona agriō melana, Romani papauer nigrum appellant.

282.10. herba est, ex qua ammoniacū fit susfimen, quod thymiama vocāt, aliqui agaxyllō, alij criotheum, alij heliustrum, Romani guttā.

284.27. aliqui ampellocarpon, alij omphalocarpon, nonnulli philantropon vocant.

285.9. aliqui aspidion, alij haplophyllon, alij

acryseton, alij adyseton nuncupant.

281.21. aliqui cission, alij cissophyllon.

285.29. aliqui armiron vocant, alij cnico sylvestre, alij aspidion, Magi aphedrū, Aegyptij chenon, Romani praecepium, aliqui fusum agrestem, alij colum rusticam.

286.11. quidā clinopedion, alij polygonaton, alij Iouis colum, alij echeonimon vocant.

286.18. Edocuit experientia cōtritos in vino albo ramulos, ijs qui affectibus laborāt, quae violentia vocantur, magno esse praesidio.

286.19. aliqui cleonicon, alij ocimoides, alij Χοπρὸν vocant.

287.2. aliquibus leontopodiō, alijs leuceorō, alijs leōtiō, alijs doris, aut doriſteris, alijs lychnis agria, alijs spardale, alijs thorybethron, alijs rhapeiō, alijs cornutū papauer, alijs anemone, Romanis patabelelon, aut semen leoninum dicitur.

288.15. aliqui athanatō vocāt, alii aciloniō, alij balarion, alii geranopodion, quidam corymbiō, aliqui taurion, alii ſceptrō, aut maloio. Aegyptii ſemeon, Magi sanguinem apocathemenes, Romani genicularem aut ballariam.

288.24. aliās trāgonatō, aliās atocion, aliās hieracopodion, aut lampas vocatur, aegyptijs ſemura, Magis apocathemenes taurus, Romanis agreste intubum.

288.24. Crinon basilicon alii crinatthemon vocāt, alii galiriō, Magi Martis sanguinē, Osthaneſ

nes autē crocodili, Aegyptii sylphophon, quidam
zialon, Latini lilium, aliqui rosam iconis syri
sasa, Aphri abiblabon.

289.17. Alii magnū vocāt, aliqui naphthā,
alii notia nocemin, alii nosprasson, alii nothera,
alii nochelin aut nostellin, alii nophryn, alii gno
torim, alii gnotera, Romani apniū, aut meda
tam, aut vlceraia, aut marubiū nigrū, alii can
thurinū: Aegyptii asphō, magi Isionis sanguinē.

290.8. Alii melitaon, alii melipbyllon, alii
erythran, alii temele, Latini apiastrū aut citra
ginem, Galli merismorion vocant.

290.27. Prasion, alii eupatorion, alii phyllo
phares, alii tripedilon, alii camelopodion, Aegy
ptii asteropē, Magi tauri sanguinē, aliqui aphe
dron, alii Hori geniturā, Latini marubium, ali
qui labeoniam, aphri atierberxiam.

291.29. Aliqui phyllin, alii acaulon, alii syl
uestre lapathum vocitant.

292.11. Aliis leucacantha dicitur.

293.1. Alii cnicion vocant, Romani trifolium
acutum, aut odoratum.

293.29. Polium montanū, aliqui teuthrion,
alii pheux aspidiō, alii achamenin, alii ebenitin,
alii melosmon, nonnulli bellion, quidā leontocha
ron vocant.

294.14. Aliqui scorbiō, alii pleuritin, alii dy
sosmon, alii syluestrem calaminthen, quidam cha
medryn, alii mithridanion, Magi Podotis san-

guinē, Aegyptii apho, Romani trissaginem palustrem appellant.

295.6. Bechion quidam rhichion, alii petrinā vocant, alii peganō, alii pithiō, alii pagonaton, alii chamaleucem, alii procheton, alii arcophyton, alii chamageron, Aegyptii saartā, Latini tusilaginem, quidam pharphariam aut pustulaginem, Beßi asa.

295.21. Quibusdam polyclonos, aliis monoclonos, aliis toxitesia, alius ephesia, aliis anaëtorios, aliis soxusa, aliis leia, aliis licophryx, Magis hominis sanguis, aliis chrysanthemon, Romanis valentia, aut cerpillum, aut herba regia, aut artemisia, aliis rapium, aut tertana, Gallis pona, Dacis xuoſle dicitur.

296.18. Artemisia tenuior. Cap. Altera tenuiorib⁹ foliis, in sepibus et cultis, iuxta aquarū ducl⁹, nascitur: cuius flores et folia cōtrita, sampsuchi odorē reddūt. Si quis stomacho laborās, herbam cum amygdalino oleo bene cōtundat in malagmatis lentorē, et stomacho imponat, sanitati restituetur: qui neruorū dolore cruciantur, si succum ex rosaceo illinant, sanantur.

297.2. Romani caprum syluaticum vocant, quidam botryn, alii apium rusticum, Aegyptii merseon.

297.10. Aliqui Pelonitin, alii tricā, alii geranogeronta, Romani vchinastrum, Aphri iescen appellant.

297.13. aliqui mettryga, alii myrrhin, alii oxiphyllon, alii cardamomo, alii origanum vocant, Magi hierobryncas, Latini gruinama, aut Pulmoniam, aut cieotriam.

297.20. Gimaphalion, alii hires, alii ampeto co, alii anaxiton, alii anaphlin, aegyptii semea, Galli gelafonen, Latini centumculum vocant, quidam tucularem, alii albirum.

298.14. Aliqui cerascomion, alii leucanthion vocitant.

298.22. Conyxa magna. Cap. Conyxa magna aliquibus cynoxematitis, alius danais, alius tanachion, aliquibus phycos, alius ischiis, alius dynosmos, Magi brephoctonos, quibusdam anubias, nonnullis hedemias, aegyptiis ceti, Romanis intybum, aut militaris, aut deliariu, aut febrifuga, alius phragmosa, alius musteros, alius pissanuncupatur.

299.10. aliqui conixam parua, alii panion, alii libanotidem, Magi cronon vocant.

299.16. alii hemerocatalacton, alii crinon agrion, alii crinanthemon, alii porphirantes, alii bulbū hematicon, alii antichantaron, aegyptii iocri, Romani bulbū, aut liliū siluestre, aut marinum, aphri abiblabon vocant.

299.28. aliqui basilion vocant, Latini violam albā, aliqui angustia, nonnulli violam matronalem, aut passarinam, aut polyphuram.

302.17. alii melion aqueum, alii entaticon.

alijs priapicon, aut satiricon, aliqui satyri testiculum appellant, Latini molorticulum Veneris.

302.27. Latinis geminalis, a Dacis hormini dicitur.

303.20. Aliqui osmada, aliqui ononin, alijs phlonstin appellant.

304.21. Hanc nymphona alii vocant.

304.28. Sunt qui picrada appellant, alijs leuten, alijs thalassiam.

305.7. Alii pteryx, alii lonchitim, alijs aturio alii phrygiam, aut phrygitim, aliqui philtrodotem, Magi mustela sanguinem.

305.29. Quidam antihyllō, alii anthemida vocant, alijs erathemin, alijs leucathemon, alii soranthin. alii campestem florem, Romani solastrū.

306.13. Anthemida aliqui leucanthemō, alijs tranthemon, quoniam vere floreat: alii chamamelon, quoniam mali odorem habeat: nonnulli melathemon, alii chrysocomam, alii calliam, Romani malium, Aphri astertiphen appellant.

307.13. Alii anthemida, alii leucanthemon, alii chamamelon, alii chrysocalin, alii melabathron, nonnulli campestem florem, Romani solis seculum, aliqui millesoliū, Hetrusci cautam, Aphri tamath.

307.25. Alii balsamenā, Magi hamorrhā, alii Mercurii geniturā, alii aphthitis semē, aut mnesitheum, Romani Cappacoraniā, Aphri narat.

308.5. Aliis orobelion, quibusdam orobax, aliis.

DIOSCORIDIS

alijs hamagogon, alijs pasaden, alijs monog-
nion, alijs menion, alijs paonion, alijs panthice-
ratos, alijs idai dactyli, alijs aglaophotis, alijs
theodonion, alijs selenion, Magis selenogonon,
alijs phtthisis, Romanis casta.

309.3. Alij agonychon vocant, alij leontion,
alij leonnion lapidem, alij gorgonion, alij tanta-
liti, alij diosporon, Romani columbam, Dacigo-
noletam, alij heracliam.

309.24. Aliqui teuthrion, alij dracanion, alij
cinnabarim, Latini rubiam, Hetrusculappam
norem, Aegyptij sophobi vocant.

310.17. Alias cestron aut medusa dicitur, La-
tine venerea aut lanceola.

310.28. Latini longina, aut calabrinā dicunt.

311.6. Alij althiicon vocant.

312.16. Aliqui canabion, alij schinostrophon,
alij asterion appellarunt.

312.22. Aliqui hydrastinā, Romani termi-
nalem dicunt.

312.23. Aliqui acopon, alij anagyron, alij a-
gnacopon vocant.

312.24. Alij alceam, alij acyron, alij lyron.

314.16. Aliqui onobrochilō, alij eschafmenē,
alij hypericon, alij corion, alij chamæpytin, Ro-
mani opacem, alij bruchilatam, alij loptam, alij
iocinalem, Daci aniaffexe appellant.

315.19. Alij ascyron, aut dionysiadem.

316.16. Alijs pitysorysis, alijs origelō, iis, qui

Potum incolunt olocyron, alijs bryonia sylue-
stris, Athenis ionia, Eboicis sideritis, Magis Mi-
nerua sanguis. Latinis aiuga aut cypricum, Da-
cis dochella appellatur.

320.8. Vettonica. Cap. Vettonica nascitur in
pratib; & montibus, locis mundis, et oppacis, circa
frutices: animas hominum & corpora custodit,
nocturnas ambulationes, & loca sancta: gravi-
bus somnis resistit: ad omnem medendi usum co-
modata. Radice habet rubra, odoratam, porra-
cea folia, medio eorum puniceo, in recto calamo
triangula, floribus in cacumine purpureis. Fari-
na recetis vulneribus capitis indita, dolore finit:
vulnera glutinat: fracta ossa extrahit: sed quo-
tidie imponi debet, dum persanescant: dolori capi-
tis medetur, si iure decoctum persundatur, aut tem-
poribus cum bitumine illinatur, aut radix suffi-
atur.

320.21. Aliqui polygonatum appellat, alijs cy-
nochalam, alijs heracliam, alijs asphalton, alijs chi-
lophyllon: alijs clemas, alijs polycarpon, alijs carci-
ne trhon, alijs theuthalida, alijs myrtopetalon, alijs
cnopodion, alijs Zaritheam, alijs pedalion, Aegy-
ptij thephin, aliqui stemphin, Magi genituram
herois, aliqui unguem muris, Latini sanguina-
riam aut seminalem, Aphrichulum.

321.28. Alijs philetherion, alijs daphnoides,
alijs smyrnoides aut polinogoides appellatur.

322.10. aliqui epigeton, Aegyptij philacium,

Rom

Romani ambuxum vocitant.

323.18. Romani soldaginem vocant.

323.25. Rutaceis similes.

325.2. Alii calycanthemō, alii periclymenon, alii eliophyes, nonnulli hepatitum, alii milacem, alii anatolicon, alii diticon, alii merginem, Latini volucrum, aliqui volucrum maius, Aegyptii oxyui, alii clymenon, alii cymenion, quod & ago non nuncupant.

325.5. Alii tobion, Romani stipam vocant.

325.12. Aliqui Aeginam, alii clymenon, alii carpathon, alii spidenion, alii epatitum, alii axinam maiorem, nonnulli clematitum, alii myrsinen, alii calycanthemon, Magi polion Veneris, Aegyptii turcon, Romani volucrum maius, Aphri lanath appellant.

326.2. Tribulus aliquibus bucephalus, alii tauroceros, Romanis tribul⁹ aquaticus dicitur.

326.23. Sarxiphagon. Cap. Sarxiphagon alii qui sarxiphragon, alii empetron, Romani saxiphragiam vocant frutex est sirculosus in petris & asperis locis nascens epulhmo similis. Coctus in vino, mox potus febricitantibus opitulatur: stranguriae prodesi: singultum sedat: calculos resice frangit, & urinam ciet.

327.2. Aliquibus potamogiton appellatur, alijs neuroides, alijs lonchitis, alijs rapionion, Syrius mendrutha: Syris neuda, alijs lycoemphilō, alijs helleborosemata, alijs scyllisō, Magis lupicor,

Romanis viartū nigrum, quibusdā tintinabulum terra, Gallis iumbaram, Dacis dacina.

327.10. Aliqui leporis cuminum appellant.

327.14. Aliqui medicam appellant alu triphyllon, alii clemation, nonnulli osmon, quidem trigonon, alij cybellion, alij polyphyllon, Romani trifolium odoratum, Aegyptij epaphon.

327.23. Ab alijs erineos, ab alijs thryas, à nō nullis pollyrrhixō, à Romanis vindiēta nominatur.

328.3. Aliqui anaclorion, alij phasganō, alij machæronion, alij arion vocant, Romani gladiolam, quidem genitalem.

328.23. Alii bolum vocant.

328.28. Ab aliquibus iris agria, ab alijs cæcos, à Romanis gladiolus, aut iris agrestis, à Dacis aprus dicitur.

329.16. Anchusam aliqui catanchusam vocant, alij libycam, alij archibellion, alij alcibiadion, alij onophyllon, alij porphyrida, alij mydisam, alu satyca, alii noneam, Aphri buinesath.

330.28. Aliqui aridam, alii alcibiadion, Romani alcibiaticum nominant.

331.13. Aliqui & hanc echio vocāt, alii scorpiuron, alii sparganō, alii altheam, alu amarātida, alii probateam, alii elaphion, alii anthimi nō, alii porphirida, alu augion, alii nemesion, alii phileterion, alii hyenopsolon, alii thyrsitum, alii thermutin, alu misopathos.

331. 22. Aliqui hydreron, aliqui ocymoides.

332. 2. Agrostin aliqui egico, alij amaxitin, Aegyptij amphi vocant, Latini gramen, aliqui asyphyllion, alii sanguinalem, alij vniolam, Hispani aariam, Daci cociatem, Aphri iebal.

332. 27. Magi genituram, aut sanguinē Titani, alij scorpionis vrinam, Pythagoras parmirō, Andreas xāthophanea, Osthānes boepthalmō Aegyptii sendionor, Romani vertemnum, alii soleastron, Aphri vdedonin.

333. 27. Aliqui myriomorphon nomināt, alii chiliophilon, alii stratioticon, alii heracleon, Latini supercilium Veneris, alii acron syluaticum, alii militare, alii millesolium.

334. 12. Batos, ab aliis cinosbatos, ab aliis selinorition, ab aliis asyntrophos, à Magis Titani sanguis, ab aliis ibidis, sanguis, à Romanis rubus ab aliis sentes, à quibusdam mora baticana, à Daci mantia, Aegyptiis hamoos, aliis ametros appellatur.

335. 27. Alii hepatoriū, aut hepatitis, Romani volucrum maius.

336. 13. Pentaphyllō aliqui pētapetes, alii pentatomō, alii pentadatylon, alii pseudoselinū, alii callipetalon, alii xylolotō, nonnulli xylopetalō, alii asphalton, alii pentacanon, alii thymiatitin, Aegyptii orphitebeocem, alii enotron, Magi ibidis vnguē, alii ibidis pennam, alii hermodatyllon, Romani quinquefolium, Galli

pempedulam, Daci propedulam appellant.

337.15. Aliqui rhon, alij anchinopa, alij phœnopteron, alij rhon stachyos, alij obsthalen, Aegyptij athnon nominant.

338.2. Alij rhodida nominant.

338.8. Hippurin, alij trimachion, alij anabasion, alij cheredranon, alij phedran, alij itiaden-dron, alij gis, alij schæniostrophon vocant, Aegyptij pherphran, Magi Saturni cibum, Romani equinalen, alij equi salicem, aut anabasion, alij ephydron.

338.21. Aliqui equition, et alij chedran, alij gynon, Romani salicem equinam appellant.

339.21. Alij scorpion, alij garganon, Romanicornulacam, alij bituensa, Daci saliam, Aegyptij sober, Aphri achæosim.

340.11. Oxyfchænos aliquibus schænos levis alij oxypternos, alij Solis superciliū, Romanis iuncus marinus aut manualis, Aphris chudua dicitur.

341.5. Alij adocetos, alij neuras, alij phrymon, Romanis bouinalis.

341.11. Alij chryfitis, alij chrisantemon, nō nullis amaranton, alij diospogon, Aphris dubath, vel burcumah, Romanis Iouis barba appellatur.

341.18. Aliqui chrysofpermon vocant, alij dajpin, alij origanon, alij arcophthalmō, Romanis arilariam.

342.12. Aliqui chalcitin vocant, alij chalcā
thon, alij chalcantemon, Romani acantham,
Hetrusci garuleum, Aphri churseten.

343.4. Alij trigoniō, alij buniō, alij hierobo-
tanen, alij philtrodotē, Aegyptij pēpsempse, Ma-
gi Iunonis lacrymā, nonnulli mustela sanguinē,
alij sanguinem Mercurij, Romani cristam galli-
naceam, alij pheriam, alij trixalidem, alij exu-
peram, aliqui herbam sanguinalem.

343.16. Alij erigenion, alij chamalycon, alij
sideritin, quidam curitin, alij persephonion, alij
Iouis colū, alij dichromon, alij callesin, alij hippa-
rison, nonnulli demetriada, Aegyptij pēphthem-
phtham, Pythagoras erysiseptron, Romani cin-
cinalem.

344.7. Aliqui chamaefycen, alij gatalē, alij
ionycha vocāt, Romani pinū triniā, aut ficū ter-
re, aliqui glandulam, alij tiūm, alij nonariam.

344.19. Aliqui heloniam, alij porphyraētes,
Romani vaccinium, alij vlcinum vocant.

345.21. Nonnulli oxytonon, Romani papa-
ueralem, Aegyptij nanthi.

345.20. Papauer sativum aliqui chamaefycē,
alij papauer rheada, alij oxytonon appellant.
Romani papauer, Aegyptij nanti.

348.13. Aliqui paraliō, alij sylvestre papa-
uer, alij thalassion, Romani fabulum marinū,
Aphrisissimacem vocant.

349.2. Qui hoc papauer hauserit, non alia

accident, quàm qui opiū ebiberit. Cui eisde succurritur, auxilijs. Semen æstate dum siccum est colligitur. Decoctum radicis bibitur cum vino, sanatq; dysenteriam.

349. 17. Alij pythionion, aliqui diofoyamon vocāt, alij adamāta, alij adamenon, alij hypnion, alij emmanes, alij atomon, nonnulli dithiā briō, Magi, Pythagoras & Osthanes, xeleo, Zoroastres tiphoniō, Magi rhapsōticā, Romani inanoētariam aut appollinarē. Aegyptij saphtho, Hetrusci fabulū, Galli bilinuntiā. Daci dieliā.

351. 8. Aliqui cataphysin, alij cynocephalon, alij chrysalion, alij cynomyā, alij psyllerim, alijsicloticon, Siculi comidun, Romani herbā pulicarem aut silbacium, Aphri vargugū appellāt.

352. 3. Romani strumum vocant, alijsacubulum, Aegyptij allelo, Galli scubulum, Aphri astrismurum vocant.

353. 10. Aliqui dircion appellāt, alijstrychnōmanicon, alijsdorycnion, alijs calliada, Romani apollinarē minorem, alijsilticanā herbam, aut opfagnem, Daci cycolidem, Pæni cacabum.

353. 28. Strychnonmanicon, alijsanydrō, alijs pētadryon, alijs encoron, quidā orthogyiō vocāt.

355. 2. Alij exerāthes, aliqui antimnion aut antimion, alijs bombochylon, nonnulli minon, Aegyptij apemum, Pythagoras antropomorphon, alijsalcten, alijs thridaciā, alijs canmaron, Zoroastres diamonon, aut archinen, Magi hemia,

mionos, aliqui gonogeonas, Romani caninū malum, alij terrestre malum.

358.2. alij cyamō leucon, Romani colomestrū.

358.17. Conion, aliquibus aginos, alijs ethusa, alijs apolegusa, alijs dolia, alijs amaurefis, alijs paralyphis, nonnullis aphron, quibusdā creidiō, alijs cæten, alijs catechomeniō, alijs abioton, alijs apseudes, alijs ageomorōn, alijs timorō, alijs polyanodynōs, alijs dardanis, alijs captasysis Osthani babathy, Aegyptijs apemphi: Romanis cicuta appellatur.

351.21. Aliqui cynanchon appellant, alij paralianches, alij cynomorōn, alij cynoelonon, alij phaleon, alij cynanchen, alij oligoron, alij hippomanes, alij onistin, alij ophioscorodon, alij cynaricam, alij elaphoscorodon, Magi paralyfin, Romani brassicam rusticam aut caninam.

360.5. Alij spongon, alij hamostarin, Romani rhododendron, Lucani icmanen, Aegyptij schimphen, Pœni rhododaphnen dicunt.

362.9. Aliqui elitim vocant, alij canoserceā, alij amelxinen, alij eusinem, alij amorginē, alij sucotachos, alij psychuacos, alij melampelon, alij citampelon, alij cissamethon, alij anatatamenō, Romani volutum laparon, Aegyptij apap, alij parthenion, alij sideritin, alij heracleā, nonnulli agriam quidam clibodion, alij polyonymon.

362.24. Alij myortochon dicunt, alij myorto splenon, Romani muris auriculam: Pœni laba-

tholabat.

363.6. Agriā phacon aliqui, aliȳ epipterom.
Romani viperalem, aliȳ iceosmigdonon vocant.

363.12. Aixoon maius, aliqui aithales, aliȳ
ambrosion, aliȳ chrysispermon, aliȳ xoophtbal-
mon, aliȳ bubophthalmom, aliȳ stergestron, aliȳ
eonio, aliȳ aichryson, aliȳ bolochryson, nonnulli
chrysanthemon, aliȳ protogonon, aliȳ boron, aliȳ
notion: Magi paronichyam, aliȳ chrysitin, Roma-
ni ceriam cuspiā: aut Iouis caulem nomināt, aliȳ
leapetes, aliȳ sedum maius, Aegyptij pāphanes.

364.4. Aixoon paruum, aliȳ petrophyes ap-
pellant, aliȳ brotion, aliȳ theobroton, crobysson,
aliȳ chimerinen, aliȳ ceranniam, Romani vitalē,
aliȳ semperuium, Aegyptij etijceltam.

364.12. Semperuium quod tenui constat fo-
lio, aliqui aixoon paruum, aliȳ petrophyes, aliȳ
aixoon sylvestre, Romani semperuium minus
appellant.

364.20. Aliquibus cymbalion, aliȳ scytaliō,
aliȳ hortus Veneris, aliȳ terra vmbilicus, aliȳ
stæchis, aliȳ stergetron, Latinis vmbilicus Vene-
ris dicitur.

365.11. Acalyphē aliqui enidem, aliȳ aducē, La-
tini vrticam, Aegyptij selepsion, Dacidyn appel-
lant. Acalyphen etiam alteram aliqui eniphen,
Romani vrticam mollem vocant.

366.5. Aliȳ galeobdolō, vel galeophos, Aegy-
ptijs atopi, Latinis vrtica labea dicitur.

366.16. Alijs galation, aut gallerion.

366.26. Erigeron à Latinis herbulum, aut senecio vocatur, aliàs erechthites.

367.13. Marinũ bryon, aliqui ballarin, aliĩ iranen, Latini gnomeusilon vocant.

368.7. Aliàs stachyites, apud Aegyptios ethenchis, Latine fatalis dicitur.

368.13. Aliquibus fluuiatilis stratiotes nũcupatur, Aegyptijs tibis, Magis aluri sanguis.

369.5. Phlomon, aliĩ phlonon, Latini verba scum, aliĩ pheminalem vocant.

371.11. Arcion aliĩ profopida, aliĩ profopion, aliĩ aparinen, Latini personatam, aut lappam appellant.

371.27. Alijs borion appellatur.

371.2. Capnon, aliqui corydalion, aut corion vocant, aliĩ syluestre coridalion, aliĩ capnon in hordeis, aliĩ capniten, aliĩ marmariten, aliĩ capnogorgion, aliĩ chelidonion micron, aliĩ peristerion, aliĩ cantharida, aliĩ chalcocri, Romani apium aut fumariam, Aegyptij enyx, aliĩ tucin.

372.10. Aliĩ tripodion, aliĩ tribolion.

372.15. Aliqui libyon, aliĩ triphyllon.

372.27. Aliqui teline, aliĩ lotum magnũ, aliĩ triphyllon, Romani trifolliũ maius appellant.

373.20. Aliĩ melophyllon, aliĩ stratitice, aliĩ achillion, Latini millesoliũ vocant, aliqui supercilium veneris, Galli beliocandas.

373.29. Aliĩ murham, aliĩ conilen vocant.

374.25. Aliqui buglossum magnum vocant.
Romani spinam mollem.

375.7. Ab aliquibus buboniō appellatur, ab alijs asteriscos, alijs asterion, quibusdam hyophthalmū, Romanis inguinalis, Dacis rathibis.

375.21. Stellares huius radij noctu splēdent, quapropter qui ignari antea non viderunt esse inane, simulacriū arbitrantur. Medijs saxis & asperis exit: inuenitur autem ab opilionibus. Crateuas Rhizotomus hac de ea refert: Si viridis cum axungia vetere tundatur, contra rabioforum morsus, turgentia guttura proderit, suffitu quoque serpentes fugat.

375.29. Aliqui dasypodiō, alijs priapeion, alijs ion sylvestre, alijs cybelion, Romani fetialin, aut murariam, aut violam purpuream vocant.

376.9. Aiunt quod purpureum est in flore, anginis & comitialibus auxiliari, maxime pueris, in aqua potum.

376.18. Aliqui aton, alijs aēlinen, alijs anemosphorō vocāt: magi paradacry, Aegyptii exoē, Rom. scopā regiā, Aphri xigar, nonnulli thepso.

377.6. Alio nomine chamaleuce, alios cissos atarpos, aut terræ corona, aut selinitis, Latine hedera pluuiatica dicitur.

377.21. Magi aluri gonon, Osthanes txauu-chi, Aegyptii autuenrin besor, Romani linguam bubulam, alijs libanium, Pœni asanaph vocant.

378.2. Alijs phyton, alijs caballation, alijs spli-neio

neion, alij scolymon, Romani linguā canis, aut
caninam appellant.

378.15. Aliqui zoonychon vocant, alij aëto
nychon, alij cemos, alij dūnamenē, alij idiophy-
ton, nonnulli phytobasilam, aliqui crossion, alij
crossophthoon, Magi sanguinē crocodili, alij cro-
comerion, Aegyptij daphnænen, Romani miner
ciū, alij palladium, alij pneumatū, alij flāmula.

378.25. Aliqui & id antirrhinon, alij anar-
rhinon, nonnulli lychnida agriam vocant.

379.2. Nonnulli lychnida agriam appellant.

379.10. Cacanance aliquibus damnamete,
alijs dionysias, alijs thyrsion, alijs demos, alijs
cechos, alijs crotion, Magis archaras, alijs arco-
pus, Romanis herba filicula, alijs datisca, Daci
saropichla dicitur.

379.25. Aliqui psychen, alij merida, alij po-
tamogitona, alij stachyiten, Romani caliumma
rem nominant.

380.7. Alij callitrichon, alij trichomanes, a-
lij ebenotrichon, alij argiō, alij corion enygron,
Aegyptij epier, Romani cinnamulem, alij terra
capillum, alij supercilium terræ, Daci phitho-
phthethela vocant.

380.29. Aliqui pterion, alij opterō, Romani
capillarem, alij pinulam, alij fidiculam, nonnulli
& eam adianton appellant.

381.8. Aliqui phasganon, alij antithesion,
alij chascanon, alij chocradolethron, alij & hæc

aparinam nominant, Latini lappam.

381.21. Aliquibus sitospelos, alijs siphon, alijs bromos, Romanis auena dicitur.

381.29. Alij siphonion, alijs acrospelō vocāt.

382.29. Alijs epapitis, alijs lycanthemon, alijs cynosbaton, alijs aniceton, alijs heliophiton, alijs anatolicon, alijs dyticon, alijs helide, Aegyptijs lysthe, Romanis mergina, Hetruscis radia appellatur.

383.26. Alijs hieromyrton, alijs myacātha, alijs agonon, alijs scineos, alijs mintha, alijs catangelos, alijs anangelos, alijs acarōn, alijs ocneron, alijs cinen, alijs lichene, alijs chamæpitys, alijs chamamyrtē, Bæotis gyrenia, Magis Hercules genitura appellatur.

384.14. Aliqui idæan, alijs danaën, alijs hippoglotton, alijs xaliā, alijs stephanen, alijs daphnon, alijs samothracicen, alijs methrion, alijs hy poglossion vocant.

384.24. Daphnoides alypo simile, flos vt nymphææ, cuius medium nuci cypressi non dissimile, in quo semē: aliqui chamædaphnen, alijs peplion, alijs eupetalon vocant.

385.7. Aliqui & hanc Alexandrinā appellarunt, alijs daphniten, alijs hydragogen, Romanis laureolam, alijs lactaginem, Galli vsubim.

385.16. Aliqui ascida vocāt, alijs atomō, alijs pigatoxarin, Magi sanguinē Herculis, alijs polydes, alijs anaphyston, Aegyptij somphia, alijs

vure

vinre, Galli laginum, aliqui anepsa.

386.28. Aliqui melapodion vocāt, alii ecstomon, alii polyrrhizon, alii protion, alii melanorhizon, alii cyranion, Magi xomarition, Aegyptii iscam, alii elaphine, alii cemeleg. Latini veratrum nigrum, alii saraca, Daci prodiorna.

388.18. Aliqui s-samiten, alii sesamin, alii lycocytalion, alii helleborum album appellant.

388.7. Aliqui coronio, alii sesamon sylvestre.

388.6. Aliqui elaterion vocāt, alii grynō, alii balin, alii syncrisin, alii hubalion, alii scopio, alii pherombron, alii peucedanon, alii notion, Romani anacetum, alii agrestem, Pœni cusimexar.

391.25. Satiuus cucumer. Cap. Satiui cucumeris trita radix, & drachma vnius pōdere pota in hydromelite, vomitus ciet. Si quis facillē secundum cœnam vomere velit, binis obolis sit contentus.

391.26. Alii triphyllon, alij stefion, alii astaphida, alii phthiroctonon, alii phthirion: alii apanthropon, alii polyides, alii pseudopathes, alii arsenoten, Aegyptii ibesaxden, Romani herbam pediculariam vocant.

392.15. Aliqui hypopyon vocāt, alii pācranō, alii scammonion, alii thelyterim, Romani ferulaginem, alii ferulam sylvestrem. Pœni bæden.

394.9. Aliqui lygon, alii lobon appellant.

395.19. Aliqui narcisson anydron, alii antoges, alii bulbō emeticon, alii lirion, Romani bul-

tum morbitarium dicunt.

396.9. Alii hippophyes, alii hippophanes, alii
hippion, alii echinon, alii peleciton, Romani lap
pagem vocant.

397.10. Aliqui sesamon sylvestre vocāt, alii
seseli cyprion, alii crotona, Aegyptii systhanna,
alii trixin, magi sanguinem febris, Latini
ricinum, alii lupam.

397.29. Aliquibus cometes, aliis gobios.

401.4. Aliqui clema, alii crambion, alii para
lion, alii canopicon vocant.

402.9. Aliqui sycen, alii mecona aphroden.

403.2. Alii spumosum papauer vocitant.

403.18. Aliquibus scābonia radix, aliis co
lophonia, aliis dactyliō, Romanis colophonium,
Magis apopleumonos, Aegyptiis sanilū dicitur.

405.4. Alii chamalea nigra, alii pyros ach
nen, alii heraclion, alii bdelyram, alii coccon gni
dion, Romani citocacium, nonnulli oleaginem,
quidam oleastellum vocant.

405.16. Alii chamaleam, alii pyros achnen,
alii cestron, aut cneoron vocant.

406.16. Asten alii dendron arctū, alii he
meron, Latini sambucum, Galli scobiem, Daci
sebam vocant.

406.25. Aliis heliosacte, aliis agria acte, aliis
Enboica, Gallis ducone, Dacis olma.

408.2. Nonnulli ischiada, alii cham ebalani
aria, alii lirox ostin, Latini radicem sylvestrē,
Pani

Pænithorpathhsadox appellant.

408.16. Aliquibus *colocyntha* *agos*, alijs *scyapicra*, alijs *Alexandrina* *colocyntha*, *Zoroastri thymbra*, *Osthani autogenes*, Romanis *cucurbita syluatica*, *Dacis tutrastra* dicitur.

409.8. Alij *cedes*, Romani *inuolucrū* vocāt.

410.17. Alij *ophiostaphylon*, alij *chelidoniū*, aut *melothron*, aut *psylothrō*, aut *archezostin*, aut *agrostin*, aut *cedrostin* appellant.

411.26. Alij *chironiō ampelō*, alij *bucraniō*, Romani *oblameniā*, alij *batanutā*, alij *betisalcā*, *Daci priadelā*, alij *pegrinā*, *Aphri lauother.*

412.12. *Pterin* alij *pteriō*, alij *pterineon*, alij *dasyclonon*, alij *anassphoron*, alij *blechnon*, alij *polyrrhizon* vocāt, Magi *hermubain*, Romani *filicem*, alij *laculam*, alij *filisfanariā*, *Aegyptij asini sanguinem*.

412.29. *Thelypterin* aliqui *nymphaā pterin* nominant, Romani *linguam ceruinam*.

413.14. *Polypodion* aliqui *scolopēdrion*, alij *pterin*, alij *polyrrhizon*, Latini *filiculā* vocāt.

414.6. Aliqui *pterion*, alij *nymphaam pterin* nominant.

414.26. Alij *argyrō*, alij *aritrillin*, alij *chrystin*, *Aegyptij aphlopho*, Latini *mercurialem masculam*, alij *tessiculatam*, *Aphri asumes*.

415.11. Aliquibus *linox ostris*, *Aphris armas*, alijs *asumes labon* dicitur.

415.19. Aliqui *scorpiurō* vocāt, alij *heliotro-*

pon, alij dialion, alij heliopon, alij scorpieſtono.
alij ſeſamon agrion, alij ſcorpj vram.

416.12. Aliqui ſcorpiuron vocant.

421.13. Idē adstringit: prodeſt ſtomacho qui
cibi tenax non eſt, aut tardius cibum cōcoquit.
Item ijs qui ilei dolore conſiſtantur: conuenit
in grauidarum malacia: ſorptum auxiliari con
ſtat, cū populatim graſſatur peſtifera lues. Hu
iuſcemodi omphacium non niſi poſt annos mul
tos bibi poteſt.

446.11. Quam alij Medicinā, alij ſymphy
ton, alij idcum phlomon, alij oreſtion, alij neſta
rion vocant.

465.2. Alij larbaſon, alij gynacion, alij Chal
tedonion.

475.21. Alij peſton, hephto, araſto, lochoſo.

524.7. Athenis ionia, in Eubœa ſideriti di
citur. De Rhamno.

Rhamnum ſi quis eruat ſilente luna, & ſe
cum ferat, contra venena & improbos homines
proderit: pecoribus iuuandis appenditur: navi
gijs circumponi ſolet: valet contra capitis dolo
res & laruas.

De Artemiſia.

Artemiſiam herbā ſi quis teneat, dū iter fa
cit, laſitudinē diſcutiet: & ſi in pedibus ferat,
beſtias & lemures abiget: ſi ſanguis circa artus
coaluert, ramulos ex roſaceo in olla ſeruſacito,
& locū totū obſinito, cū ſummo indulgendū eſt:
ſtrang

DIOSCORIDIS

Strangulatui vulua mirum in modum auxiliatur: vrina stillicidia & opisthotonum leuat.

De Pentadactyllo.

Pentadactyllum si quis circum corpus portet, nullo dolore afficietur: oculos, strumas, callosos tonsillarū tumores, vñā, articulosos sub lingua, ueruorū dolores et dētes, p̄forā p̄niciali fame tractā inuat: remoratos à partu menses eijcit: infusa manibus ex aqua tepida contra terrores, fascinū, & laruas, mirum in modum cōmendatur, Vellito herbam cum luna crescit, oriente sole.

De Verbenaca.

Verbenaca recta genitale intendit, sed supina exicat. Recta appensa doloribus oculorum auxiliatur: contra hebetudines eorundem, & capitis dolorem efficax est, trita ex aceto lassitudinem reficit. Strumas, callosos fauciuū tumores, statim discutit: febriuū horrores sanat, si quis solūm ex aduerso stans ramulos tenuerit.

De Dictamno.

Dictamnū siccātū manibus terito, & redigens in farinam adiecta vini stilla, corpus tangito: siquidem contra omnes serpentiuū iniurias auxiliatur: vlcera & putrescentes nomas prapurgans explet: ad actis corpori aculeis oblinitur, vt presenti sit auxilio: ad lienem & in abditis locis nitia inflammatione turgentia, redactum in farinam illinito. Herbam vere, magnis astibus, autumnūq; eruito.

De Salvia.

Salvia singultum tuſſimq; diſcutit: omnibus malis vlceribus cum cera & roſaceo ſumpta auxiliatur: lienis dolorem dyſenteriamq; pota cum vino albo pari modo ſanat, ſanguinem excreantibus, potu medetur: ad extrahēda vuluæ onera efficax eſt: peſſimæ mulieres peſſum ex ea ſubijciunt, vt partus excutiant.

De Cupreſſo.

Cupreſſus herba cōtra raucedines auriculaſq; prodeſt: induratos tonſillarum tumores: aquam inter cutem, & coxendicum cruciatus perſanat.

De Centaurio.

Centaurium contra inflāmata vitia & purſantes iĉtus valet, ſæminis vuluæ malo laborantibus auxiliatur: ſtillicidi j vrinæ, calculorumq; tormenta lenat. Herbā vere oriente ſole legi o.

De Buphthalmo.

Buphthalmum creſcente luna legere oportet. Facit autem cōtra pauores, laruas, & mala medicamenta, faſcinationes, vt potè cum eaſ aduertat. Radicem ſi quis mandat dentem expuet, fluxionemq; conſeſtim ſiſtens auxiliatur: quin & ventrem reſoluit.

De Pæonia.

Pæonia herba per æſtus Canicula ante Solis ortū vellitur: appēſaq; cōtra venena, faſcinū, pauores & laruas prodeſt: item contra febrem cum horrore venientem, diurnā nocturnāq; ve, et ad-

D I O S C O R I D I S

versus tertianam. Proditur lemures à monte, in quo nascebatur, fugasse.

De Moly-herba:

Moly herba si sectare radice feratur, veneficiorum & falcinationis amuletum est.

De Marina quercu.

Marinam quercum cum rosaceo & oleo misceto, & faciē illinito cū ad negotia te cōferes: vegetiores reddit pueros, imo vētri appensa & ad arcēdos pauores nocturnos manu teneto. Contra fascinū, & omnia maleficia prodest: corpus tuetur: cū enim fascinātes recedūt, arescētē ramulū occludit, & cū propius accedunt, aperit.

De Chrysanthemo.

Chrysanthemon si terra ante solis ortū eruat, & collo appendatur, veneficas mulieres omnesque falcinantes amolitur.

De Eryfimo.

Erysimon cum vino tritum, aduersus vētri dolorem bibitur: si quis grana septem domum iniecerit, rixæ & iurgia concitabuntur.

De Helleborine.

Helleborine, aliquibus epipactis, alijs boion dicitur. Frutex est exiguus, minimis folijs constans. Bibitur contra omne venenum, & iocinetis vitia.

F I N I S.

C V R A T I O N V M

M O R B O R V M I N

Dioscoride con-
tentarum

I N D E X.

Abcessum re-
media.

Vinum phthorion, siue
abortivum

MEl
Cucurbita

Vinum heleborites
Conixa.

Thlaspi Mentha

Abortus remedia.

Viscum

Sabina Galbanum.

Bachion siue Tusilago

Aconito contraria.

Pentaphyllon

Balsamum Morus

Buglosson.

Lac schiston Coagulum

Abortum fa-
cientia.

Chamaepitys

Vinum in communi

Asparagus Arisaron.

Scoria, siue recremen-
tum ferri.

Ampeloleuce.

Hedysaron

Diosc. lib. 6. cap. 7.

Populus alba

Aculeos extra-

Oxyacanthos

hentia.

Coagulum

Vide, spicula corpori
infixa extrahentia.

Brassica sativa

Cyclaminos

Aculeatorum ictus.

Dracunculus duplex.

remedia.

Onosma Elaterium.

Laurus: Malua

Scammonium

Sisymbrium Amisum

Thelypteris

Althaa Oxalme

Q Vinum

INDEX

Vinum thymite	Scolimos, siue Car-
Adipum medela	dius Alumen.
Diosc. lib. 2. cap. 68.	Algoris remedia.
Adurentes medi-	Laurinum oleum
cinæ.	Ocimum vnguentū
Buprestis	Cinnamomum
Cantharides	Aristolochia terra
Pityocampa	Abrotonum
Salamandra.	Vinum scilliticum
Aduktionum re-	Elcomel, vel Eleomeli.
media.	Allij acrimoniam
Vide, Ambustorum re-	extinguentia.
media.	Ruta.
Aegilopiæ re	Alopiciæ morbi re-
media.	media.
Asarum Myrtus	Harundo Iuglans
Iuglans Oryza	Auellana
Malua Plantago	Erinaceus terrestris
Myosota, vel myosotis	Hippocampus
altera	Rana Locusta
Baccharis Anthemis	Adeps Fimum
Strychnon satiuū siue	Rhaphanus Beta
Solanum hortense	Cape Milium
Aegilops	Sinapi Cyclaminus
Vua ænanthe Alica.	Asphondelus
Alarum virus extin	Batrachion
guentia.	Miesotis
Myrrha	Nymphaea
Myrtus	Cynoglosson

C V R A T I V V S.

Adianton	Thapsia	Cerasia	Melimela
Aerugo ferri		Citrea mala	Pruna
Sandaracha		Amygdala amara	
Halcionium	Cotes	Morus	Ficus
Cinus vngularum ca- prinarum.		Tellina Chama	
		Iuncus odoratus	
Aluum contur bantia.		Cochlea terrestres	
		Sepia	Silurus
Eruum	Orobis	Pisces saxatiles	
Brassica satina		Lac	Lac schistum
Allium	Capparis	Butyrum	Medulla
Peplus	Vua recentes	Fel	Fimum
Vinum dulce		Tragus	Linum
Aqua maris Flos salis.		Lens	Phaselus
Aluum soluentia at que purgantia.		Rhaphanus	
		Lapathum	
Asarum	Crocus	Nasturtium	
Crocomagma		Eruum	Eruca
Oleum amygdalinum		Scandix	Lactuca
Oleum cicutum		Cucumis	
Oleum balanium		Cucurbita	Atriplex
Oleum cnidium		Brassica satina	
Olea Aethiopica		Brassica marina	
Fagus	Galla	Malua	Blitum
Faba Thebaica		Asparagos	
Siliqua		Porrum	Cape
Messilus	Cornus	Struthion	Zinziber
Ficus Aegyptia		Cyclaminos	Scilla
Caryficus		Bulbus exculentus	

I N D E X

Agaricum	Aloë	Aluum fistantia.	
Absynthium	seriphium	Aspalathus	
Hyssopum		Mastichinum	Laurinū
Ammoniacum		Populus nigra	
Phillitis	Cestron	Populus picca	
Scordion	Chamapitys	Paliurus	Oxyacantha.
Androsamon		Cynosbatos	
Papauer	ceratitis	Cistos	Rosa
Vrtica	Cynoglossum	Acacia	Palma
Spartum		Palma elate	
Balanus	myrepfica siue	Malum punicum	
glans vnguentaria		Malus	Siliqua.
Hippophaës		Cotonea	
Characias	Linoxostis	Mala epirotica.	
Lathyrus	Quercus	Pyra	Messpilus
Chamasyce	Cici	Lotus	Cornus
Scammonium		Sorbus	Pruna syriaca.
Appeloleuce		Lepus terrestris	
Thelypteris	Passum	Lac.	Casem
Melicratum		Fuligo butyri.	
Vinum Albanum		Sanguis	Fimum
Vinum Lesbium		Lyncurion	Triticum.
Cocimela		Brassica sativa.	
Vinum melitite		Hordeum	Plantago.
Thalassomeli		Crininon.	Seris
Vinum absynthite		Bromos	Chondrylla
Vinum helleborite		Oryza	Alica.
Vinum scammonite.		Milum	
Rubrica synopsis.		Faba.	

C V R A T I V V S

Lens	Anethum	Aluinis vtilia.
Apium	Aphace	Coagulum
Smyrnion		Nymphæa
Hippomarathrum		Clymenon
Acantha		Papauer satium
Aloe	Hama	Omphacomeli.
Ruta	Anisum	Amatorijs venefi-
Orchis serapias		cijs attributa.
Peonia	Althæa	Cyclaminos
Polygonon mas		Catanance Doricnion
Lagopus		Cotyledon
Clematis daphnoides		Mandragoras
Xyris	Anchusa	Leontopodion
Gramen Parnasium		Phyteuma.
Rubus Pentaphyllon		Ambustorum
Phœnix herba		remedia.
Idæa radix	Acacia	Asphodelos
Oxyshœnus		Aristolochia
Rubrica sinopis	Althæa	Asyron
Aiζoon		Aiζoon maius
Papauer satium,	Arction	Alumen
Adianton		Atramentū scrip'oriū
Phlomides	Vua	Buccinum Bet a
Vinum phalernum	Cyros	Cistos
Vinum cencæthe		Coriū vslum, siue vete
Vinum passum		rum calceamentorum
Vinum rhoite		Cynoglossum
Vinum myrtite		Cinnabaris
Vinū cedri Vinū lauri.	Ebulus	Fimum

INDEX

Phlomis, siue verbasium	Sal	Viola
Gallion	Hedera Piper	Pix
Hypericon	Helxine Rhabbanus.	
Latua sylvestris	Anhelitus difficulta	
Lilium	Myrtus	tis remedia.
Morus	Malua Asarum	Balsamum
Narcissus	Naphtha	
Olinæ colymbades	Centaurium maius	
Ouum	Picea Baccaris Peucedanum	
Platanus	Plantago Galbanum Parthenia	
Sesamum	Stimmi Adianton	
Sal	Thus Ampeloleuce.	
Vnguentum felinum.	Et infra in verbo Or-	
Amphisbænæ mor	thopnoicis.	
sus curatio.	Animalium feritas	
Dioscori. lib. 6. cap. 64.	mitigatur.	
Anginæ remedia.	Oenagra.	
Acetum	Ani remedia.	
Absynthium	Vide, Sedis remedia.	
Cyprinum vnguentum	Animalia vëtris ex-	
Cedria	Cape	pellentia.
Crocodilium	Vide, Tineas latas pel-	
Elaterium	lencia.	
Fel animalium	Animalia quæ peri-	
Fimum	Hirundo	munt.
Hissopus	Irinum Diosco. lib. 6. in prasa-	
Laserpitium	tionis sine.	
Mel	Oxymel	Animalium ictus re-
Spartum siue genista	media.	
	Bdellium	

C V R A T I V V S.

Bdellium	Caros	Anethum
Panaces heracleon	Petrocelinon	
Terra lennia	Hedysaron	
Disco.lib.6.cap.55.	Mandragoras	
Animi defectus re-	Rubrica, siue terra le-	
media.	mnia.	
Cucumis	Pulegium	Apum ictus re-
Coris.		media.
Animi voluptates	Laurus	Malua
auget.	Sisymbrium	
Buglosson.	Althaa	
Animi deliquia ge-	Diosc.lib.6.cap.57.	
nerantia.	Apostematum re-	
Diosco.lib.6.in prafat.	media.	
Anodyna.	Vide, Suppurationum	
Hyociamus	remedia.	
Aconitū pardiliāches.	Appetitum gene-	
Antidotum ingre-	rantia.	
dientia.	Cerasia.	
Acorus	Phu	Appetitum inci-
Amomum	Costum	tantia.
Iuncus odoratus	Vinum in communi	
Cyphi	Vinū Selenite.	
Scincus, siue singus	Aquæ inter cutem	
Sanguis Rapa satina	remedia.	
Napum, siue bunias	Vide, Hydropicorum.	
Brassica satina	Araneis contraria.	
Piper	Abrotonum	Morus
Stichas,	Ruta	Melanthion.
		Grossi

INDEX

Aranei ictus	Vinum absinthite.
remedia.	Accenici, siue auripi
Mullus piscis	gmeni curatio.
Allium	Diosc. lib. 6. cap. 29.
Melissophyllon	Articulorum mor-
Coris Oxychaenus	bis vtilia.
Hiacinthus	Amurca Anethinum
Aizoon maius.	Agaricum Arction
Argenti viui	Bulbus esculentus
curatio.	Centaureum minus
Diosc. lib. 6. cap. 28.	Cinis vitium
Argematum morbi	Helleborus niger
remedia.	Scammonium
Fel animalium	Mandragoras
Vrina	Meon Naphtha
Lactuca sylvestris	Nardus Narcissus
Cera Argemone	Ouum Oxymel
Anagallis Ocimum	Palma elate
Papauer ceratitis	Pentaphyllon
Lotus satina.	Psyllium
Arquatorum re-	Ruta Thapsia
media.	Thymoxalme
Onos siue mille peda	Vua passa
Asparagus	Vinum melitite.
Cyclaminos	Arteriz remedial.
Sphondylion	Irinum
Oenanthe	Myrrha
Buphtalmos	Thus
Chrysanthemon	Caryota, siue caryoti-
	des

C V R A T I V V S.

des		Terebinth ⁹	Fuligo picis
Ficus	Sinapi	Cipressus	Iuniperus
Prason, id est porrum		Vlmus	Paliurus
Glycyrrhiza		Cyprus	Lilia
Triticum		Cistos	Hypocistis
Rhaphanus		Cidonia	Rosa
Lacerpitium		Acacia	Salix
Pentaphyllum		Vitex	Olea sylvestris
Vua passia Rhodomeli		Quercus	Castanea
Tragacantha.		Galla	Thus
Aspidum morsus re-		Palma	Palma elate
media.		Malicorium	Mirtus
Cimices lecti		Myrtidanum	Malus
Butyrum Clematis		Cotonea	Persica
Daphnoides		Pyra	Pyra sylvestria
Aqua maris		Mespilus	Mespilus alia
Diosc. lib. 6 cap. 70.		Cornus	Morus
Astrictoriae me-		Lixivia ex ficu	
dicinae.		Ionia siue Cionia	-
Aspalathus		Adeps	
Bryon	Crocus	Adipum medicina	
Oleum omphacinum		Faba Aegyptia	
Oleum ex oleastro		Lens	Portulaca
Mirrha		Seris	Porrum
Vnguentum melinum		Hedera	Myosotis
Vnguētum cōnāthinū		Agaricum	
Cortex thuris		Rhaponticum	
Picea acpinus		Gentiana	Ab sythiū
Pityides	Lentiscus	Ab synthium	seriphū
		Qs	Mentha

INDEX

Mentha	Melilotus	Vinum tragoriganite
Maron	Ruta	Vinum prasite
Cuminum satium		Vinum calamithite
Hieracium maius		Vinum aromatite
Goniza tertium genus		Spuma argenti
Lisimachium		Chrisocolla
Clymenos	Anchusa	Cinnabaris
Idea radix		Chalcantō Diphryges
Granum tinctorum		Arsenicum Sal
Chrysocome		Fax vini Spongia
Aizoon maius		Lapis Phrygius
Phlomidis		Lapis Afius
Lotus sylvestris		Lapis scissilis
Ebulus	Passum	Terra eretria
Vitis sylvestris		Lapis Samius
Nuclei acinorum		Fuligo pictoria.
Vua ænanthe		Assulas fixas corpo-
Omphacium		ribus extrahētes.
Vinum omphacite		Cochlea terrestres.
Vinum nigrum, è la-		Attonitis vtilia.
brusca		Ampeloleuce.
Vinum cydonite		Auruginem tol-
Omphacomeli		lencia.
Vinum apitie		Licium Agaricum
Vinum myrtite		Libanotis coronaria.
Vinum palmeum		Auricularum re-
Vinum è cedro		media.
Vinum pisite		Bulbus exculentus.
Vinum absynthite		Aurium medicinæ.

Cauna

C V R A T I V V S.

Cannabis sativa	Oleum balaninum	
Araneus	Oleum hyoscyaminum	
Adipum medicina	Olea sylvestris	
Astrodellus	Onos	Origanum
Absynthium	Anisum	Omphacium Elix
Aparine	Aqua maris	Populus alba
Acetum	Plantago	
Acetum scilliticum	Porrum	Peucedanum
Alumen	Aphronitrum	Prasion
Blatta	Beta	Polygonon mas
Crocus	Cistos	Papauer sativum
Cornix	Cucurbita	Psyllium
Cape	Capparis	Rhus obsoniorum
Cucumis anguinus	Rosa	Salix
Daphnides	Senecla	serpentis
Dracunculus maior	Sesamum	Sinapi
Ficus	Spondylium	Stæbe
Fel animalium	Strychnum	sativum
Faba Aegyptia	Sulphur	
Flos aris	Flos salis	Thus cum pice
Hedera	Helxine	Terebinthina
Irinum vnguentum	Vermes	Vrina
Hyssopus	Laurinum	Vinum myrteum, siue
Lycium	Lapation	my: finite
Malum punicum	Vinum cedrites.	
Myrtus	Mel	B Dellarum, siue hi- rudinum cu- ratio.
Myosotis	Mentha	
Melilotus	Myrrha	
Oleum amygdalinum	Diosc. lib. 6. cap. 32.	

Best

INDEX

Bestias fugan- tia.	Elaterium	Ebulus
Achantaleuce, siue spi- na alba.	Epithymum	Empetron
Bestiarum venenata rum remedia.	Helenium	Hippophaes
Balsamum.	Heliotropium	
Bestiarum morsus re media.	Iru Illyrica	
	Lychnis sylvestris	
	Lathyrus	Lincoxostis
	Malus	Melanthion
	Mentha	
Helenium	Aegyptium	Mandragoras
Sanguis	Porrum	Ocymum
Allium	Argemone	Peplus
Eryngion	Pulegium	Thlaspis
Apium vinum	cedrite	Thymelaea
Sal	Terra samia.	Vitis sativa
Bilem agene- rantia.	Vnguentum susinum id est, lilij.	
Iuglans.	Blattas in se contra- hencia.	
Bilem purgan- tia.	Phlomis.	
Agrio raphanus	Boum scabiem emen- dantia.	
Androsamos		
Anchusa	Apios	Cedria.
Brassica canina	Bronchocelas discuti- entia.	
Calaminth		
Clematis	Cici	Vide gutturi remedia.
Cucumis anguineus	Buprestis veneni re- media.	
Characias	Chamaelea	
Helleborum nigrum	Lac schiston.	

C V R A T I V V S.

Dioscorides libro sexto cap. 3.	Centaureum maius	Bdellium	Daphnides
C Achexiæ, id est	Paliurus	Pruna	
maciei remedia.	Fimum	Lapathon	
Aqua maris.	Sisymbrium	Ononis	
Cachoethe reme- dia.	Cyminum sylvestre	Artemisia	
Unguentum rosaceum	Hippomarathon		
Crocinum	Thus	Asplenon	Anthemis
Glandes	Ficus	Parthenion	Peonia
Cicer	Plantago	Lithosperma	
Dracunculus maior	Althæa	Tribulum	
Dracunculus minor	Saxifragum		
Hedera	Viscum	Gramen	Tragium
Asclepias	Psylum	Acanthus	
Urtica	Petasites	Cotyledon prima	
Cadinia	Diphryges	Vitis sativa	
Flos salis.	Myrtus sylvestris		
Calcis curatio.	Oxalme		
Diosco. lib. 6. cap. 29.	Lapis Iudaicus	Ochra	
Calculi remedia.	Lapides spongiarum.		
Cyperus.	Calefactoriæ medi- cinæ.		
Cardamomum	Adipum medicina		
Oleum amygdalinum.	Medulla animalium		
Cerasia	Fel.	Cera	
Amygdalus amara.	Propolis	Triticum	
Osisfragus.	Sion	Rhaphanus	
Urina	Rhaphanus agria		
Struthion.			Sisynt.

I N D E X

Bisymbrium		nam	
Sisymbrium aquaticum	Irinum	Gleucinum	
Sin. pi	Nasturtium	Amaracinum	
Thlaspi	Erysimon	Metopium	
Piper	Zingiber	Stacte	Nardinum
Dracunculus maior		Malabathrinum	
Dracunculus minor		Myrrha	
Asphodelus		Myrrha Bæotica	
Bulbus esculentus	Syrax	Bdellium	
Agaricum	Gentiana	Thus	Terebinthus
Anonis, siue Ononis	Resina	Palimpissa	
Eryngion	Absynthium	Iuniperus	
Absynthium	Seriphium	Sabina	Cedria
Hyssopum	Origanum	Cedrides	Laurus
Tragoriganum		Daphnides	Cyprus
Pulegium	Mentha	Cistofalia	Vitex
Serpyllum	Sampsuchum	Amygdala amara	
Maron	Aspalathus	Ficus	
Crocomagma		Lixiua ex ficu	
Helenium		Cisseris	
Oleum vulgare		Cochlea terrestres	
Oleum sicyonium		Fiber	
Strigmenta gymnastorum & palæstrarum		Buprestis pityocampa	
		Salamandra	
Elaomeli	Laurinum	Oesypus	
Sampsuchinum		Panaces Ieraction, siue	
Ocyminum		herculeum	
Anethinum	Susinum	Ligusticum	
Cyprinum, siue ligustri-		Seseli Massiliense	

CURATIVVS.

<i>Sifon</i>	<i>Anisum</i>	<i>Lana succida.</i>
<i>Caros</i>	<i>Anethum</i>	<i>Caliginis oculorum</i>
<i>Cuminum satium</i>		<i>remedia.</i>
<i>Ammi</i>	<i>Oreoselinon</i>	<i>Fel animalium</i>
<i>Smyrnion</i>		<i>Lactuca syluestris</i>
<i>Hippomarathrum</i>	<i>Ocymum</i>	<i>Cape</i>
<i>Daucus</i>	<i>Libanotis</i>	<i>Dracunculus maior</i>
<i>Laserpitium</i>	<i>Galbanum</i>	<i>Sinapi Nasturtium</i>
<i>Ammoniacum</i>	<i>Stachys</i>	<i>Erysimon Piper</i>
<i>Scordion</i>	<i>Artemisia</i>	<i>Zinziber</i>
<i>Anthemis</i>	<i>Chrysocome</i>	<i>Dracunculus minor</i>
<i>Portulaca agrestis</i>		<i>Anagallis</i>
<i>Lotus syluestris</i>		<i>Chelidonium maius</i>
<i>Vinum picatum</i>		<i>Sagapenon</i>
<i>Vinum in communi</i>		<i>Chamadrys</i>
<i>Aqua maris</i>		<i>Chamaesyce</i>
<i>Vinum è cedro, arbori-</i>		<i>Flos aris</i>
<i>busq; alijs</i>		<i>Pumex Fex vini</i>
<i>Vinum è cypresso</i>		<i>Laputhyites.</i>
<i>Vinum cedrite</i>		<i>Callorum reme-</i>
<i>Vinum chamadryite</i>		<i>dia.</i>
<i>Aerugo auriscum</i>		<i>Triticum Laserpitium</i>
<i>Chrysocolla</i>		<i>Chalcitis lapis.</i>
<i>Chalcanthon</i>		<i>Cancrescentibus vl-</i>
<i>Alumen</i>	<i>Sulphur</i>	<i>ceribus mede-</i>
<i>Flos salis</i>	<i>Pyrites</i>	<i>tur.</i>
<i>Lapis hematites.</i>		<i>Vrtica.</i>
<i>Calefactorum re-</i>		<i>Canes occidentia.</i>
<i>media.</i>		<i>Asparagus Apocynon.</i>
		<i>Can</i>

INDEX

Canis rabiem sanat.	Bulbus esculentus	
Alyssum.	Mentha	Ebulus.
Canis rabiosi morsus	Canis impetum cohi	
remedia.	bentia.	
Lycium	Cancro Iecur & dens canis.	
Cinis vitium	Garum Canes necantia.	
Omotarichos	Chamaeleon albus.	
Smaris	Canum scabiem e-	
Iecur ardens canis	mendantia.	
Triticum	Sanguis Oleum lentiscinum	
Mel	Grossa Cedria,	
Panaces heracleon	Cantharides fu	
Cape	Laserpitium	gantia.
Vrina	Vnguentum melinum.	
Aster atticus	Cantharidum vene-	
Meliosphyllon	ni remedia.	
Vrtica	Cynoglosson Lac sciston	
Feniculum	Adipum medicina.	
Balote	Oxalme Diosc. lib. 6. cap. 1.	
Aphranitrum, siue spu-	Capillorum defluuii	
manitri.	reprimentia.	
Diosc. lib. 6. cap. 37.	Oleum ex oleastro.	
Herm. Coroll. cap. 212.	Myrrha	
Canis nō rabidi mor-	Cistos alia, siue bidanum	
sus remedia.	Brassica sativa Myrtus.	
Amygdala amara	Nasturtium	
Iuglans	Ficus Aloë	Adiantum.
Mituli	Gobius	Capillum denigran-
Cucumis		tia.

Cape

CVRATIVVS.

Capressus		Balsamum	
Fagus	Ilex	Oreum ex oleastro	
Palma elate		Oleum amygdalinum	
Myrtus	Hedera	Vnguentum rosaceum	
Elebiphacos	Rubus	Telinum	
Vinum myrtite.		Narcissinum	Thus
Capillum rufan-		Myrrha	
tia.		Vrina	Fœnogræcum
Cyprus	Lycium	Cicer	Linum
Lotus	Fax vini.	Malua	Allium
Cipillum flauum red-		Cyclaminos	
dentia.		Bulbus esculentus	
Aqua maris.		Melilotus	Lilium
Capillum purgan-		Bettonica, siue Britan-	
tia.		nica	
Fœnogræcum		Xyris	Rubus
Linum.		Rubus idæus	Oxalme
Capillos tingen-		Vinum myrsinite	Sal.
tia.		Capitis doloris re-	
Acacia		media.	
Myrtus	Morus	Iris yllirica	Asarum
Stratiotes terrestres		Meon, siue meu	
Ebulus		Oleum oleastri	
Terra ampelites.		Oleum amygdalinum	
Capillos nutrien-		Vnguentum rosaceum	
tia.		Narcissinum	Cyprus
Iugrans.		Rosa	Vitex
Capitis vlcerum re-		Amygdala amara	
media.		Torpedo.	

R

Lac

Lac humanum	Capitis dolorem fa-
Lana succida	cientia.
Curmi	Sisymbrium Stirax Oliva
Sesamum	Hedera Glandes Palma
Portulaca	Aloë Arbutus Juglans
Mentha	Serpyllum Eruum Absinthium
Baccaris	Ruta Men siue meon Ferula
Sphondylium	Anisum Peucedanum Mādragora
Peucedanum	Vinum gypsatum
Melanthion	Vinum phœnicite
Conixa maior	Vinum rhetinite
Anagyris	Bettonica Vinum mesagite.
Radix hederae	Caput purgantia.
Oxyphnos	Bsylium Anemone
Papauer rhœas, siue erra-	Brassica sativa
ticum	Beta Caps
Strychnon, siue solanum	Chelidonium minus
sativum.	Chalcanthum
Aixoon maius	Cyclaminos Origanum.
Hippoglosson	Carbunculorum
Chama daphne	medicinæ.
Myrtus siluestris	Brassica sativa.
Elaterium.	Cupressus
Scammonium	Cinnamomum.
Vitis sativa	Vinum Cyprus
Vua cenanthe.	Coriandrum Characia
Aqua maris	Eruum Fimum
Acetum scilite.	Juglans
Lapis ophtes.	Lupinum sativum

C V R A T I V V S.

Laserpitium	Nasturtiū	Dracunculus minor	
Olea syluestris		Aristolochia tertia	
Pix	Plantago	Vrtica	Caliopsis.
Panaces heracleon		Cafeus ne cariem	
Sabina	Vua passa.	fentiat.	
Cardiacorum re-		Dracunculus minor.	
media.		Caua implentia.	
Buprestis		Cadmia	Pompholyæ
Seris	Rubus.	Cerussa	
Carnem tenerio-		Lapis schistos	
rem reddentia.		Lapis morosethus	
Vrtica siue acalyphe.		Terra samia	
Carnem coalescere		Fuligo thuris	
facientia.		Aristolochia tertia.	
Lixiua ficus		Cæpæ acrimoniam	
Symphyton.		retundit.	
Carnes superuacuas	Ruta.		
compescentia.		Cærastæ ictus re-	
Characias	Cadmia	media.	
Aes vstum	Flos aris	Cedria, siue cedrinus li-	
Laserpitium	Lana vsta	quor	
Lapis Asius		Harundo	
Spuma argenti	Smaris.	Rosa	Sul
Carcinomatum re-		Dioscor. libro 6. cap. 55.	
media.		& 69.	
Fuligo thuris		Cerussæ curatio.	
Buprestis	Cicer	Dioscor. lib. 6. cap. 22.	
Erysimon		Cerionum vlcera	
Dracunculus maior.		remedia.	
		R. 2. Crostæ	

INDEX

Croſſi	Pepo Faba	Fax vini
Quare , Fauos rum-	Oleum myrtinum	
pentia.	Oleum Balaninum	
Ceruicis rigoris me-	Oleum cicinum	
dicina.	Olea Aethiopica	
Vide , Opisthotonico-	Peucedanum	
rum remedia.	Plumbum elotum	
Chironicorum vlce-	Pumex	
rum remedia.	Scoria argenti.	
Plantago	Cicutæ contra-	
Ampelolence.	ria.	
Cholericis,vti-	Passum & vinum	
lia.	Vinum in communi	
Cotonea mala	Acorum	
Calamintha	Hermo. Cor. cap. 17.	
Ferrum	Mentha Cimices fugantia &	
Polygonon mas.	necantia.	
Cicatricum reme-	Hermo. Cor. cap. 366.	
dia.	& 806.	
Anemone	Clauorum reme-	
Aloe	Adeps dia.	
Bulbus esculentus	Smaris	Fimum
Balanus myrepſica	Laſerpitium.	
Cistos	Centaurium Coeliacorum reme-	
Chamaſyce	Calx viua dia.	
Corallium	Aes vſum Myrrha	Hypociſſu
Aeris. floſ.	Licium	
Aerugo aurificum	Olea ſylueſtris	
Fuligo butyri	Quercus aut robur	
	Galla	

CYRATIVVS.

Galla	Thus	Acetum	scillite
Myrtus	Cotonea	Buphtalmos	
Morus		Cerussa	
Lixinia ex ficu		Cuminum	satium
Ceruinum cornu		Lasertium	
Faba Aegyptia		Mastichinum	
Lapathon		Vnguentum	rosaceum
Plantago Coronopus		Vinum	
Rhaponticum		Vinum aromatite.	
Acantha leuce, siue spi		Collectionum	
na alba		remedia.	
Ferula	Lasertium	Amomum	
Tragos herba		Vnguentum	telinum
Papauer satium	Zopissa	Naphtha	
Vinacei	Nyrica	Paliurus	
Nuclei vinaceorum	Cyprus	Olea sylvestris	
Elcomeli	Glandes	Morus	
Vinum phoenicite	Grossi	Ouum	
Vinum rhetinite	Triticum	Hordeum	
Ferrum	Fænogracum		
Lapis morochthus.	Linum	Cicer	
Coli remedia.	Agriorhaphanus		
Colocynthis	Plantago	Sonchos	
Fimum	Galerita	Nasturtium	
Mel	Petroselinum	Bulbus esculentus	
Ruta	Sesamum	Argemone altera	
Talus suis.	Rhaponticum		
Colorem commen-	Acantha leuce		
dantia.	Thymus	Coriandrum	

INDEX

Smyrniūm	Plantago	
Libanotis	Viscum	Eryngion Ruta
Parthenion	Seseli	Maßiliense
Cannabis syluatica	Libanotis	
Anagyris syluatica	Spondylion	
Helxine	Peucedanum	
Pentaphyllon	Lasertitium	
Peristerion supinum	Galbanum	
Papauer satium	Sagapenum	
Stratiotes aquaticus	Ammoniacum	
Cytisus	Trifolium	
Ampelos leuce	Conyza	Amryllis
Vinum in communi	Symphiton	Cestron
Vinum adynamon	Pentaphyllon	
Vinum cidonite.	Papauer aphrodeles	
Comitialis mor-	Viola purpurea	
bi remedia.	Helleborum nigrum	
Cardamomon	Hippophastron	
Balsamum	Naptha	Ampelos leuce
Populus nigra	Ficus	Ampelos melana
Iuncus odoratus	Oxymel	
Lepus terrestris	Acetum scillite	
Mustela	Iecur	Lapis selenites
Vnguis asini	Lapis aetites	Coteli
Lichen equi	Conceptioni con-	
Iecur hirci	Hirundines	traia.
Serum	Lac humanum	Epimedium
Coagulum	Fel Heliotropium	maius
Sanguis	Fimum	Aerugo ferri

C V R A T I V V S.

Alumen	Iris Illyrica		
Lapis ostracites	Acorus		
Hermo. Cor. cap. 267.	Cardamomum		
Conceptionem	Asarum	Costus	
facilitantia.	Iuncus odoratus		
Coagulum	Lolium	Balsamum	Helenium
Staphylinos agrios	Calamus odoratus		
Lapis samius.	Sampsuchinum		
Concocticni vtilia.	Metopium		
Anethum	Althæa	Bdellium	Iuniperus
Acetum scillite	Cedrides	Halimos	
Balsamum	Crocus	Lixivia à ficu	Fimum
Crocomagma	Dracunculus maior		
Caros	Cestron	Dracunculus minor	
Calx viua	Eruca	Asphodelus	
Ligusticum	Pulegium	Capparis	Argemone
Papauer satium	Rhaponticu	Gentiana	
Resina	Styrax	Aristolochia tertia	
Seseli Massiliense	Centaurium maius		
Sulphur	Vinum	Acantha leuce	
Vinum resinatum	Abrotonum		
Vinum absynthite	Origanum	Pulegium	
Vinum tragoriganite.	Calamintha	Serpyllū	
Constrictoriæ	Baccharis		
medicinæ.	Panaces heracleon		
Vide, Adstrictoriæ me-	Libanotis	Peucedanū	
dicinæ.	Laserpitiū	Sagapenon	
Convulsionis re-	Galbanū	Clinopodium	
media.	Chamaedrys		

INDEX

<i>Alisma</i>	<i>Cestron</i>	<i>Corpora defuncta à</i>
<i>Xyris</i>	<i>Symphytum</i>	<i>corruptione diu</i>
<i>Psyllium</i>	<i>Phlomidis</i>	<i>tuetur.</i>
<i>Ampeloleuce</i>		<i>Cedria.</i>
<i>Vinum scilliticum</i>		<i>Corpus macre-</i>
<i>Vinum chamædryte</i>		<i>scientia.</i>
<i>Vinum tragorigantia</i>		<i>Canchamum.</i>
<i>Vinum daucite</i>		<i>Coxæ doloris re-</i>
<i>Vinum panacite.</i>		<i>media.</i>
<i>Condylomatum</i>		<i>Strigmēta à palæstris.</i>
<i>remedia.</i>		<i>Coxendicum dolo-</i>
<i>Strigmenta à balneis</i>		<i>ris remedia.</i>
<i>Myrtum</i>	<i>Myrtus</i>	<i>Asparagus</i>
<i>Cotonea</i>	<i>Ouum</i>	<i>Agaricus</i>
<i>Aloë</i>	<i>Anethum</i>	<i>Abrotonum</i>
<i>Libanotis</i>		<i>Aster</i>
<i>Ballote</i>	<i>Stachys</i>	<i>Atticus</i>
<i>Phalangion</i>		<i>Acetum scilliticum</i>
<i>Pentaphyllon</i>		<i>Centaureum minus</i>
<i>Vitis sativa</i>	<i>Ferrum</i>	<i>Calamintha</i>
<i>Plumbum elotum</i>		<i>Coris</i>
<i>Sandaracha.</i>		<i>Cestron</i>
<i>Cordis tremoris</i>		<i>Cucumis sylvestris</i>
<i>medicinæ.</i>		<i>Erysimon</i>
<i>Nardi spica.</i>		<i>Euphorbium</i>
<i>Coriandro con-</i>		<i>Fimum</i>
<i>traria.</i>		<i>Garus</i>
<i>Vinum incommuni</i>		<i>Helenium</i>
<i>Dioscor. lib. 6. cap. 9.</i>		<i>Ammoniacum</i>
		<i>Hypericon</i>
		<i>Hiberis</i>
		<i>Heliochrysos</i>
		<i>Iris Illyrica</i>
		<i>Lolium</i>
		<i>Lupi</i>

CURATIVVS.

Lupinum sativum	Plumbum vstum.
Laserpitium	Cutem albicantia.
Laphtha	Onos Rapum sylvestre.
Populus alba	Cutem erugantia.
Panaces heracleon	Oleum amygdalinum
Pencedanum	Styrax.
Pentaphyllon	Ruta Cutem lenientia.
Scammonium	Amygdala amara
Vinum asarite Xyris.	Oleum sicyonium
Crafsitudinem ex-	Vnguentum telinum
tenuantia.	Succus peponis
Porrum	Terra Chia.
Staphis agria.	Cutis vitia tol-
Croceum colo-	lentia.
rem facit.	Adarce Ampelos leuce
Rhaponticum.	Amygdala amara
Cruditatis re-	Cochlea terrestres
media.	Costus
Balsamum	Chamaleon niger
Strigmenta à balneis	Iris Illyrica Lac
Gentiana	Ficus Linum
Vinum scilliticum.	Lupinus
Cruftas generat.	Lotus sylvestris
Lana vsta.	Mel Ponticum
Culices fugantia.	Oleum raphaninum
Cupressus	Picea Sanguis leporis
Conixa	Ebulus Spuma argenti.
Absynthium	Cutis pruritus
Hiberis	remedia.
	R s Lac

INDEX

Lac.		Myrica	Morus
D	Entium dolo-	Melanthion	
	ris remedia.	Melissophyllon	
Amurca	Halicacabus	Naphtha	
Asparagus		Olea Aethiopica	
Allium	Anagallis	Picea	Plantago
Aristolochia		Panaces heracleon	
Acantha leuce		Pyrethrum	
Absynthium		Pencedanum	
Arction	Acetum	Pentaphyllon	
Acetum scillite		Rhus	Rana
Alumen	Batrachion	Sepia	
Cedria	Cytinus	Senecla serpentis	
Cochlea terrestres		Strychnon hypnoticon,	
Capparis		sive somniferum	
Chelidonium maius		Vnguentum rosaceum	
Chamaleon niger		Vermes terreni.	
Clematis daphnoides		Dentium stuporis	
Cucumis anguinus, si-		remedia.	
ue sylvestris		Portulaca.	
Characias colocynthis		Dentitioni infan-	
Ephemeron		tium utilia.	
Helleborus niger		Leporis cerebrum	
Ficus	Galba	Butyrum cum melle.	
Galbanum	Hedera	Dentifricia.	
Hyoscyamus		Purpura Buccinum	
Hyssopus		Cervinum cornu	
Laserpitium		Halcyonium	
Lentacantha		Corallium.	

CYRATIVVS.

Dentibus stuporem adferentia.	stillationis remedia.
Cadmia.	Dilacrymationes emendantia.
Dentes firmantia.	Picea Pinus.
Lentifus	Discuffloriæ me- dicinæ.
Oliuæ colymbades	Androsamon
Myrrha	Althæa Viscum
Oleum omphacinum.	Galbanum
Dentes albicare facit.	Ammoniacum
Halcyonium.	Lapis Gagates.
Dentes vitiatos extrahentia.	Dolorum inuetera- torum remedia.
Amurea	Sinapi Lana succida
Oleum oleastri.	Ligusticum.
Dentes mouentia.	Dolores lateris.
Oleum oleastri.	Vide, laterum dolores.
Depiles facientia.	Dolorem ne sentiât qui vrendi se cau- dive sunt.
Scolopendria	
Characias.	
Desquamatis vtilia.	Mandragoras
Strigmenta gymnasto- rum	Lapis memphites.
Lana succida.	Dorycnij curatio.
Destillationes	Diosc. lib. 6. cap. 6.
coërcentia	Draconis marini mortuus.
Irinum	Syrax Mullus piscus
Naphtha	Urina
Et in verbo, Pituita de Olymum	

INDEX

Absynthium	Sanguis	Smyrnion
Plumbum elotū & cre	Terra cimolia	
matum	Vinacei.	
Sulphur	Dysentericorum	
Diosc. lib 6. cap 61.	remedia.	
Dyrini morsus	Adipum medicina	
curatio.	Asparagus	Argemone
Diosco. lib. 6. cap. 65.	Agaricum	
Duritiem emol-	Althea	Alcea
lientia.	Alisma	
Amaracinū vnguentū	Aizoon maius	
Bdellium	Butyrum	Cupressus
Buphthalmos	Cotonea	Cornu
Cyprinum	Ceruinum cornu	
Capparis	Coagulum	Cera
Erysimon	Aegilops	Clematis daphnoides
Ficus	Fimum	Elatine
Glans	Galiopsis	Eupatorium
Hydropiper	Fœnograecum	
Ammoniacum	Faba Aegyptia	
Lens	Linum	Ferrum
Lapis alabastrites	Omphacium	Galla
Megalum Melanthion	Hypocystis	
Mandragoras Porrum	Hedera	Hippuris
Panaces heracleon	Lentiscus	Lycium
Pentaphyllon	Lotus	
Paronychia	Lixivia ex fico	
Pyrites	Lac schiston	
Styrax	Linum	Lapathum
		Lysi

C V R A T I V V S

<i>Lysimachia</i>	<i>mara</i>	
<i>Myrrha</i>	<i>Macer</i>	<i>Brassica sativa</i>
<i>Malum punicum</i>		<i>Abfynthium.</i>
<i>Melissophyllum</i>		<i>Elephantiaē re-</i>
<i>Naphtha</i>		<i>media.</i>
<i>Nymphæa</i>		<i>Cedria</i>
<i>Nuclei acinorum</i>		<i>Erinaceus terrestris</i>
<i>Oryza</i>	<i>Omphacium</i>	<i>Serum</i>
<i>Oyalme</i>	<i>Portulaca</i>	<i>Fel animalium</i>
<i>Plantago</i>	<i>Phyllitis</i>	<i>Zyithum Plantago</i>
<i>Polemonium</i>		<i>Calamintha.</i>
<i>Pentaphyilon</i>		<i>Elephantias</i>
<i>Papauer ceratite, siue</i>		<i>gignentia.</i>
<i>corniculare</i>		<i>Vinum ficyte.</i>
<i>Quercus</i>		<i>Emollientes me-</i>
<i>Rubric. siue terra lenia</i>		<i>dicinae.</i>
<i>Silurus</i>	<i>Sanguis</i>	<i>Adipum medicina</i>
<i>Sium</i>	<i>Scordium</i>	<i>Bdellium</i>
<i>Symphyton</i>		<i>Cinnamomum Cypros</i>
<i>Staba</i>		<i>Cistos Cera</i>
<i>Sideritis Achilleia</i>		<i>Cerussa Chalcanthum</i>
<i>Salsugo</i>	<i>Tragion</i>	<i>Calx viua Oesypus</i>
<i>Vitis sativa, siue vini-</i>		<i>Fœnogracum</i>
<i>fera</i>	<i>Vinacei</i>	<i>Glucinum</i>
<i>Vinum cydonite</i>		<i>Ammoniacum</i>
<i>Et in verbo, Intestino-</i>	<i>Irinum</i>	<i>Laurus</i>
<i>rum remedia.</i>	<i>Lana succida</i>	<i>Linum</i>
E <i>Brietati vtilia.</i>	<i>Lapis</i>	<i>Gagates</i>
<i>Amygdalus a.</i>	<i>Metopium</i>	
		<i>Myrrha</i>

INDEX

Myrrha Bæotica	Epiphoræ remedia.
Medullæ animalium	Asarum Malobathrion
Naphtha.	Cotonea Crimnon
Palimpissa	Coriandrum Eilium
Penates heracleon	Ambrosia Vna passa
Psyllion	Terra samia.
Plumbum elotum.	Erucis pinorum
Resina	conuenit.
Styrax Viscum.	Vnguentum melium
Enterocelæ re-	Diosc. lib. 6. cap. 2.
media.	Eruptionum re-
Hippurion, stræ equisetū.	media.
Ephelidis vtilia.	Serum
Balanus myrpsica	Lupinum satiuum
Cui.	Beta Portulaca
Epinyctidis mor-	Pentaphyllon
bi remedia.	Balanus myrpsica
Olca syluestris	Vinum myrsinite
Myrtus	Alumen.
Amygdala amara	Excreationis crassa
Grossi Fimum	pectoris remedia.
Brassica satina	Pix liquida
Plantago Cucumis	Dracunculus minor
Porrum Absynthium	Tordylon.
Coriandru cum melle	Excrescentia de-
passaque vna	primentia.
Viscum	Alumen Cerussa
Heliotropium maius	Cinis vitis
Vna passa.	Diphryges

Erina

Erinaceus marinus	Cinnamomum
Lapis Aſius	Cochlea terreſtres
Ochra	Pumex Cyclaminos
Pyrites	Scordion Eruum Ficus
Spuma argenti	Sal. Hedera Iris Illyrica
Extenuatoriæ me-	Lepus Lilium
dicinæ.	Lotus ſylueſtris
Artemiſia Anthemiſ	Maſtichinum
Iris Illyrica	Mel ſardoum
Hyſſopus	Oleum amygdalinum
Lapis hematites	Oleum raphaninum
Pulegium	Pepo Polygonator
Panaces heracleon	Spuma argenti
Extraſtoriæ me-	Sifymbriū aquaticum
dicinæ.	Thapſia.
Galbanum	Faciei rugas au-
Viſcum Thapſia	ferentia.
Scoria argenti.	Cacalia.
F acies ne à ſole	Facidium gene-
aduratur.	rantia.
Onum.	Vinum catorchite
Faciei vitia auſe-	Dioſc. 6. in præfat.
rentia.	Fatigationum
Ampelos-agria	remedia.
Haleyonium	Adeps.
Adarces	Fauos rumpentia.
Bræſſica fatina	Eruum
Bulbus eſculentus	Vua paſſa
Balanus myreſſica	Peponis radix

INDEX

Croſſi.	Feniculus	Hypericon
Faucium morbi	Hyofcyamus	
remedia.	Heliotropium	maius
Acetum	Lac humanum	
Acetum ſcillite	Lagopus	
Cacalia	Aethiopis	Myrrha Ouum
Ficus	Lac Oleum	ſicyonium
Laſerpitium	Mel	Portulaca Piper
Papauer ſatiuum	Panaces	heracleon
Styrax.	Polygonon	mas
Fauces aſperas	Pentaphyllon	
facientia.	Periſterion	ſupinus
Characias	Rhaponticum	
Cimolia terra.	Ruta	Smyrniac
Febribus con-	Sapapenon	
traria.	Saxifraga	
Mala punica.	Trifolium	rua
Febrifugia.	Vinum	melitite
Centaureum minus	Vinum	rhoite
Conixa.	Vinum	hyſſopite.
Februm remedia.	Febris	quartanae
Angaricum	remedia.	
Ariſtolochia tertia	Araneus	Bugloſſon
Anthemis	Amhuſa	Cimues lecti
Aphronitrum	Hypericon	
Baſamum	Heliotropion	maius
Bugloſſum	Pentaphyllon	
Coſtus	Cucurbita	Verbenaca ſupina
Clymenon	Trifolium	Ruta.
		Fell

C Y R A T I V V S

Felle suffufis vtilia.	Heleborum nigrum
Adiantum	Orchis Serapias
Vinum asarite.	Omphacinum
Fellei humoris re media.	Papyrus Plantago
Absynthium	Pentaphyllon
Centaurium minus	Stratiotes terrestris.
Eeritatem anima lium mitigãtia.	Flatus discutien- tia.
Oenagra.	Cinnamomum :
Ferruminandi vim habentia.	Ocimum
Spuma argenti	Vinum stichadite.
Rubrica finopis	Flatum ad gene- rantia.
Spongia	Malus Zithum
Lapis morochthus.	Phascolus.
Filium masculum generantia.	Fluxionum re- media.
Phylon Orchis	Fuligo butyri
Crataegonos.	Erysimon
Fistularum re- media.	Lichen in petris
Adeps Arisaron	Ocimum Portulaca :
Cinnamomum	Pepo Squama aris :
Charatias	Papauer fatium
Calcites lapis	Acantha Arabica :
Dracunculus minor	Chium vinum
Dipsacus	Acetum Ebenus :
	Licium Lixinia ex ficis :
	Vinum rhoite
	Vinum terebinthinum :
	S. Vinum.

INDEX

Vinum pißite	Calcanthum	Sal
Vinũ melampsythium.	Pyrorum ligni cinis	
Fœtus necantia.	Aphronitrum	
Vide, Partus necantia.	Cinis vitium	
Fœminas sterile-	Lapis Afius	
fcientia.	Disco. lib. 6. cap. 23.	
Lepus terrestris	Furunculorum re-	
Hedera.	media.	
Formicæ morbi re	Ficus	
media.	Großi	Triticum
Cicer	Characias	Rhaphanus
Chamæfyce	Asphodelus	Galbanum
Batrachion	Dipsarum	Pygnoكوم
Heliotropium maius	Aphronitrum.	Sal
Iacerta	Ruta	Furfures tollen-
Thus	Vitis fativa.	tia.
Fracturæ remedia.	Adiantum	Allium
Fuligo pictoria.	Fœnogræcum	Alumen
Fungorum vene-	Fel animalium	
natorum re-	Großi	Linum
media.	Lilium	Myrtus
Verbenaca	Malua	Olea
Fimum	Mel	Oleum oleastri
Rhaphanus		Oleum amygdalinum
Absinthium		Oleum myrtinum
Melisophyllon		Oxalme
Fungi		Salix
Vinum in communi		Vnguentum melinum
Acetum		Vnguentum telinum
		Vrina

Vinum myrsinite	Alumen.	
Allium	Beta.	Genarum morbi
G Angrenę mor		remedia.
bi remedia.	Aloë	
Ampelos leuce	Aerugo aurificum	
Brassica sativa	Aerugo ferri	
Bulbus esculentus	Ammoniacum	
Cinnamomum	Lapis schistos	
Characias	Galiopsis	Mituli Naphta
Juglans	Olea sylvestris.	
Lixivia è ficu	Geniturae proflu-	
Lilium	Lens	uij in somno re-
Lupinum sativum		media.
Laserpitium	Lactuca sylvestris	
Rhus	Rhaphanus	Nymphaea
Urtica	Vua passa.	Hermol. Cor. cap. 932.
Genitalium mor-	Generationem de-	
bi remedia.	primentia.	
Asparagus	Amurca	Clymenon
Aloë	Aster atticus	Heliotropium maius
Cyprinum	Cotyledon	Mentha Thelypteris
Fenogracum	Xyphion	Asplenon.
Flos salis	Linum	Genituram extin-
Malum punicum		guentia.
Polygonon	Cannabis sativa.	semen
Sampuchinum	Anthem.	
Vinum terebinthinũ.	Genituram augen-	
Genitalium virus		tia.
extinguentia.	Semen coriandri	

INDEX

Coriandrum.	Scolopendra
Genitalium tor-	Characias.
porem indu-	Gladiorum aciem
centia.	perstringentia.
Cicuta.	Malum sylvestre.
Gingiuarum mor-	Glâdis membri re-
bi remedia.	media.
Aristolochia tertia	Mel.
Aloe	Acetum
Acetum scillite	Grauedinis re-
Alumen	Butyrum
Canthamum	Cytinus
Chalcitis lapis	Gurgulioni
Aerugo aurificum	Silurus.
Aerugo ferri	Gutturis re-
Galla	Lycium
Lepus terrestris	Bdellium
Lac schiston	Ficus
Lapis arabastrites	Vinum halosantinum.
Myrrha	Mastiche
Oleum omphacinum	Lixivia ex ficu
Pruna	Plantago
Pumex	Rosa
Rubus	Staphis agria
Sal	Tribulus
Vua cenanthe	Allium
Vinum rhenite.	Aloë
Glabros aut depiles	Irinum
facientia.	Lapis Arabicus

Ouum

CURATIVVS.

<i>Ouum</i>	<i>Palma</i>	<i>Herpetis con-</i>
<i>Plumbum elotum</i>		<i>traria.</i>
<i>Rhus</i>	<i>Rubus.</i>	<i>Stychnon fatium</i>
<i>Hæmorrhoidarum</i>	<i>Acetum.</i>	
	<i>curatio.</i>	<i>Hirundinum visus</i>
<i>Diosco.lib.6.cap.69.</i>		<i>restaurantia.</i>
<i>Halitus oris re-</i>	<i>Chelidonium maius.</i>	
<i>media.</i>	<i>Hirundines pellen-</i>	
<i>Agallochum</i>	<i>tia.</i>	
<i>Anisum</i>	<i>Bromos</i>	<i>Acetum.</i>
<i>Citrum Malobathrum</i>		<i>Hirudinis cura-</i>
<i>Myrrha</i>	<i>Mastiche</i>	<i>tio.</i>
<i>Vinum selenite.</i>		<i>Diosco.lib.6.cap.32.</i>
<i>Hastulas infixas</i>	<i>Hominem ne-</i>	
<i>corpori extra</i>	<i>cantia.</i>	
<i>hentia.</i>	<i>Iuniperi ramenta</i>	
<i>Oxyacantha.</i>	<i>Smilax seu taxus.</i>	
<i>Hepaticorum re</i>	<i>Hominis morsus re</i>	
<i>media.</i>	<i>media.</i>	
<i>Vide, Iecinoris morbo-</i>	<i>Iuglans.</i>	
<i>rum remedia.</i>	<i>Horrores excu-</i>	
<i>Herbæ quæ peri-</i>	<i>tientia.</i>	
<i>munt.</i>	<i>Vide, Rigorem excu-</i>	
<i>Diosc.lib.6. in præfat.</i>	<i>tientia.</i>	
<i>Herniæ medicinæ.</i>	<i>Hulcerantes medi-</i>	
<i>Cinnamomum</i>	<i>cinæ.</i>	
<i>Cupressus</i>	<i>Cytinus</i>	<i>Buprestis Salamandra</i>
<i>Pentaphyllon</i>	<i>Batrachion</i>	<i>Ruta</i>
<i>Psyllium</i>	<i>Xyphium.</i>	<i>Lonchitis Hedysarum</i>
	<i>S 3</i>	<i>Clema</i>

INDEX

Clematis	Ficus	Finnum
Portulaca agrestis	Aerugo aurificum	
Ampeloleuce.	Fel	Glans
Hulcerū remedia.	Großi	Hedera
Amygdala amara	Goed, id est, coriādrum	
Anemone Amylum	Gentiana	
Anagallis Aristolochia	Iris Illyrica	Isatis
Aloë Anthemis	Indicus lapis	
Althæa Anchusa	Lixivia cū cinere ficus	
Astragalus Aconiton	Lentiscus	Lycium
Arction Acetum	Lana combusta	
Arsenicum Alumen	Lolium	Lens
Brassica satina Beta	Lupinus	Libanotis
Bulbus esculentus	Laserpitium	
Ballote	Lilium	Myrtus
Caries lignorum	Mel	Mandragoras
Cistos Cheiudonium	Nasturtium	
Centaurium	Narcissus	
Chamæleon niger	Olea sylvestris	
Coriandrum	Oleum amygdalinum	
Chamedrys	Orobis	Orchis
Chamæpitys	Oenagra Omphacium	
Chamelca	Plantago	Pix
Cadmia Cinis vitis	Palma	
Corallium	Purpura combusta	
Dracunculus	Pepo	Panaces
Elelisphacen	Pencedanum	Prasion
Eupatorium	Pentaphyllon	
Ebulus Aes vstum	Peristereon supinus	

CURATIVVS.

Papauer ceratitis, id	Halcyonium	
est, corniculare	Buprestis	Cyperus
Psyllium	Cinnamomum	
Plumbum elotum	Calamus odoratus	
Pumex	Cochlea terrestres	
Rhamnus	Cicer	
Ruta	Chamaleon albus	
Stratiotes terrestris	Chamaedrys	
Scordion	Cestron	Cotyledon
Sandaracha	Sal Cucumis anguinus	
Spongia	Thus Cici	
Viscum Thelypteris	Helleborum nigrum	
Testæ fornacum	Ebulus	Ficus
Vrtica.	Erinaceus terrestris	
Humorum malorū	Hippophales	
medicinæ.	Hippophaston	
Metopium vnguentum	Hyssopis	Laserpitium
Nardinum	Lathyrus	Origanum
Amygdale dulces	Plantago	Pancratium
Mel.	Polium	Rhaphanus
Hydropicorum re-	Ruta	Scilla
media.	Sampsuchus	
Asarum	Amurca	Staphylus
Halicacabus	Allium	Smyrnion
Absynthium	Anisum	Strychnon hypnoticon,
Androsaces	Alisma	sive solanum somni
Ampelos agria		ficum
Aqua maris	Trifolium	Tithymalus
Acetum Aphronitrum	Vitex	Vrina

I N D E X

Vinum scillite	Vettonica Eupatorii
Vinum rethinite	Hyoscyamus
Vinum cedrite	Pentaphylon
Vinum asarite	Chrysocome
Vinum panacite.	Papauer ceraticis, siue cornutum
Hyoscyami cu- ratio.	Epipactis Isopyron
Diosc. lib. 6. cap. 15.	Vinum cydonite
I Ecinoris reme-	Vinum pissite
dia. Acorus	Vinum absynthite
Nardi spica	Vinum nardite
Nardum Gallicum	Vinum asarite
Amomum	Vinum ex sylvestri asaro
Iuncus odoratus	Vinum chamalates
Agallochum	Rubrica sinopis.
Picea Pinus	Ignis sacri reme- dia.
Daphnoides	Asarum
Palma elate	Acacia
Amygdala amara	Acinos herba
Lachumanum	Anchusa Lycopsis
Scandyx Struthium	Aizoon maius
Anagallis Agaricum	Brassica sativa
Rhaponticum	Acetum Beta
Gentiana	Baccharis Bechion
Glycyrrhiza	Crocus Cupressus
Eryngium Absyntium	Coriandrum Cicuta
Serpillum Sphodilium	Cotyledon Cici
Ammoniacum	Chalcitis lapis
Anthemis Chamapitys	Aerugo

C V R A T I V V S.

Aerogo ferri	Lapathon	
Harundo	Helcine	Lichen in petris
Isatis	Lens	Lolium Thus
Lilium	Lens palustris	Myrrha Nasturtium
Lapis smyris		Sinapi Propolis.
Myrtus	Malua	Incussis vtilia.
Mandragoras		Phlomides.
Portulaca	Plantago	Infantes mortuos
Parthenion		vtero eiicientia.
Polygonon mas		Dictamnus.
Pentaphyllon		Infantibus
Peristereon rectus		vtilia.
Papauer satium	Athara	Aster Atticus
Psyllium	Rhamnus	Strychnum satium
Rosa	Ruta	Smilax aspera.
Rubus	Idea	Infantium pupil-
Salix	Sanguis	lae vt glaucae, non
Seris		nigrae reddan
Strychnon, siue solanum		tur.
	Anellana.	
Stratiotes aquaticus		Inflationes fa-
Vrina.		cientia.
Ilei morbi reme-	Allium	
dia.	Capparis	Glans
Oleum vulgare	Lacerpitium	Porrus
Strythnos halicacabus.		Bulbus exculentus.
Impetiginis morbi		Inflationum re-
remedia.		media.
Amygdala amara	Aspalathus	
	S S	Ami

INDEX

Amygdale amara	Adeps	Asphodelus
Ansyntium	Argemone	
Anisum	Anethum	Anagallis Artemisia
Anthemis	Althæa	Aizoon maius
Coctus	Cicer	Acetum Butyrum
Cuminum	Eryngion	Brassica sylvestris
Epithymum		Bechion
Helenium	Hyssopum	Brion thalassion
Hieracium maius		Casia
Iuncus odoratus		Cotyledon prima
Iuniperus	Lac	Elat ne Ebulus
Ligusticum	Hordeum	Faba Ficus
Ocymum		Harundo
Peucedanum		Hyoscyamus
Papa sylvestris		Irinum Laurus
Rhaponticum		Linum
Triticum		Lupinum sativum
Thymoxalme		Lonchitis
Vrtica	Vinacei	Lichen in petris
Vinum		Lens palustris Lapi
Vinum pissite		Melilotus Mădragoras
Vinum absynthite		Naphtha Ocymum
Vinum scilliticum		Oebra Picea
Vinum chamædrite		Platanus Portulaca
Vinum tragoriganite		Pulegium Parthenion
Vinũ sylvestris nardi.		Polygonon mas
Inflammationum		Papaver erraticum
remedia.		Rosa Rhus
Coriandrum		Susinum Sabina
		Sesla

C V R A T I V V S.

Sesamum	Hippuris	
Sconchos	Scordion	Irinum Lac
Symphytum	Linum	Mastichinum
Stratiotes aquaticus	Malua	Hordeum
Triticum	Tribulus	Palma Portulaca
Vinacei	Xyris.	Rosaceum Rosa
Inguinum morbi	Ruta	Salix
remedia.	Spartum	
Vide, Genitalium.	Vinum Surrentinum	
Ingenium prom-	Triticum	
ptum facientia.	Et in verbo Dysenteri-	
orum.	corum remedia.	
Infaniam indu-	Intertrigo vt tol-	
centia.	latur.	
Hyoscyamus	Vitex	Corium.
Strychnon hypnoticon	Ischiadicorum re-	
Mandragoras.	media.	
Infanientium re-	Asarum Balsamum	
media.	Cardamomum	
Betonica	Silurus	Fimum
Helleborum nigrum.	Nasturtium	Thlaspi
In somnia indu-	Rhaponticum	
centia.	Thymus	
Vide, somniferæ medi-	Ammoniacum	
cine.	Leontopetalon	
Intestinorum re-	Erythrodanum	
media.	Ascyron	
Agallochum Anthemis	Androsamum	
Cochlea terrestres	Chamaepitys	

Pole

INDEX

Polemonia	Lac extinguentia.
Ocymoides	Cicuta.
Aethiopis	Arction Lacrymas trahentia.
Chamacissos	
Spartum	Colocynthis Aerugo aurificum.
Oximeli	Lacertæ morsus remedia.
Vinum panacite	
Salsugo	Adarces. Portulaca
Iumentis contra	Seps, siue lacerta calchidia in vino epota.
Gramen cili- cum	Lacrymæ quæ perimunt.
Nerion.	
Iumentorum sca-	Dioscorides libro 6. in præfat.
biem emen- dantia.	Lacrimationes emendantia.
Amurca	Alysson
Lupinum sativum	Vide, dislacrymationes emendantia.
Oleum piscinum	
Oleum lentiscinum.	Lactis vbertatem facientia.
Iumentorum vl-	
cera emendan- tia.	Argemone Anethum
Oleum picinum	Ampeloleuce
Alysson	Thelypteris. Cicer Cicæ
L Abiorum scif-	Echion Fœniculus
suræ remedia.	Halimos Hordeum
Adeps	Licum. Latuca Malua
Lac coagulantia.	Melanthion
Balsamum	Ficus. Ocymum

Sonchos

C V R A T I V V S.

Sonchos	Vitex.	Prasiū, siue marrubiū	
Lactis coagulati cu	Pseudobunion		
ratio.	Ruta	Sagapenum.	
Diosc.lib.6.cap.26.	Terebinthina		
Lassitudinum re-	Thapsia	Vrtica	
media.	Vinum cedrite		
Anethinum	Vinum byssopite		
Adeps Clymenon	Vinum stichadite		
Laurinum	Vinum tragoriganite		
Ammoniacum Sal	Vinum aromatite		
Lapis gagates	Vinum acorite		
Vinum chamaletes.	Vinum glycyrrhite.		
Laterum morbi re-	Lendes necantia.		
media.	Cedria	Mel	
Acorus Agallochum	Myrice	Beta	
Asphodelus	Allium	Alumen	
Aristolochia tertia	Lentiginis maculae		
Ampeloleuce	remedia.		
Balsamum	Alysson	Halcyonium	
Brassica sativa	Aqua maris		
Bdellium	Ampeloleuce		
Cyprinum Fimum	Brassica sativa		
Centaurium maius	Bulbus esculentus		
Centiana Galbanum	Balanus myrepfica		
Hordeum	Cinnamomum		
Leucacantha Myrrha	Eruum	Galbanum	
Naphtha Phu	Melāthion	Rhaphanus	
Panaces heraclion	Sanguis leporinus		
Petrofelinon	Sisymbrium sylvestre		
		Spi	

INDEX

Spuma argenti	Terebinthina	
Triticum cum aceto.	Thapsia	Terra melia
Lepræ remedia.	Vluis	Vrina
Allium	Anemone	Vitis sativa.
Aristolochia		Leporis marini re-
Acantha	Anchusa	media.
Acetum	Fiber	Cornus
Ampelos leuce	Lapis ophites	
Halcyonium	Halcyonium	
Alumen	Adarce	Chamaleon niger
Buprestis	Cicer	
Brassica sativa	Cucumis anguinus	
Cochleæ terrestres	Characias	
Clematis	Fraxinus	Helleborum nigrum
Cucumis anguinus	Ficus	Glutinum
Helleborum nigrum	Laserpitium	Olea
Aerugo aurificum	Pruna	
Ficus	Fel Rhaponticum	
Hordeum	Iuniperus	Ruta
		Sal
Lolium	Lapathum	Vitis sativa
Lepidium	Myosotis	Vinum tethalassonicum.
Oleum oleastri		
Oleum cicinum		Lienis morbi re-
Olea Aethiopica		media.
Oryza	Salamandra	Iris Illyrica
Serum	Sinapi	Nardum Gallicum
Struthion	Myrice	Acorns
Scammonia	Canhamum	
Sulphur	Sal Oleum amygdalinum	
		Lyc

C V R A T I V V S.

Lycium	Vitex	Hemionitis	
Cotonea	Linum	Erythrodanum	
Ficus Aegyptia		Vetonica	
Lac humanum		Lonchitis altera	
Lapinum satium		Polemonia	
Rhaphanus		Clymenon	Xyris
Lapathum	Sinapi	Anchusa	Vrtica
Brassica satina		Adiantum	Pteris
Nasturtium		Ampelos leuce et agria	
Piper	Struthion	Aqua maris	
Hedera	Cyclaminos	Vitis sativa	
Pancration		Acetum scilliticum	
Capparis	Lepidium	Vinum panacite	
Agaricum		Ferrum	Corallium
Rhaponticum		Lapis Afsus	Coris
Aristolochia tertia		Hermol. Cor. cap. 124.	
Crocodilon		Linguæ vtilia.	
Absynthium		Olea Aethiopica.	
Hyssopum		Lippitudinis re-	
Tragoriganum		media.	
Pulegium	Dictamus	Ebenus	
Sison	Anison	Lapis hyematites	
Smyrnion		Plantago	
Pencedanum		Spongia.	
Sagapenum		Liquores qui peri-	
Ammoniacum		munt.	
Viscum	Polium	Discorides libro 6. in	
Chamadrys	Leucoion	præfat.	
Nymphaea	Applenon	Liuorem emēdātia.	
		Allia	

INDEX

Allium	Aqua maris	Papauer cornutum
Iuglans		Sampsuchinum
Lana succida		Smyrnion.
Rhaponticum	Sinapi	Lupos necantia.
Lupinum satium		Aconitum pardalian-
Thapsia.		ches
Locorum mulie-		Aconitum alterum
brium remedia.		Apocynum.
Anethum	Althaa	Luscioforum re-
Foenogracum		media.
Linum	Leucoion	Fel animalium
Trifolium.		Sanguis.
Lumbricos ne-		Luxatis vtilia.
cantia.		Asparagus Acantha
Coriandri semen		Aphronitrum
Absynthium seriphium		Bulbus esculentus
Brassica satina		Fimum
Chamaleon albus		Harundo
Calamintha		Heliotropion
Myrrha	Portulaca	Iuglans
Oleum cicinum		Narcissus
Thelypteris		Polypodion
Lupinum satium.		Vitex
Lumbarum affe-		Vitis satina
ctuum remedia.		Vinum pissite
Asparagus	Capparis	Sampsuchus
Chamapence		Sal.
Echion	Harundo	M Aciei corpo-
Leucacantha		
		Erinaceus.

Mac

CURATIVVS.

Maculas tollen	Sandaracha	
tia.	Triticum	
Oleum balaninum.	Baccharis	
Maculas erubescere facientia.	Apium	Asclepias
	Hemerocallis	
Crocodilea, id est, Crocodili terrestris fimi.	Althea	
Malis medicamentis contraria.	Epimedium	Cici
	Hyoscyamus	
Adeps	Ruta	Vinacei
Pentaphyllon	Aqua maris	
Antirrhinon.	Fax vini	
Malorum quæ serpunt remedia.	Terra samia.	
	Mammæ virginū	
Acacia	Plantago	ne crescant.
Polygonon mas	Cicuta	Cotis.
Helxine	Cicuta	Masculum filium
Strychnum satium		generantia.
Aizoon maius		
Colymbades oliuæ	Crataegonos	
Sabina.	Phyllon	Orchis.
Mammarum morbi remedia.	Matricis morbi remedia.	
Asarum	Cotonea	Malua
Iuglans	Thus	Oleum balaninum
Erysimon	Ochra	Paonia.
Lens	Eruum	Maxillarum dolo
Asphodelus	Mentha	ris remedia.
Scammonia	Cervinum cornu.	
	T	Meat

INDEX

Meatus aperientia.	Cedrides	Myrice	
Allium	Cyperus.	Tilia	Hypocistos
Meconio contraria.	Lycium	Acacia	
Passum & protropon	Vitex		
vinum	Olea sylvestris		
Acetum	Oxymel.	Lotus	
Meliceridum mor-	Amygdala amara		
bi remedia.	Ficus		
Serum	Parthenion	Cochlea terrestres	
Helleborum nigrum	Fiber	Buprestis	
Euphymum	Oesypus	Fimum	
Acetum scilliticum	Cicer	Rhaphanus	
Amomum	Lapathum		
Melilotus.	Brassica sativa		
Menstrua prouo-	Chondrylla		
cantia.	Lactuca sylvestris		
Iris Illyrica	Caucalis	Eruca	
Meu	Cyperus	Ocymum	Cape
Asarum	Casia	Orobanche	Allium
Cinnamomum	Porrum		
Costum	Ampeloprasum		
Iuncus odoratus	Nasturtium		
Balsamum	Thlassi	Struthion	
Canchamon	Cyclamino	Asphodelus	
Helenium	Myrrha	Capparis	Anemone
Sampsuchinum	Hedera	Agaricum	
Amaracinum	Aristolochia tertia		
Abrotonum	Centaurium minus &		
Styrax	Naphtha	minus	

C V R A T I V V S.

Eryngion	Absynthium	Polium	Scordion
Origanum		Artemisia	
Tragoriganum		Leucoion	
Pulegium		Anthemis	Paonia
Eleliphacos		Erythrodanum	
Calamintha		Anagyris	
Thymus	Serpyllum	Alfina	Coris
Sampsuchus		Hypericon	
Baccharis	Ruta	Cestron	Medion
Panaces heracleon		Xyphion	Tragion
Ligusticum		Heliochrysos	
Seseli Masiliense		Mandragoras	
Tordylon		Vrtica	Myrtus
Sison	Anisum	Adiantum	
Feniculus		Myrtus sylvestris	
Oroselinum		Laurus Alexandrina	
Petroselinum		Daphnoides	
Hiepomarathrum		Chamadaphne	
Hipposelinum		Helleborus niger	♂
Smyrnion		albus	
Daucus	Libanotis	Ampelos melana	
Melanthion		Heliotropion maius	
Lasertium		Vinum scilliticum	
Sagapenon	Euphorbiō	Vinum absynthite	
Clynopodium		Vinum hyssopite	
Chamadrys	Lilium	Vinum aromatite	
Melissophyllum		Vinum daucite	
Prasium	Stachys	Vinum panacite	
Trifolium		Vinum helleborite	

INDEX

Vinum dictamnite	Fax vini	Lapis Asiæ
Staphylinus.	Morochth ⁹	Hamatites
Menstrua sisten- tia.	Ostracites	Terra samia
Lentisci succus	Mentem commo- uentia.	
Myrica	Coriandrum	
Oxyacanthos	Oreoselinum.	
Thus	Palma	Metalla quæ peri- munt.
Malum punicum		
Myrtus	Diosc. lib. 6. in præfat.	
Lepus terrestris	Mollientes medi- cinæ.	
Fuligo butyri	Vide, Demollientes.	
Coagulum	Morbi regij medi- cinæ.	
Sanguis	Acinos	
Acantha Arabica	Vide, Regij morbi.	
Hieracium maius	Morborum quæ serpunt remedia.	
Nymphæa	Vide, Malorum quæ ser- punt.	
Peonia	Limonium	
Medion	Mulierum deside- rio quo satisfiat.	
Sideritis achilleos	Acorum	
Rubus	Idæa radix	
Tragos	Lysimachia	
Oxychænos	Picea	Pinus
Heliechrysos	Adeps bubulus.	
Papauer sativum	Mulierum infirmi- tatum remedia.	
Mandragora	Amomum	
Aixon maius	Balsamum	Susinum
Aerugo ferri		Sese
Vinum rhetinite		

<i>Seseli Massiliense.</i>	<i>Laurinum</i>
<i>Mures necantia.</i>	<i>Susinum.</i>
<i>Chamaleon albus</i>	<i>Neruorum morbi</i>
<i>Aconitū pardalianches</i>	<i>remedia.</i>
<i>Helleborus candidus</i>	<i>Oleum sicyonium</i>
<i>Hermol. Cor. cap. 28.</i>	<i>Oleum clæomeli</i>
<i>Muris aranei mor-</i>	<i>Laurinum Cyprinum</i>
<i>fus remedia.</i>	<i>Gleucinū Amaracinū.</i>
<i>Mus araneus</i>	<i>Metopium Bdellium.</i>
<i>Abfynthium</i>	<i>Lixiua ex ficu</i>
<i>Chrysogonon</i>	<i>Erinaceus terrestris</i>
<i>Diosc. lib. 6. cap. 62.</i>	<i>Cochlea terrestres.</i>
<i>Muris morsus re-</i>	<i>Vipera</i>
<i>media.</i>	<i>Vermes terreni</i>
<i>Großi Allium.</i>	<i>Lac humanum</i>
<i>Mufcas necantia.</i>	<i>Triticum Poterium</i>
<i>Lysimachia.</i>	<i>Peucedanum</i>
<i>Myrmecias tol-</i>	<i>Laserpitium</i>
<i>lencia.</i>	<i>Lilium Satyrium</i>
<i>Ficus.</i>	<i>Melissophyllon</i>
N <i>Arium morbi</i>	<i>Althæa Coccus</i>
<i>remedia.</i>	<i>Erigeron Cacalia</i>
<i>Malum punicum.</i>	<i>Narcissus</i>
<i>Nauseam discu-</i>	<i>Hippophaston</i>
<i>tientia.</i>	<i>Vini qualitas</i>
<i>Tragoriganum</i>	<i>Aqua maris</i>
<i>Pulegium Foeniculus.</i>	<i>Acetum scilliticum</i>
<i>Nauseam mouen-</i>	<i>Vinum stichadite</i>
<i>tia.</i>	<i>Vinum thymite</i>

INDEX

<i>Fax vini</i>	<i>Fiber. Peristereon</i>	<i>supinum</i>
<i>Nervos lædentia.</i>	<i>Galiopsis</i>	
<i>Malus</i>	<i>Hedera</i>	<i>Vua ananthe</i>
<i>Vinum</i>	<i>Omphacinum</i>	
<i>Vinum gypsatum</i>	<i>Acetum</i>	<i>Oxalme</i>
<i>Melagite.</i>	<i>Squama aris</i>	
<i>Nervos tollentia.</i>	<i>Aerugo aurificum</i>	
<i>Mel sardoum.</i>	<i>Chalcites lapis</i>	
<i>Nigredines ab-</i>	<i>Flos salis</i>	
<i>stergit.</i>	<i>Lapis ostracites.</i>	
<i>Sabina.</i>	<i>Nubeculas oculorū</i>	
<i>Modis vtilia.</i>	<i>emendantia.</i>	
<i>Bdellium.</i>	<i>Vide, Oculorum re-</i>	
<i>Nomatum morbos</i>	<i>media.</i>	
<i>curantia.</i>	<i>Nyctiloparū morbi</i>	
<i>Asparagus</i>	<i>remedia.</i>	
<i>Sabina</i>	<i>Papyrus</i>	<i>Vide, Luscioforum re-</i>
<i>Cistos</i>		<i>media.</i>
<i>Olea sylvestris</i>	<i>Olea</i>	O <i>Bmutescere fa-</i>
<i>Oliua colymbades</i>		<i>cientia.</i>
<i>Malum punicum</i>		<i>Mandragora.</i>
<i>Smarides</i>		<i>Oculorum epipho-</i>
<i>Fel animalium</i>		<i>ræ remedia.</i>
<i>Vrina</i>	<i>Lilium</i>	<i>Afarum</i>
<i>Plantago</i>	<i>Arisaron</i>	<i>Malabathrum</i>
<i>Asphodelus</i>		<i>Cotonea</i>
<i>Maron</i>	<i>Prasium</i>	<i>Sesamum</i>
<i>Orchis serapias</i>		<i>Lens</i>
<i>Britannica</i>		<i>Cucurbita</i>
		<i>Anemone</i>
		<i>Argemone</i>

C V R A T I V V S.

Myosotis	Gentiana	Picea	Cupressus
Baccharis	Ruta	Sabina	Platanus
Apium	Hemerocallis	Populus alba	
Rubus idæa	Myrice	Acalis	
Papaver sativum	Ebenus	Rosa	
Phlomis	Lycium	Acacia	
Aster atticus	Salix		
Viola purpurea	Olea sylvestris	Olea	
Cici.	Olea Aethiopica		
Oculis contraria.	Palma Thebaica		
Lactuca	Cytinus	Myrtus	
Porrum	Ocimum	Cerasia	
Coriandrum	Halicababus	Mituli	
Anethum.	Cochlea terrestres		
Oculorum morbo-	Scorpius marinus		
rum remedia.	Vipera		
Acorum	Cassia	Senecio serpentina	
Cinnamomum	Sepia		
Amomum	Mullus piscis		
Balsamum	Ouum	Hirundines	
Canchamum	Cervinum cornu		
Crocum	Lac humanum		
Crocomagma	Costus		
Oleum vulgare	Fuligo butyri		
Elaomeli	Lana vsta	Oesypus	
Oleum amygdalinum	Fel animalium		
Myrrha	Thus	Sanguis	Vrina
Fuligo thuris & resina	Mel		Amylum
& picis	Faba		Lens

INDEX

Brassica sativa	Gramon	Parnasium
Portulaca	Rubus	Elatine
Seris	Pepo	Papaver sativum, & cor
Lactuca sylvestris	nutum	
Ocimum	Cape	Hyoscyamus
Sinapi	Piper	Mandragoras
Zingiber	Cyclaminos	Aconitum pardalian-
Asphodelus	ches	
Dracunculus maior	Aizoon	maius
Dracunculus minor	Helleborus	albus
Argemone	Anagallis	Cici Chamæsyce
Chelidonium maius	Capnos	
Othonna	Lotus	sativa
Centaurium minus	Sesamoides	maius
Tragacantha	Aloë	Aes vstum
Abfynthiū	Abrotonū	Vua cenanthe
Ruta	Sampsuchus	Vinum Surrentinum
Melilotus	Acetum	scilliticum
Ruta Galatica, siue syl	Cadmia	
vestris	Squama	eris
Panaces heracleon	Acrugo	aurificum
Fœniculus	Plumbum	elotum
Libanotis	Stimmi	Cinnabari
Sagapenon	Chalcitis	lapis
Ammoniacum	Alumen	Pumex
Sarcocolla	Sal	Flos salis
Chamadrys	Fax vini	Spongia
Prasium	Stœbe	Corallium
Tribulus	Erinos	Pyrites

C V R A T I V V S .

Hamatites	Lac schiston	Butyrum
Galactites	Thites	Plantago Aloë
Morochthus	Sapphirus	Origanum
Geodes	Samius.	Leucoion
Opisthotonicorū ,	Orchis	serapias
id est,ceruicis ri-	Anthemis	
gore laborātium	Periclymenon	
remedia.	Rubus	
Acanthion	Staphis agria	
Eryngion	Vua ænanthe	
Laserpitium	Omphacium	
Sagapenon	Acetum scilliticum	
Satyrion	Coris.	Sandaracha
Opij remedia.	Alumen	Sal.
Sal	Orthopnoicis id est	
Disco.lib.6.cap.17.	difficulter spiran	
Oris halitus re-	tibus remedia.	
media.	Helenium	
Vide , Halitus oris re-	Myrrha	
media.	Cupressus	
Oris vlcerum re-	Daphnides	
media.	Cotonea	Vrina
Cyperus	Aspalathus	Struthion
Fuligo picis	Cyprus	Cyclaminos
Tilia	Acacia	Dracunculus maior
Olea sylvestris	Abrotonum	
Castanea	Hyssopus	
Malum punicum	Calamintha	
Manna	Thymus	Baccharis
	T	Sel

INDEX

Telesi Massiliense	Mastiche	Resina
Hieracium minus	Fuligo picis	Grossi
Smyrnion	Lixivia ex fca	
Sphondylium	Vrina	Alumen
Peucedanum	Chondrylla	
Melanthion	Vide supra, Genarum	
Ammoniacum	morbi remedia.	
Melissophyllon	Palpebrarum pilli	
Bechion	Botrys	euulsi ne rena-
Anemone	Hippuris	scantur.
Vrtica	Elaterium	Tellina
Hippophaston	Sanguis	Capnos.
Vinum panacite.	Pallidum colorem	
Ossium squamas	facientia.	
extrahentia.	Hierachium minus	
Aristolochia	Aloë.	
Ampelos leuce.	Panorum remedia.	
Ossa fracta conso-	Atriplex	Acetum
lidantia.	Bulbus esculentus	
Vetonica	Xyris.	Coriandrum cum faba
Oues necantia.	fracta	
Nerien.	Conixa	Ficus
Oxypara ingre-	Galiopsis	
dientia.	Olea sylvestris	
Ligusticum	Helxine	
Caros	Anethum.	Ocymastrum
P Alpebrarum re-	Ammoniacum	
media.	Isatis	Plantago
Vnguentum rosaceum	Xyphion.	

Pant

C V R A T I V V S.

Pantheras necatia.	Vinum phthorium.	
Aconitum pardalian-	Partus quibus	
ches.	iuuatur.	
Papaueris curatio.	Iris Illirica	
Dioscor. lib 6. cap. 17.	Cinnamomum	
& 18.	Balsamum	
Papularum re-	Vnguentum telinum	
media.	Iruum	
Vrina	Flos aris.	Amaracinum
Paralyticorum re-	Myrrha	
media.	Picea	Fiber
Capparis	Olea Aethiopica	
Erythrodanum	Oesypum	Fimum
Colocynthis	Cicer	
Ampelos melana	Lupinum satium	
Vinum scilliticum	Allium Cyclaminos	
Aphronitrum.	Dracunculus maior	
Partus necantia.	Dracunculus minor	
Daphnides	Hedera	
Coagulum	Gentiana	
Aleps hircinus & ouil	Centaurium maius	
lus & bubulus	Centaurium minus	
Nasturtium	Pulegium	
Thlasspi	Ruta	Eleliphacos
Hedysaron	Calamintha	
Helloborus albus &	Baccharis	
niger	Panaces heracleon	i
Colocynthis	Staphylinus	
Ampelos lence	Thynni falsi caro	

Ses

INDEX

Seseli Maßiliense	Parotidum id est,
Smyrnion Peucedanū	aurium aposte-
Sagapenum Galbanū	matū remedia.
Clinopodium	Ficus
Ammoniacum	Fimum
Chamadrys	Linum Faba
Prasium Bechion	Lapathum
Artemisia Conixa	Plantago
Leucoion	Erysimon
Onosma Anthemis	Viscum Althea
Anchusa	Psyllium
Mandragoras	Strychnon satium
Laurus Alexandrina	Vrtica Galiopsis
Ampelos leuce	Terra cimolia.
Heliotropium maius	Et in verbo, Aurium
Vinum panacite	medicina.
Vinum helleborite	Pauescentium
Alumen Sulphur	remedia.
Lapis Iaspis	Linum Melicratum
Aetites Samius.	Hydromel.
Paronychiarum, id	Pecoris scabiem
est, vngulū mor-	emendantia.
borum remedia.	Vide, Iumentorum sca-
Thus cum melle	biem.
Olea sylvestris	Pecori utilia.
Myrtus Ebur	Adiantum.
Paronychia	Pecus necantia.
Vua ananthe	Nerion
Aerugo ferri.	Aconitum lycoctonon.

CURATIVVS.

Pecus mortuum extrahentia.	Pedum qui à frigo- re alserūt remedia.
Aristolochia.	Cyclaminos.
Pectoris morbi remedia.	Pedum rimarum remedia.
Acorus	Men Scilla.
Coctum	Myrrha
Iuncus odoratus	Perfrictionis me- dicinæ.
Pithides	Iris Illyrica
Terebinthina	Cyperus Balsamum
Iuniperus	Ficus Oleum
Pomum	Ficus Aegyptia
Nasturtium	Piper Vinum stichadite.
Chelidonium minus	Percussis à fe- ris vtilia.
Rhaponticum	
Stichas	Thymus Balsamum
Ruta	Libanotis Paliurus
Sagapenum	Mustela
Ammoniacum	Ouum
Scordion	Bechion Argemone
Vrtica	Hippomarathrum
Isopyrum	Coagulum
Vinum cedrite	Sanguis Piper
Vinum aromatite	Elaphoboscon
Vinum nectarite	Phyllitis.
Vinum daucite.	Pernionum re- media.
Pediculos necantia.	
Allium	Alumen Vnguentum melinum
Mel	Cedria. & telinum
	Thus

I N D E X

Thus cum suillo adipe	Myrica	Myrtus
Acacia	Ficus	Lixivia ex ficu
Cancro	Cancro	Malua
Pulmo marinus	Asparagus	
Vngues asini	Lactuca sylvestris	
Adeps	Lens	Hedera Abrotonum
Eruum	Daucus	
Rapa sativa	Beta	Sphondylium.
Cyclaminos	Aparine	Phalangium
Dracunculus maior	Myrrhis	Aquamaris
Dracunculus minor	Diosc. lib. 8. cap. 58.	
Asphodelus	Scilla	Phagedæna morbi
Batrachion	Arcton	remedia.
Cotyledon prima	Fel	Fimum
Aqua maris	Dracunculus minor	
Alumen.	Isatis	
Peripneumoniaco-	Chamaleon niger	
rum remedia.	Panaces	Staphylinus
Abrotonum	Petasites	Characias.
Tragoriganum.	Ampelos leuce	
Pestilentiaæ con-	Vinum.	
traria.	Acetum	
Myrrhu, id est celiso-	Alumen	
lium	Sal	
Vinum omphacite.	Flos salis.	
Phalangiorū ictus	Pharico veneno-	
remedia.	contraria.	
Cinnamomum	Vinum Albanum	
Terebinthus	Diosc. lib. 6. cap. 19.	

C V R A T I V V S.

Phlegmatis con- traria.	Pili genarum ne defluant.
Plantago.	Spica nardi
Phreneticorum re- media.	Cochlea terrestres
Crocinum	Oesypus
Vitex	Chondrylla
Asparagus	Armenius lapis.
Serpyllum	Pili palpebrarum euulsi ne rena- scantur.
Conixa tertia	Tellina
Leucoion.	Sanguis
Phthiriasis, siue pe- dicularis morbi remedia.	Capnos.
Strigmenta gymnasto- rum	Pili alarum euulsi ne renascantur.
Myrica	Faba.
Hedera	Pituitæ crassæ re- media.
Staphis agria	Iris Illyrica
Sandaracha.	Sesamum
Phthiticorum re- media.	Hyssopus
Pix	Thymoxalme.
Porrum	Adeps Pituitæ remedia.
Rhaponticum	Agaricum Cinnamomum
Acantha	Styrax Naphtha
Prasium	Vlmus
Cestrum	Auellana
Lapis Asius.	Ouum
	Serum

Vrin

INDEX

Vrina	Sideritis achilleos
Hordeum	Hyoscyamus
Linum	Helleborum nigrum
Faba	Sesamoides maius
Lupinum sativum	Cucumis
Agrio raphanus	Elaterium
Portulaca	Staphis agria
Cucurbita	Thapsia
Capa	Hippophaës
Sinapi	Hippophaëston
Piper	Cici Characias
Cyclaminos	Lathyris
Dracunculus maior	Scammonia
Capparis	Thymelea
Anemone	Ebulus
Anagallis	Apios
Centaurium minus	Colocynthis
Tragacantha	Epithymon
Hyssopus	Empetron
Origanus	Ampelos leuce
Trageriganum	Polypodion
Pulegium	Heliotropium maius
Thymus	Vua passa
Ruta	Aqua maris
Pyrethrum	Vinum rhetinite
Sphondylium	Vinum aromatite
Melanthium	Vinum mandragorite
Parthenion	Vinum scammonite
Clematis	Sulphur Peplus Pityo

CURATIVVS.

Pityocamparum	Brassica satina		
curatio.	Seris		
Diosc. lib. 6. cap. 2	Cucurbita		
Plagarum vibices	Aros		
emendantia.	Asphodelus		
Susino.	Bulbus		
Plantæ quæ peri-	Esculentus		
munt.	Pulegium		
Diosc. lib. 6. in præfat.	Panaces	Heracleon	
Pleureticorum re-	Libanotis		
media.	Scordion		
Staphylinus	Leucoion		
Lasertium	Androsaces		
Aethiops.	Helxine		
Podagræ morbi	Papauer satium		
remedia.	Hyoschyamus		
Amomum	Naphtha	Lens palustris	
Populus nigra	Amurca	Aizoon	maius
Salix	Ficus	Brion thalassion	
Cochleæ terrestres	Phycus marinus		
Mustela	Cucumis anguinus		
Marinus pulmo	Balanus myrepica		
Lac humanum	Ebulus		
Adipum medicina	Heliotropium	maius	
Sanguis scilicet men-	Vua passa		
struus.	Acetum	Ferrum	
Fimum	Hordeum	Sulphur	Sal
Lens	Lapis Asius		
Lapa satina	Lapis gagates		
	V	Test.	

INDEX

Testa siue terra forna cum.	Pruriginem facien- tia.
Polypi morbi re- media.	Scolopendra Ephemerum Opium.
Dracunculus maior	Pruriginem emen- dantia.
Dracunculus minor.	
Præsteris serpentis morsus remedia.	Vrina Eruum Lapathum Aloë
Omotarichos	Origanum Pulegium
Rubus.	Eleliffhascos Melilotus
Præpositiorū mor- bi remedia.	Balanus myrepfica Acetum Alumen
Aloë.	Sulphur Sal.
Præcordiorum re- media.	Psilothrum, siue va- guentum depila- torium.
Scordion	
Vinum thymite	Lepus marinus
Vinum daucite.	Hedera
Præcipitatis ex alto vtilia.	Ampelos leuce Dryopteris Arsenicū.
Iris Illyrica	Pforæ morbi reme- dia.
Vitex	
Asparagus	Cardamomum
Amisum	Oleum amygdalinum
Cannabis satina.	Lycium
Profluuij genituræ remedia.	Ola Palma elite
Vide Genitura proflu- uij in somno.	Ficus Echinaceus marinus

CV R A T I V V S.

Cicer	media
Lupinum sativum	Iuncus odoratus
Batrachion	Balsamum
Chelidonium minus	Cedria
Origanum	Amygdalus amara
Pentaphyllon	Ficus
Staphis agria	Lac
Balanus myrepfica	Pulegium
Ampelos leuce	Ruta
Vitis sativa	Sagapenum
Aqua maris	Sal. Symphiton
Psy Nij curatio.	Pentaphyllon
Disco. lib. 6. cap. 10.	Chrysocome
Pterygij morbi re-	Vrtica
media.	Thapsia
Acacia	Rhus Melicratum
Malum punicum	Vinum hyssopite
Myrtas	Ficus Vinum aromatite.
Glycyrrhiza	Aloë Pulices necantia.
Prasium Pētafhyllon	Vnguentum telinum
Characias	Crocinum
Ampelos leuce	Butyrum.
Vua oxanthre	Putredinum genita
Acetum	Alumen lium remedia.
Sal Ferri rubigo.	Aspalatus.
Pubertas ne erum-	Putredines purgan
pat.	tia.
Hyacinthus.	Irinum
Pulmonis morbi re	Cinnamomum

Pix	Sal. Polygonum duplex
Q Vadrupedum	Clymenon
scabiem emē-	Periclymenon
dantia.	Helxine
Vide Iumentorum sca-	Papauer satium
biem.	Psyllium
Quartanę febris re-	Cicuta
media.	Lens palustris
Vide Febris quartanę	Aixoon duplex
remedia.	Erigeron
R Adices quę pe	Phacos thalassion
rimunt.	Potamogeton
Diosc. lib. 6. in præfat.	Cytisus
Raucedinis re-	Ebulus
media.	Acetum
Tragacantha.	Omphacomeli
Reduuias sanantia.	Pompholix
Ferri rubigo.	Plumbum olotum
Refrigerantes medi	Spuma argenti
cinæ.	Cerussa
Vnguentum melinum.	Coralium
Cupressus	Terra
Rodides	Lapis samius
Rosa	Acacia Terra ampellitidis.
Ouum Sonchos	Regij morbi re-
Seris.	media.
Lactuca	Caros Nardi spica
Coriandrum	Schistos
Hieracium maius.	Ceruinum cornu.

<i>Fimum</i>	<i>Cicer</i>	<i>Renum doloris</i>
<i>Lapathum</i>	<i>Atriplex</i>	<i>remedia.</i>
<i>Asparagus</i>		<i>Amygdala amara</i>
<i>Erisimon</i>		<i>Asparagus Anagallis</i>
<i>Scilla</i>	<i>Chelidonium</i>	<i>Agaricus</i>
<i>Aloë</i>	<i>Absynthium</i>	<i>Anthilis</i>
<i>Origanum</i>		<i>Anchusa</i>
<i>Hipomarathrum</i>		<i>Halcyonium</i>
<i>Libanotis</i>		<i>Cardamomum</i>
<i>Sphondylium</i>		<i>Calamus odoratus</i>
<i>Lacerpitium</i>		<i>Cicer</i> <i>Casia</i>
<i>Prasium</i>		<i>Cinnamomum</i>
<i>Scordion</i>		<i>Chamapitys</i>
<i>Asplenon</i>		<i>Passum</i>
<i>Anthemis</i>		<i>Glycyrrhiza</i>
<i>Peonia</i>		<i>Iuncus odoratus</i>
<i>Erythrodanum</i>		<i>Laurinum</i>
<i>Chamapitys</i>		<i>Lac</i>
<i>Pentaphyllon</i>		<i>Lotus sativa</i>
<i>Hyacinthus</i>		<i>Men</i>
<i>Hlicacabus</i>		<i>Pistacia</i>
<i>Chamæcissos</i>		<i>Nardus Gallica</i>
<i>Osyris</i>		<i>Nuclei pini</i>
<i>Myrtus sylvestris</i>		<i>Oleum amygdalarum</i>
<i>Elaterium</i>		<i>Palma elate</i>
<i>Vinum chamedryte</i>		<i>Portulaca</i>
<i>Vinum calamintithe</i>		<i>Plantago</i>
<i>Vinum nardite</i>		<i>Porrum</i>
<i>Sulphur.</i>		<i>Petroselinum</i>

I N D E X

<i>Peucedanum</i>	<i>Daphnoides</i>	<i>Ficus</i>
<i>Paonia</i>	<i>Fax vini</i>	<i>Macer</i>
<i>Rhaponticum</i>	<i>Oleum oleastri</i>	
<i>Saccharum</i>	<i>Ouum</i>	<i>Percica</i>
<i>Scandyx</i>	<i>Portulaca</i>	
<i>Smyrnion</i>	<i>Plantago</i>	
<i>Symphyton</i>	<i>Staphis agria</i>	
<i>Stratiotes aquaticus</i>	<i>Triticum</i>	
<i>Tragacantha</i>	<i>Vini qualitas</i>	
<i>Cordylon</i>	<i>Vinum labrusca</i>	
<i>Vrina</i>	<i>Vinum ex pyris</i>	
<i>Vetonica</i>	<i>Vinum myrtite.</i>	
<i>Vua passa</i>	<i>Ricinos necantia</i>	
<i>Vinum</i>	<i>Cedria.</i>	
<i>Vinum cydonite</i>	<i>Rigores seu horro-</i>	
<i>Vinum holosanthinum</i>	<i>res febrium ex-</i>	
<i>Erinaceus terrestris</i>	<i>cutientia.</i>	
<i>Fœniculus</i>	<i>Gleucinum</i>	
<i>Vinum absynthite</i>	<i>Piper</i>	
<i>Vinum nardite</i>	<i>Panaces heracleum</i>	
<i>Vinum aromatite</i>	<i>Staphylinus</i>	
<i>Oleum balaninum.</i>	<i>Vinum cedrite</i>	
<i>Rhagadum reme-</i>	<i>Piretrum.</i>	
<i>dia.</i>	<i>Rimarum sedis re-</i>	
<i>Pix</i>	<i>Lycium</i>	<i>media.</i>
<i>Vitex</i>	<i>Cancr.</i>	<i>Vide, sedis rimarum.</i>
<i>Rheumatismis vri-</i>	<i>Rosionis remedia.</i>	
<i>lia.</i>	<i>Lac schistum</i>	
<i>Acetum</i>	<i>Cupressus</i>	<i>Paonia</i>

Ructum mouentia.	Leucacantha.
Mastiche	Abrotonum
Rhaphanus	Origanum
Anethum	Calamintha
Smyrniū	Serpyllum
Vinum daucite.	Baccharis
Ruptorū remedia.	Panaces heracleon.
Acorus	Libanotis
Cardamomum	Laserpitium
Asarum	Sagapenum
Calamus odoratus	Galbanum
Helenium	Polycnemom
Bdellium	Clinopodion
Iuniperus	Altaa
Cedrides	Cestrum
Halimos	Symphiton
Lixiū ex fico	Holosteum
Fel	Xirus
Fimum	Hippuris
Dracunculus maior	Heliochryson
Dracunculus minor	Phlomidis
Aspondelus	Ampelos leute
Bulbus esculentus	Vinum daucite
Capparis	Vinum tragoriganite
Rhaponticum	Vinum panacite
Gentiana	Lapis scistos.
Aristolochia	S Agitas infixas ex
Centaurium	trahentia.
Acantha	Vide, spicula infixā.
	Saluam euocan-
	tia.
	Pirethrum.

INDEX

Salamandræ vene-	Erysimon	Agaricum
ni remedia.	Aloë	Rhaponticum
Diosc.lib.6.cap.4.	Centaurium	
Sanguinem excrea-	Acantha leucē & Ara	
tibus vtilia.	bica	
Iuncus odoratus	Ferula	Althæa
Aspalathus	Cestron	Lysimachia
Thus in potu datum	Symphytum	
Lentiscus	Polygonon mas	
Mastiche potu data	Symphytum alterum	
Naphtha	Cupressus	Clymenon
Macer	Myrica	Aethiopsis
Hypocistis	Rosa	Isopyrum
Lycium	Salix	Adiantum
Quercus	Vitis sativa	
Palma	Vua	
Malum puniceum	Omphacium	
Myrtus	Vinum phœnicite	
Cichorium	Corallium	
Amygdalus amara	Lapis hematites	
Ouum	Terra samia.	
Ceruinum cornu	Sanguinem fisten-	
Fimum	tia.	
Coagulum	Thus	
Triticum	Cupressus	
Amylum	Galla	
Portulaca	Persea	
Plantago	Cochlea terrestres	
Porrum	Rana	

C V R A T I V V S.

Araneus	tum discutientia.
Ouum	Coagulum Lixiua ex ficu
Sanguis	Fimum Thymus
Faba	Plantago Heliochrison.
Porrum	Isatis Sanguinem per vri
Elelisphacos	Mentha nam expellentia.
Serpyllum	Ruta Eruum
Cyminum satium	Cantharides
Stæbe	Ferula Ammoniacum.
Clymenon	Hippuris Sanguinem per na-
Sideritis achilleos	res expellentia.
Pantaphyllon	Crocodilium.
Phoenix herba	Sanguinem per vri
Astragalus	nam reddentium
Lichen in petris	remedia.
Idæa radix	Cyminum sylvestre.
Gallium	Sanguisugas necan
Stratiotes terrestres	tia.
Vua ænanthe	Oxalme
Acetum	Diosc.lib.6.cap.32.
Vinum terebinthinum	Sandarachæ cura-
Plumbum elotum	tio.
Stimmi	Diosc.lib.6.cap.29.
Cinnabaris	Sardonix curatio.
Alumen	Diosc.lib.7.cap.14.
Sulphur	Scabiem iumento-
Spongia	rum emendantia.
Gypsum.	Vide,Iumentorum sca-
Sanguinem concre	biem.

Scabiei morbi re-	Smarides
media.	Mullus piscis
Argemone prima	Locusta
Chameleon niger	Lacerta
Helleborus niger	Mures domestici.
Oesypum	Fimum
Sal	Lapathum
Oleum oleastri	Sonchos
Sinapi	Seris
Sulphur	Lactuca sylvestris
Vnguentum melinum.	Ocymum
Scolopendræ mor-	Abrotonum
fus remedia.	Sampsuchum
Grosfi	Hieracium maius
Scolopendra	Delphinium
Asphodelus	Lacerpitium
Sal.	Atractilis
Disco.lib.6.cap.59.	Lichnis vtraque
Scorpionis ictus re-	Millefolium
media.	Phalangium
Cyperus	Polemonia
Amomum	Chamaefyce
Cardamomum	Heliotropium
Cinnamomum	Scorpioides
Daphnoides	Aqua maris
Myrtus	Vinū tethalassomenū
Ficus	Vinum cydonite
Cancris	Sulphur
Scorpius terrestris	Sal

C V R A T I V V S.

Lapis saphirus.	Stachys	Artemissa
Diosco. lib 6. cap. 60.	Oenanthe	
Scorpiones necan-	Hemerocallis	
tia.	Herythrodanum	
Cancrī.	Anagiris	Myrtis
Scorpionis mari-	Adiantum	
ni ictus remedia.	Ampelos leuce	
Vrina	Vinum dictamnite.	
Asphodelus	Sedis rimarum re-	
Plumbū synceram &	media.	
crematum	Strigmenta balneorū	
Sulphur.	Meu	Aloe
Diosc. lib. 8. cap. 61.	Dipsacos	
Scorpiones torpe-	Leucoion.	
facientia.	Sedis inflāmatio-	
Delphinion	nis remedia.	
Lychnis sylvestris	Oleum cicinum	
Lens palestris.	Amaracinum	
Secundinas trahē-	Lens	Libanotis
tia.	Symphyton	
Balsamum	Erigeron.	
Sampsuchinum	Sedis morbi reme-	
Abrotonum	dia.	
Picea	Schistos Thus	
Fiber	Iecur mergi	Lentiscus
Linum	Pix	Rosa
Aristolochia tertia	Amurca	
Thymus	Pulegium	Malum punicum
Prasium	Myrtus	Cancrī
		Onum

INDEX

Ouum	Oesipum Paliurus	
Adeps	Fel Vitex	
Lens	Malua Cancrī	
Althæa	Portulaca Hippopotamus	
Sonchos	Anagallis Fiber	Mustella
Melilotus	Gallinaceus	
Laserpitium	Cantharides	
Aster Atticus	Chondrylla	
Viola purpurea	Nasturtium	
Cucumis anguinus	Dracunculus	
Colocynthis	Asphodelus	
Acetum	Rhaponticum	
Oxalme	Aristolochia tertia	
Vinum terebinthinum	Origanum silvestre	
Flos aris	Baccharis	
Plumbum elotum.	Ruta	
Semina quæ perimunt.	Phlomos, siue verba- scum	
Diosc. lib. 6. in præfat.	Panaces chironium	
Sensibus nocentia.	Staphylinus	
Vinum annosum.	Smyrnon	
Sensus recreantia.	Aparine	
Lapis Samius.	Chamadrys	
Sepis bestiolarum mor- sus remedia.	Lychnis sativa, siue co- ronaria	
Portulaca	Erythrodanum siue	
Oximel.	Rubia	
Serpentium venenis contraria.	Sparganion Polygonon mas	

Clemat

C V R A T I V V S.

Clematis daphnoides.	Iris Illyrica.	
Polemonia	Asarum	
Anchusa	Cinnamomum	
Otimoides	Palsamum	
Hyacinthus	Pix	Naphtha.
Mandragoras	Iuniperus	
Nerion	Platanus	
Adiantum.	Erice.	Glandes.
Serpētes fugan- tia.	Pistatia	
Iuniperus	Ficus Aegyptia	
Cornu ceruinum	Pastinaca piscis	
Adeps	Rana	
Nasturtium	Gobius	
Dracunculus maior	Fel	
Abrotonum.	Omotharichos	
Origanum	Fimum	
Calamintha	Marinus pulmo	
Peucedanum	Mel	Eruum.
Melanthion	Dictamnus	
Galbanum.	Rhaphanus	
Polium	Agaricum	
Oenanthe	Bracica satina	
Lysimachia	Cyclaminos	
Aster Atticus	Ampelloprason	
Vinum conixite	Dracunculus minor	
Lapis gagates.	Asphodelus	
Serpentium morsus	Anagallis	
remedia.	Acantha leuce.	
		Abrō

INDEX

Abrotonum	Adiantum
Asclepias	Peristereon supinum
Origanum	Ebulus
Lilium	Ampelos leuce
Calamintha	Vitis sativa
Clinopodium	Vinum
Serpyllon	Acetum
Leontopetalon	Oximeli
Panaces heracleon &	Vinum conixite
asclepiion	Vinum panacite
Cuminum sativum &	Sal Cinis vitis
sylvestre	Lapis ophites.
Ammi	Serpentes ne fe- riant.
Foeniculum	Cervi medulla.
Daucus	Serpentes necan- tia.
Libanotis	Anchusa onocheles
Sagapemon	Vinum cedrite.
Præfion	Siccantes medici- næ.
Phyllitis	
Trifolium	
Scordion	
Cestron	Ammi
Perichlymenos	Bromos
Echion	Cistos
Ocymoides, siue ocyma- strum	Cuminum sativum
	Ebulus
Rubus Eupatorium	Aes vstum
Heliochryson	Arena litoris

CURATIVVS.

Libanotis	Allium
Mentha	Capparis
Pompholyx	Vini qualitas.
Spodium	Sitim extinguen-
Rubus	tia.
Terra Chia	Glycyrrhiza
Rubrica sinopis	Symphyton.
Fax vini	Smilaci contra-
Diphryges.	ria.
Singultum pellen	Vide, Taxo contraria.
tia.	Somniferæ medici-
Fiber	næ.
Sisymbrium	Amygdale amara
Rhaponticum	Halicacabus, siue sola-
Mentha	num vesicarum
Aristolochia	Anisum
Anethum	Amomum
Ciminum sylvestre	Cistos tertia, siue lada-
Alysson	num
Asplenon	Baccharis
Clymenum	Dorycnion
Saxifragum.	Hyoschyanus
Siriadis remedia.	Lactuca
Cucurbita	Iris illyrica
Pepo	Opium Mandragoras
Heliotropium maius.	Papauer rhæas, siue sa-
Sitim generantia.	tinum
Cape	Porrum
	Syras
	Smil

INDEX

<i>Smilax hortensis</i>	Spiritum, id est flā-
<i>Strychinon hypnoticon</i>	tum generantia.
<i>sive solanum somni-</i>	<i>Gentiana.</i>
<i>ficum</i>	Spirantibus diffi-
<i>Vitex</i>	cultus vtilia.
<i>Vinum nouum</i>	Vide, <i>Orthopnoicis.</i>
<i>Lapis memphites.</i>	Spiritus discurren-
Somnum discutiē	tes coërcentia.
tia.	<i>Bdellium.</i>
<i>Sphondylion</i>	Spirantibus vitam
<i>Peucedanum.</i>	auferentia.
Somnia imaginosa.	<i>Cedria.</i>
& mala indu	Spicula infixā cor-
centia.	pori extra
<i>Faba</i>	hentia.
<i>Lens</i>	<i>Anagallis</i>
<i>Pygnoكوم</i>	<i>Harundo</i>
<i>Smilax leuis.</i>	<i>Haristolochia</i>
Sordes purgantia.	<i>Dictamnus</i>
<i>Irinum</i>	<i>Propolis</i>
<i>Cortex thuris</i>	<i>Narcissus</i>
<i>Sabina.</i>	<i>Oxyachantha</i>
Spaticorum reme-	<i>Silurus</i>
dia.	<i>Triticum</i>
<i>Fiber.</i>	<i>Tragion</i>
Spasmi remedia.	<i>Xyphion</i>
Vide, conuulsionis reme	<i>Xyris</i>
dia.	<i>Lacerta.</i>

Spiffandi vim ha- *Pumex Corallium*
bentia. *Rubrica sinopis*

Acacia *Lapis hematites.*

Malus *Spleneticis vtilia.*

Cotonea *Vide, Lienis morbi re-*
media.

Malum syluerstre *Spumæ argenti cō*
Amygdalus amara *traria.*

Baccharis *Vinum in commune.*

Britannica *Squamas ofsium*
Polygonon mas & fœ- *extrahentia.*
mina

Clymenum *Aristolochia tertia*

Medion *Peucedanum.*

Rubus *Squaphylomatis*
Helxine *remedia.*

Idea radix *Palma Thebaica*

Hippuris *Lapis schistos*

Pfyllion *Lapis sapphyros.*

Bryon thalassion *Sternutamentum*
Potamogeton *mouentia.*

Acetum *Iris*

Vinum Hadrianum *Illirica*

Aerugo aurificum *Fiber*

Vinū nigrū labruscæ *Ptarmice*

Vinum Tyburtinum *Sinapi*

Cadmia *Struthion Batrachion*

Pompholyx *Daphnoides*

Squama aris *Helleborus albus.*

X Ster

INDEX

Steriles foeminas facientia.	Absynthium seriphium Balanus-myrepfica
Vide, Generationem de primentia.	Vua Thymelea
Stigmatum reme- dia.	Ebulus Prasium Galbanum
Batrachion	Aqua maris
Mandragora.	Vinum tethalassomenum.
Stomacho contra- ria.	Stomachi morbi remedia.
Terebinthina	Meu
Cedrides	Nardi spica
Melimela	Nardum Gallicum
Pruna	Malabathrum
Arbutus	Iuncus odoratus
Iuglans	Agalliochum
Anellana	Helenium
Ficus	Oleum balaninum
Hordeum	Mastichinum
Lens	Vnguentum rosaceum
Malua	Susinum
Porrum	Nuclei pini
Brassica sativa & ma- rina	Mastiche Cupressus Iuniperus Laurus
Cape	Populus nigra
Nasturtium	Rosa
Capparis	Olinx colimbades
Absynthium	Palma
	Pal

Palmaelate	Lampsana
Malum punicum	Brassica sativa
Siliqua	Portulaca
Myrtus	Sonchos
Cotonea	Seris
Mala Epirotica	Cucumis
Armeniaca	Lactuca
Mespilus	Gingidium
Lotus	Scandyc
Pruna	Aphace
Amygdala dulces	Ampeloprasum
Pistacia	Allium
Juglans	Zingiber
Morus persea	Scilla
Ficus Aegyptia	Bulbus esculentus
Ionia	Agaricum
Cochea terrestres	Rhaponticum
Ouum	Gentiana
Lac	Acantha leuce
Lac humanum	Aloë
Caseus	Absynthium
Lana succida	Mentha
Oryza	Tragoriganum
Lyncurion	Pulegium
Saccharum	Melilotus
Faba Aegyptia	Ligusticum
Sifer	Caros
Lupinum sativum	Anethum
Lapathum	Cuminum sylvestre

INDEX

Hieracium maius	Vinum melitite
Apium	Vinum scilliticum
Petroselinum	Vinum cydonite
Smyrniion Eæniculus	Vinum apÿte
Scordion	Vinum anethinum
Artemisia	Vinum rhoite
Nymphaea Faonia	Vinum myrtite
Cestron	Vinum therebinthinũ
Poligonon mas	Vinum phœnicite
Rubus	Vinum absynthite
Strychnon satium	Vinum bunite
Cotyledon prima	Vinum dictamnite
Erigeron Adianthum	Vinum calaminthite
Aster Atticus	Vinum aromatite
Viola purpurea	Vinum nectarite °
Chamadaphne	Vinum nardite
Colocynthis	vinũ ex syluestri nar-
Vitis famia	do
Nuclei acinorum	Vinum selenite
Vua ænanthe	Ferrum
Omphacium	Flos salis
Vini qualitas	Fæx vini
Phalernũ Hydromel	Lapis alabastrites
Thymoxalme	Lapis Samius.
Omphacomeli Vinum	Strumæ gutturis
Vinum Surrentinum	remedia.
Vinum omphacite	Iris Illyrica
Vinum nigrum ex la-	Großi
brusca floribus	Vipera

Must

C V R A T I V V S.

Mustela	Absyntium.
Vnguis asini	Stranguriæ mor-
Fimum	bi remedia.
Hordeum	Aspalathus
Lolium	Cedrites
Faba	Locustæ
Lens	Asparagus.
Lupinum sativum	Sisymbrium
Lapathum	Medica
Andrachme, siue por-	Panaces heracleon
tulaca sylvestris	Seseli Massiliense
Plantago	Piper Hipposelinon
Capparis	Hippomarathon
Argemone	Polycnemon
Coriandrum	Clinopodium
Libanotis	Oenanthe
Laserpitium	Coniza
Aparine Millefolium	Asplenon Cape
Scordion	Onobrycis
Lithospermum	Polygonon mas
Cotyledon prima	Saxifragon
Galiopsis	Xyris
Pseudobunion	Laurus Alexandrina
Adiantum	Tragion
Testa siue terra fornacum.	Pseudobunion
	Adiantum.
Strangulatus remedia.	Stypticæ medicina.
Irinum	Vide, Adstrictoria me-

I N D E X

<i>dicina.</i>	<i>Fel</i>	<i>Sanguis</i>
Succi qui perimūt.	Sagapenum	
Diosco. lib. 6. in prafat.	Euphorbium	
Sudorem deprimē	Chamaesyce	
tia.	Harena litoris.	
Oleum	Sugillatorum re-	
Oleum omphacinum	media.	
Oleum oleastri	Acetum	Sal.
Myrtinum	Superciliorum ra-	
Lentiscinum	ritati vtilia.	
Vnguentum melinum	Picea.	
Rhodides	Supercilijs glabris	
Myrtus	vtilia.	
Bulbus esculentus	Fuligo resina.	
Vinum myrsinite	Suppurationis tuber-	
Sulphur	culorum remedia.	
Gypsum	Crocomagma	
Terra samia.	Palimpsesta.	
Sudores euocātia.	Suppurationum re-	
Metopium vnguentum	media.	
Smyrniūm	Ficus Aegyptia	
Pyrethrum	Mel	Hordium
Onobrychis	Lolium	Cucurbita
Flos salis !	Ligusticum	
Anchusa	Lycopsis.	Smyrnion
Sues necantia.	Mandragoras	Althaa
Chamaleon albus.	Vrtica	
Suffusionum mor-	Narcissus	
bi remedia.	Ampelos leuce	
		Diphry

Diphryges.	Vide, Phthysicorum re-
Suspirioforum re-	media.
media.	Tabescentibus
Canthamum	vtilia.
Cyphi	Daphnoides
Oleum amygdalarum	Vinum strobilite.
Pix	Taxo contraria.
Ficus	Vinum in commune
Vulpinus pulmo	Acetum
Eruum	Diosc. lib. 6. cap. 12.
Plantago	Tela infixæ corpori
Agaricum	bus extrahentia.
Rhaponticum	Vide, Spicula infixæ.
Aristolochia tertia	Tenacini morbi
Hyssopum	remedia.
Thymus	Lac schiston
Acinos	Fænogracum
Ruta	Linum Eruum
Galbanum	Teredinem sen-
Ammoniacum	tentia.
Prasium	Ficus Aegyptia
Parthenium	Hyoscyamus.
Anagyrus	Teredinem non sen-
Adiantum Thapsia	tientia.
Ampelos leuce	Tilia.
Vinum passite	Hermol. Cor. cap. 133.
Vinum hyssopite.	Teredinem ne-
T Abidi corpo-	cantia.
ris remedia. Sal.	

INDEX

Testium morbi re-	Lupinum satium
media.	Eleliphacos.
Vitex	Thoracis remedia.
Myrtus	Cerebrum gallinaci
Cicer	Glycyrrhiza.
Faba	Thymos absumen-
Erysimon	tia.
Asphodelus	Smaris Fimum
Melilotos	Thymus Ruta
Ruta	Heliotropium maius
Cuminum	Vitis sativa Sal.
Lilium	Tibiarum vlcerum
Hyoscyamus	remedia.
Erigeron	Hydropiper
Vua passa	Sal Ampelos leuce.
Geodes lapis	Tineas latas pel-
Terra samia	lencia.
Cimolia.	Cardomomum
Thapliae contraria.	Costum
Diosco. lib. 6. in prefat.	Malicorium
& cap. 33.	Melumela
Theriacam ingre-	Iuglans Morum
dientia.	Heliotropium minus
Rapa sativa	Vinum absynthite
Zingiber	Lupinum satium
Dictamnus	Brassica sativa
Apium.	Portulaca
Theriomatum re-	Chameleon albus
media.	Hyssopum

Cals

CURATIVVS.

Calamintha	Lac schiston	
Thymus	Ruta Mel	Sinapi
Coriandrum	Aloe	
Melilotum	Origanum	
Bryon thalassion	Britannica	
Pteris	Periclymentos	
Thelypteris	Helxine	
Vinum cedrite	Peristereon supinus	
Calcanthum	Omphacium	
Anchusa tertia.	Vinum myrsinite	
Tineas rotundas ge	Flos aris	
nerantia.	Alumen	Sal.
Triticum.	Torminis remedia.	
Tineas necantia.	Iris Illyrica	
Absynthium seriphion	Acorus	Meta
Mentha	Cardamomum	
Heliotropium minus	Balsamum	
Cedria	Agallochum	
Aixoon maius.	Oleum	
Tineis contraria.	Iuniperus	
Citria.	Halimos	
Tonfillarum morbi	Iuglans	
remedia.	Ficus	
Pix	Cedria Fiber	
Lycium	Talus suis	
Pruna	Triticum	
Morus	Milium	Panicum
Ficus	Eruum	Atriplex
Hirundines	Sisymbrium	

I N D E X

Piper	Scilla	Vinum hyssopite
Agaricum		Vinum tragoriganite
Rhaponticum		Vinum panacite
Centaurium maius		Aphronitrum
Eryngion		Et in verbo, Dysenteria-
Calamintha		corum remedia.
Serpyllum		Torporis remedia.
Sampsachus	Ruta	Fagus.
Banaces heracleon		Tortionis remedia.
Acetum		Tragoriganum.
Cyminum satium		Toxico contraria.
Seseli Massiliense		Glandes
Cyminum sylvestre		Sanguis.
Elaphoboscon		Tremorem excu-
Petroselinum		tientia.
Daucus		Vnguentum cinnamo-
Libanotis		minum.
Ferula		Tremoris remedia.
Peucedanum		Lepus terrestris.
Asclepias		Tuberculorum sup-
Melissophyllon		urationis reme-
Phalangion		dia.
Conixa	Alisma	Strigmēta gymnastoriū
Chamaspitys		Morus Cape
Gramen		Asphodelus
Pseudobunion		Panaces Asclepion
Chamaedapne		Laserpitium
Vinum scillite		Viscum Thapsia
Vinum cedrite		Mandragoras

Ephē

Ephemeron	Daucus	
Cucumis anguinus	Libanotis	
Vrtica	Melanthion	
Aerugo aurificum	Orchis serapias	
Lapis Aſius	Orminum	
Terra cimolia.	Buphtthalmus	
Tubera extenuatia.	Cannabis ſyluatica	
Triticum	Polygonon mas	
Leontopodium	Lagopus	Xyris
Scammonia	Helxine	
Vinum nigrum è la- brusca.	Pentaphyllon	
Tumorũ remedia.	Peristereon ſupinus	
Anagyris	Hyoſcyamus	
Platanus	Psyllium	
Fagus	Xanthium	
Ilix	Sesamoides	
Hordeum	Adeps Ephemeron	
Brasſica ſatiua & ſyl- ueſtris	Faba Phlomidis	
Cucurbita	Cucumis anguinus	
Nasturtium	Thapſia	
Hydropiper	Chamaſyce	
Bræbus eſculentus	Pygnotomum	
Iſatis	Aqua maris	
Chamaeleon	Indus lapis	
Trocyrganum	Fex vini	Spongia.
Sampſuchum	Tuſſis remedia.	
Liguttiſicum	Amygdala amara	
	Aſphodelus	
	Apium ſatiuum	

I N D E X

Bdellium	Tufsis veteris re-	
Bromos	media.	
Cinnamomum	Asarum	Myrrha
Calamus odoratus	Nuclei pini	
Cupressus	Mastiche	Naphtha
Cedrides	Ceraſia	
Ciſtos	Cacalia	Amygdala amara
Chamadrys	Auellana	
Tragacantha	Allium	
Dracunculus	Ficus	Propolis
Faba	Helenium	Rhaphanus
Hippuris	Scilla	Hyſſopus
Hyofcyamus	Centaurium	maius
Iris Illyrica	Baccharis	
Lycium	Sefeli	Maſſilienſe
Laſerpitium	Mel	Daucus
Melicratum	Sagapenor	Galbanum
Origanum	Pix	Scordion
Palmaris	Piper	Bechion
Peucedanum		Helxine
Pradium	Phlomidis	
Papauer ſatium	Acetum	
Ruta	Vinum	hyſſopite
Struthion	Styrax	Sandaracha.
Smyrnion	V Aros purgan-	
Sulphur	tia.	
Tragoriganum	Triticum	Oleum balaninum
Terebinthina	Myrrha	
Vua paſſa.	Lacerta	Linum
	Porrum	Cape
		Bul

CURATIVVS.

Bulbus esculentus	Staphylinus	
Pulegium	Anisum	Orchis
Balanus myrepfica	Orchis serapias	
Cici.	Sory	Satyrion
Ampelos leuce.	Satyrion alterum	
Varices fanantia.	Orminum	
Cirsson.	Xiphium	
Veneficijs medetur.	Vrtica	Caliopsis.
Scilla.	Venenata fugantia.	
Venerem cum volu	Vitex	
ptate expediētia.	Dictamnus.	
Laurus Alexandrina.	Venas excitantia.	
Venerē cohibentia.	Vinum Phalernum.	
Portulaca	Ventris animalia	
Lactuca	expellentia.	
Lactuca syluestris.	Vide, Tineas. latas.	
Venerem stimu-	Ventrem soluentia.	
lantia.	Vide, Alium soluētia.	
Costum	Crocum	Venatorum ictus
Mastiche		remedia.
Linum	Cardamomum	
Rapa satina	Nardum gallicum	
Sicer	Eruca	Helenium
Porrum	Cape	Cinnamomum
Nasturtium	Bdellium	
Dracunculus maior	Vitex	
Dracunculus minor	Ficus	Propolis
Bulbus esculentus	Rhaphanus	
Mentha	Triticum	
		Eryn

INDEX

Eryngium	Colchicom
Eyminum sylvestre	Epipactis
Althæa	Tribulus Passum
Prasium	Linum gypsatum
Smilax aspera	Rubrica lemnia
Aqua maris	Terra samia.
Acetum.	Vermibus cōtraria.
Venenorum re-	Cedria.
media.	Verrucas tollentia.
Cinnamomum	Batrachion
Oleum	Pix Clinopodion
Paliurus	Lycium Characias.
Olea Aethiopica	Chamaesyce
Juglans	Ficus
Lixivia ex ficu	Cicer
Lepus terrestris	Heliotropium
Fiber	Butyrum Fimum
Sanguis	Vrina Staphis agria
Rapa sativa	Scilla.
Malua	Thymus.
Erysimum	Vertiginis morbi
Agaricum	remedia.
Aristolochia secunda	Balsamum
Abrotonum	Lac humanum
Ruta	Peucedanum
Laserpitium	Apium Galbanum
Leucas	Ampelos leuce
Polium	Ampelos melana
Pentaphyllum	Cestron Acetum scilliticum.
	Vinum scilliticum.

C V R A T I V V S.

Vertiginem adge-	Scandycæ	Passum
nerantia.	Ochra	Porrina
Cardamomum	Bulbus vomitiuus	
Balsamum	Rhaponticum	
Hyoscyamus	Glycyrrhiza	
Mandragoras	Tragacantha	
Falernum	Panaces heracleon	
Vinum rhetinite	Petroselinon	
Mandragorite	Smyrnion	
Aconitum Cicuta.	Peucedanum	
Vesicæ morbi re-	Feniculus	
media.	Nymphaea	
Men	Anthemis	Paonia
Nardum Gallicum	Phalaris	Cape
Nuclei pini	Halcyonium	
Cupressus	Cestron	
Laurus Palma	Vinum terebinthinum	
Palma elate	Vinum scilliticum	
Myrtus Lac	Vinum aromatite	
Ficus Ouum	Vinum halosanthite	
Cochlea terrestres	Lapis morochthus.	
Cicadia Napum	Vesparum ictus re-	
Cervinum cornu	media.	
Saccharum	Laurus	Malua
Gramen Malua	Sisymbrium.	
Hippuris Portulaca	Vestibus ne anima-	
Lotus sylvestris	lia noceant.	
Plantago Vua passa	Absynthium	
Cucumis	Heliochrysos.	

Vib.

INDEX

Vibices plagarum	Daphnoides	Myrtus
emendantia.	Ficus	Croſſi
Suſinum.	Coclea terreſtres	
Viperæ morſus re-	Lepus terreſtris	
media.	Sepia	Faba
Caſſia	Coſtum	Beta
Iuniperus	Lupinum ſatiuum	
Macer	Chondrylla	
Fraxinus	Vrina	Capa
Carles lignorum	Piper	Allium
Triticum	Eruum	Dracunculus maior
Ferula	Anchuſa	Dracunculus minor
Ouocheles	Asphodelus	
Ocimoides	Capparis	Argemone
Dioſc.lib.6.cap.63.	Gentiana	
Herm.Cor.cap.721.	Telephon	Ruta
Viriū infirmitates	Chamaleon niger	
roborantia.	Libanotis	Lilium
Nuclei pini.	Nymphaea	Cicuta
Viſco contraria.	Erythrodanum	
Vinum in communi	Helleborum nigrum	
Acetum	Cucumis anguinus	
Vinum abſynthite	Balanus myreſica	
Dioſ.lib.6.cap.21.	Narciſſus	
Viſcerum morbi	Sulphur	
remedia.	Halcyonium	
Thus.	Terra melia.	
Vitiliginis re-	Vitra fracta conglu-	
media.	tinantia.	

Herna

CVRATIVV3.

Herm. Cor. cap. 254.	Irinum	Laurus
Vmbilici remedia.	Cochlea terrestres	
Lapis magnes.	Omotarichos	
Vnguibus vtilia.	Blatta	Pepo
Pix	Cupressus	Asphodelus
Daphnoides	Capparis	
Olea	Bulbus vomitorius	
Oryza	Origanum	Cestrum
Linum	Lapathum	Anagyris semen
Bulbus esculentus	Papaver spumeum	
Batrachium	Mandragoras	
Chelidonium minus	Daphnoides	
Viscum	Vua passa	Helleborus albus
Sandaracha	Elaterion	Silybon
Alumen	Balanus myrepica	
Sulphur	Marcissus	Cici
Fex vini.	Melocratum	
Vocem claram red-	Aes vstum	Chrysocolle
dentia.	Rubrica lemnia.	
Myrrha	Vomitiones	cohi-
Styrax	Silurus.	bentia.
Voluptates animi	Atriplex	Acetum
augefcentia.	Apium	Faba
Buglosum.	Mentha	
Volucrum morsus	Eupatorium.	
remedia.	Vomica morbi re-	
Iecur aprinum.	media.	
Vomitiones mo-	Palurus	Tblaspi
uentia.	Struthion	Eryngion
	Y	Be

INDEX

Bethion	Psyllion	Casia	Cinnamomum
Mandragora		Costum	
Acetum.		Iuncus odoratus	
Vrendi vim habentia.		Calamus odoratus	
		Balsamum	
Misy Melanteria		Crocum	
Vredinem facientia.		Crocomagma	
		Helenium	
Trifolium.		Oleum amygdalinum	
Vrinae difficultatē generantia.		Vnguentum melinum	
		Susinum	
Diosc.lib.6.in prasit.		Icinum	
Vrinae harenosę & asperę remedia.		Amaracinum	
		Bdellium	
Papauer feratit.		Picea	Nuclei pini
Vrinam cruentam mouentia.		Lentiscus	Resina
		Terebinthus	
Clymenon.		Cupressus	
Vrinam arcessentia.		Juniperus	
		Populus alba	
Eruum Galbanum.		Paliurus	Tilia
Vrinam mouentia.		Olea Aethiopica	
Acorus	Men	Glandes	Myrtus
Cyperus		Palma elate	
Cardumomum		Silique	Cotonea
Nardi spica		Malz Epirotica	
Naidum Gallicum		Cornus	
Asacum	Phu	Amygdala dulces	
Malabathron		Ermaceus marinus	

CURATIVVS.

Cimites lecti	Scilla	Capparis
Oues	Buprestis	Agaricum
Vermes terreni	Crocodilion	
Mel	Hordeum	Centaurium maius
Zithum	Chamaleon albus	
Milium	Acantha leuce	
Panicum	Acantha	Anonis
Cicer	Eruum	Eryngion
Rapa sativa	Absynthium	
Rhaphanus	Abrotonum	
Rhaphanus agria	Tragoriganum	
Sicer	Bunium	Eleliphacos
Brassica sativa	Thymus	
Asparagus	Serpyllum	
Sisymbrium aquaticum	Baccharis	
Crithmon	Ruta	Moly
Cucumis	Pepo	Ligusticum
Lactuca	Staphylinus	
Gingidium	Tordylon	
Caucalis	Eruca	Sisum
Ozymum	Caros	Anethum
Smilax hortensis	Cyminum sylvestre	
Porrum	Opium	Oreoselinum
Ampeloprason	Petroselinum	
Capa	Allium	Daucus
Piper	Libanotis	
Struthion	Melanthion	
Dracunculus	Ammoniacum	
Apphodelus	Chamadrys	

INDEX

Trifolium	Scordion	Vinum rhenite	
Androsaces		Vinum catorchite	
Anthyllis		Vinum è cedro	
Anthemis		Vinum è lauro	
Lithosperma		Vinum absynthite	
Erytrodanum		Vinum calamintite	
Lonchitis	Althæa	Vinum aromatite	
Hypericon		Vinum neclarite	
Choris		Vinum nardite	
Chamapitys		Vinum asarite	
Cestron		Vinum sylvestris nardi	
Polygonon mas		Vinum daucite	
Polemonia		Vinum acorite	
Saxifragon		Halcyonium	
Xyris	Gramen	Lapis hematites	
Gramen parnasium		Lapis Iudaicus	
Phœnix herba		Corallium	
Hippuris		Vinum chamæpyteos.	
Oxyschænos		Vrticæ herbæ pruritus remedia.	
Heliochrysos			
Astragalus		Herm. Cor. cap. 707.	
Hyacinthus		Vitis utilia.	
Papauer rhæas		Vrtica siue acalyphe.	
Strychnon hypnoticon		Vuæ faucium remedia.	
Cotyledon prima			
Vrtica	Arction	Pix	Galla
Vinum Lesbium		Pruna	
Hidromel		Hirundines	
Melicratum		Vrtica Omphacium	

C V R A T I V V S.

Acetum		Glycyrrhiza
Flos aris		Glutinum
Alumen	Sal.	Hippuris
Vulpes necantia.		Isatis
Apocynon.		Lana succida
Vulnerum reme-		Ligusticum
dia.		Lilium
Amurca		Lysimachion
Allium		Minium suopicum
Argemone		Myriophyllum
Aristolochia		Picea
Aloe	Antyllis	Palma
Althea		Portulaca
Androsamon		Porrum
Lycopsis	Acetum	Polycnemom
Butyrum		Polium
Brassica		Polygonon mas
Coccus		Poligonatum
Chamaepitys		Pentaphyllum
Centaurion		Phoenix herba
Cyclaminos		Pteris
Cytinus		Peristereon
Cupressus		Papauer
Dracunculus		Plumbum clotum
Dictamnus		Scordion
Aerugo aurificum		Symphiton
Oenanthe		Sideritis
Ficus Aegyptia		Stratiotes aquaticus
Finum	Gentiana	Spongia

I N D E X

<i>Cochlea terrestres</i>	<i>Gleucinum</i>
<i>Thus</i>	<i>Amaracinum</i>
<i>Terra cretria</i>	<i>Metopium</i>
<i>Vinum</i>	<i>Cinnamomum</i>
<i>Vinum cenanthe</i>	<i>Myrrha</i>
<i>Vnguentum citrinum</i>	<i>Styrax</i>
<i>Vlmus</i>	<i>Bdellium</i>
<i>Vitex.</i>	<i>Lentiscus</i>
<i>Vulvæ mulieris</i>	<i>Pix</i>
<i>remedia.</i>	<i>Naphtha</i>
<i>Men</i>	<i>Iuniperus</i>
<i>Cyperus</i>	<i>Laurus</i>
<i>Nardi spica</i>	<i>Myrica</i>
<i>Casia</i>	<i>Cistos</i>
<i>Costum</i>	<i>Rosa</i>
<i>Iuncus odoratus</i>	<i>Lycium</i>
<i>Balsamum</i>	<i>Acacia</i>
<i>Bryon</i>	<i>Amurca</i>
<i>Narcaphthum</i>	<i>Vitex</i>
<i>Oleum amygdalinum</i>	<i>Galla</i>
<i>Mastichinum</i>	<i>Palma elate</i>
<i>Vnguentum rosaceum</i>	<i>Myrtus</i>
<i>Melinum</i>	<i>Cotoneæ</i>
<i>Sampsuchinum</i>	<i>Iuglans</i>
<i>Abrotoninum</i>	<i>Cimices lecti</i>
<i>Susinum</i>	<i>Lac schiston</i>
<i>Narcissinum</i>	<i>Butyrum</i>
<i>Crocinum</i>	<i>Oesypum</i>
<i>Irinum</i>	<i>Coagulum</i>

CVRATIVVS.

Adeps	Artemisia
Fœnogracum	Geranium
Pinum	Anthyllis
Malua	Parthenion
Portulaca	Paonia
Plantago	Cestron
Sonchos	Clematis daphnoides
Porrum	Chrysocome
Sinapi	Ageraton
Piper	Vinum terebinthinum
Agaricum	Vinum cedrite.
Rhaponticum	Vinum picatum, siue
Pulegium	pisite
Centaurium maius	Vinum chamadryte
Melilotus	Vinum daucite
Ruta	Vinum helieborite
Panaces heracleon	Lapis gagates
Ammi	Peristereon rectus
Sphondylion	Hyoscyamus
Peucedanum	Mandragoras
Sagapenum	Ebulus
Galbanum	Ampelos leuce
Asclepias	Lilium Acetum
Circaea	Acetum scilliticum.

INDICIS CVRATIVVS.

FINIS.

Lugduni,
Excudebat Balthazar
Arnolletus.

